

Daar ook hier in de laatste jaren de heide belangrijk in grootte afneemt, moet deze diersoort snel in aantal afnemen.

Op 21 April 1935 nam ik een broedplaats waar in de gracht van de Schans bij Een (gemeente Norg), welke gracht 's zomers droog ligt. Het volgende jaar reeds waren uitgestrekte heidevelden rondom de Schans ontgonnen en van een broedplaats van de gestreepte pad heb ik sedert die tijd daar niets meer vernomen.

H. H. EVENHUIS.

Groningen.

Waar wonen nog bijenwolven? Ter voortzetting van een enkele jaren geleden begonnen onderzoek is het voor mij van groot belang te vernemen waar zich terreinen bevinden die in de afgelopen zomer een enigszins talrijke bevolking van de Bijenwolf (*Philanthus triangulum* Fabr.) huisvestten. Het tot dusverre gebruikte terrein is door sterke achteruitgang van het aantal nesten niet meer geschikt. Voor het onderzoek zijn alleen geschikt die terreinen waar zich de nesten in vlakke grond bevinden (stuifzandgebieden b.v.); kolonies met nesten in steile wanden van zandafgravingen zijn mij wel bekend, doch voor mijn doel onbruikbaar.

Alle voor het verstrekken van eventuele inlichtingen gemaakte portokosten zal ik gaarne vergoeden.

Adres: G. VAN BEUSEKOM, Prins Willem van Oranjelaan 18, Naarden.

Zeeschelpen op Terschelling. *Hiatella arctica* L. een jong ex. uit een aangespoeld wulken-nest 24 Aug. '39 paal 13 en idem 29 Aug. paal 18.

Uit schelpgruis verzameld bij paal 18, 29 Aug. '39: twee doosjes *Venus gallina* L., twee gave ex. *Bittium reticulatum* da Costa.

Uit idem paal 12, 31 Aug. '39 een gave *Arca lactea* L.

Uit aangespoelde kisten tusschen paal 10—12 een vijftigtal jonge meest doode, maar ook nog levende *Chlamys opercularis* L. (21—24 Sept.).

Het aantal aangespoelde rugdeksels van *Sepia officinalis* L. is de laatste weken onnoemelijk groot.

Midsland.

G. W. J.

De Lakzwam (*Ganoderma lucidum* = *Polyporus lucidus*). Op Zondag 22 October van dit jaar vond één mijner leerlingen langs een weg te Soestdijk een vrij harden en glanzend rood gekleurden paddenstoel, welke bij nader onderzoek de lakzwam bleek te zijn, waarvan ik slechts vijf vindplaatsen opgeteekend vond, nl. Doorwerth, Beekbergen, Amersfoort, Leiden en Poelgeest bij Leiden. Het leek mij daarom wel aardig, deze voor ons land vrij zeldzame soort hier even te kunnen vermelden.

De steel was 6 cm lang en de hoed bijna 7 cm, doch zij kunnen veel grooter worden, vooral de hoed. Opvallend is de zijdelingsche stand van den niervormigen en bijna vlakken hoed aan den steel. De bovenzijde van den hoed is voorzien van zwakke, concentrische groeven en deze massa is nogal taai en enigszins indrukbaar. Zeer mooi is de schitterende, lakroode kleur van den bovenkant van den hoed en den geheelen steel, waaraan deze paddenstoel, welke aan den voet van oude loofboomen (eik, beuk, els) groeit, zijn naam te danken heeft. Terecht wordt hij dan ook tot de fraaiste zwammen van ons land gerekend.

Utrecht.

Dr. J. C. VAN DER STEEN.

GEVRAAGD:

Verzamelaar van zeeschelpen vraagt prijsopgave van de diss. C. O. van Regteren Altena: Bijdrage tot de kennis der fossiele, subfossiele en recente Mollusken, die op de Nederlandsche stranden aanspoelen en hun verspreiding, Rotterdam 1937.

Adres: G. W. JONGENS, Midsland, Terschelling.

Die heimische Pflanzenwelt van Dr Felix Rawitscher en Researches on fungi van A. H. R. Buller. Deel 2, 3, 4.

Amsterdam Z., N. Amstellaan 83.

H. KLEIJN.

AANGEBODEN:

Physiologie und Oekologie van Fr. Czapek, f 1,50. Pflanzenatmung van S. Kostytschew., f 0,50. Algemeene Erfelijkheidsleer van Dr M. J. Sirks, f 3,—. Album Verkade, Paddenstoelen en Zeewateraquarium en Terrarium f 1,— per stuk. De bodem van Nederland van Prof. J. van Baren, f 10,—, 2 deelen. Porti voor koopers. Na 8 dagen geen bericht, dan verkocht.

Amsterdam Z., N. Amstellaan 83.

H. KLEIJN.