

VAN GROEI EN BLOEI EN JAARGETIJD.

Op 1 Juli 1941 was de klok nog niet heelemaal gelijk. Wel was als normaal de gewone Teunisbloem op 21 Juni in bloei gekomen en strooide de Gouwe rijpe zaden. Duinroosjes waren uitgebloeid $\pm$ 14 dagen later dan anders. De Hondсроos, die anders op 1 Juli zoowat uitgebloeid is, had nog een week te goed. Kamperfoelie stond flink in eersten bloei, was nog maar een week achter. De tweede bloei behoort normaal 15 Juli te beginnen, knoppen daarvoor waren 1 Juli reeds hier en daar eventjes te zien. Water- en oeverplanten vrijwel normaal o.a. Zwanebloem en Groote Lischdodde. Goed op tijd zijn ook: Vlier, Hoornpapaver, Parnassia, Goudhaver, Fransch Raygras, Kropaar, Trilgras, Boschandoorn.

Wintergroen en Liguster nog wat ten achter. Van 28 Juni tot 2 Juli weer nieuwe terugslag.

Dat de oever- en waterplanten langs den binnenduinrand zoo weinig afwijking bleven vertoonen is geen groot wonder. Zij profiteeren van het afvloeiende grondwater van de duinen, vooral daar, waar de hooge en breede massieven van den ooststrand nog niet te veel aangetast zijn door de aftapping voor de waterleidingen. Vijftig jaar geleden was de toestand veel gunstiger. Toen kon de heele binnenrand van het duin gelden als één groot brongebied en den heelen winter door, zelfs bij vrij strenge vorst, was daar op menige plaats nog levend, warm water en in droge zomers lag daar nog altijd een gordel van levend groen. Thans is dat heel wat minder, maar toch nog steeds goed merkbaar. Ook elders in ons land blijken de bronnen oasen te scheppen.

Iedereen heeft ook wel opgemerkt de schaarschte aan insecten en wel in het bijzonder het gebrek aan bloembestuiers. Het duurde tot heel achter in Maart, eer er wat leven in de brouwerij kwam en ook toen was het maar dunnetjes. Natuurlijk had daarvan in de eerste plaats onze Helmbloem te lijden, die kruisbestuiving niet kan missen. Toen medio April de Sachems zich begonnen te vertoonen waren sommige Corydalis al uitgebloeid en hadden dan ook geen vrucht gezet. Andere hielden het nog eenige weken vol, maar ook die gaven een misoogst. Ook Anemonen, Primula's, Salomonszegel gaven slechts middelmatige opbrengsten. Lelietjes van Dalen, die het vorig jaar de aandacht trokken door overvloed van prachtige roode bessen, staan er nu leeg en schamel bij. Ook Sleedoorn, Vogelkers, Lijsterbes vertoonen achterstand. Dag aan dag zag je geen enkel insect op het weelderig bloeiend Fluitekruid.

Zullen we het dit jaar weer zonder Stofzaad moeten stellen? De paddestoelen van den voorzomer zijn nu, half Juli, nog niet present en daarmee houdt het Stofzaad zich ook koest. Het was anders zoo'n prettige opleving in het saaie dennenbosch. En even goed als met de paddestoelen is het met de mossen ook maar dunnetjes. Goed opletten, wanneer en onder welke omstandigheden de herleving optreedt!

Normaal geeft Augustus ook altijd herleving te aanschouwen: de hernieuwe bloei van het hooiland en op de akkers waar de oogst is weggehaald (de echte driekleurige viooltjes op de Drentsche roggeakkers!), de groote tweede bloei van Pirola en Kamperfoelie, het bloeien van tweejarige planten in hun eerste jaar, dus „doorschieters” van Toorts, Teunisbloem, Slangenkruid, Hondstong, het bloeien van „verlate” éénjarigen of in het algemeen van planten, die in dit eigen jaar ontkiemd zijn. Ook nog bloei aan Sint Janslot en aan nieuwe loten van uitgebloeide tweejarigen, die eigenlijk hadden moeten afsterven. Een van de aardigste van deze rubriek is het Voorjaarshelmkruid dat door deze omstandigheid soms nog in October bloemen vertoont. Maar daarvoor moet de regen eerst nog optreden. Laat ons vooral het Dagboek voor 1941 goed bijhouden.

JAC. P. THIJSSSE.