

Soort	Aantal territoria	Gem. opp. in h.a.	Soort	Aantal territoria	Gem. opp. in h.a.
Grote lijster ¹⁾ . . .	1	7.43	Tjiftjaf	8	0.93
Zanglijster	12	0.62	Fitis	5	1.49
Merel	20	0.37	Spotvogel	2	3.71
Roodstaart	5	1.49	Winterkoning . . .	10	0.74
Nachtegaal ²⁾	0	—	Koolmees	17	0.44
Roodborst	6	1.24	Pimpelmees	20	0.37
Heggemus	1	7.43	Staartmees ³⁾ . . .	?	—
Tuinfluiser	9	0.83	Boomkruiper . . .	2	3.71
Zwartkop	1	7.43	Vink	4	1.86

1) Werd in deel A nu eens hier, dan daar gezien.

2) Vorig jaar broedvogel in verschillende paartjes!

3) Wel werden verschillende malen staartmezen in deel A waargenomen, doch dit waren waarschijnlijk de vogels van het nest dat even buiten Poelgeest op ± 50 m afstand in een peppel langs de Poelgeester weg lag. Dit nest zat tussen de stam en een zijtak, ± 3 m boven de grond. Als nestmateriaal was gebruikt: mos, strootjes, papier en spinrag(!). Verder veel veertjes. Op 19 Mei bevatte het nog vliegvlugge jongen. Op 21 Mei was het nest verlaten.

Joure, December 1943.

S. LAMMERS.

VAN GROEI EN BLOEI EN JAARGETIJD

De kardinaalsmutsmotjesrupsen raken volwassen in het begin van Juni en bewonen dan flink groote spinsels. Ze eten vooral 's nachts, overdag ook wel, maar een beetje sloom. Ze bouwen dan wel aan een nieuw spinzel, wanneer de bladeren in het oude allemaal zijn opgevreten. Dat stukje twijg ziet er dan vies uit: verwaarloosde spinzeldraden met gruis van uitwerpselen. Verleden jaar had een troepje net een mooi nieuw spinzel gemaakt toen een zomerstorm de heele boel stuk sloeg en toen die luwde ging de heele familie aan het verstellen. Ze zaten in rijen naast elkander, de koppen denzelfden kant uit en spinnen onverdroten zoodat in korten tijd het bouwsel er weer behoorlijk uitzag. Na nog een poosje gingen de volwassen rupsen afdalen naar den grond, om zich daar te verpoppen. Ze lieten zich neer langs een draad, soms één, soms meer tot een half dozijn toe, ieder aan zijn eigen draad, maar door de kronkelende bewegingen werden die draden tot een kabel en het werd toen een echte acrobatenvoortooning. Die kabels zijn heel sterk; ik heb ze beproefd en ze droegen met gemak vijftig gram; een enkele afzonderlijke draad tot twaalf gram.

Op het oogenblik dat de rupsjes hun veilig spinzelhuis verlieten om hun luchtreis te aanvaarden werd de een of ander opgepikt door een slimme groenvink. Maar dat was een uitzondering. Ook een glanskopmees en een stelletje wiewalen heb ik zich met deze rupsjes zien inlaten.

Soortgelijke verschijnselen kunnen we ook waarnemen bij de bladrollers van de eik.

JAC. P. THIJSSÉ.

ONZE ENQUÊTE'S

Wij hebben er heel wat aan de hand. Die naar de Kruisbekken en Pestvogels zijn nu voorloopig afgesloten; ik verwacht niet, dat we nog van een poging tot broeden van de Kruisbek zullen hooren. Van de IJsvogel weten wij nu, dat hij gelukkig nog lang niet is uitgestorven; misschien wil het Ornithologisch Station (genaamd Trekstation Texel) nu wel eens een telling ondernemen. Wel ontvangen wij graag bericht, wanneer er onverhoopt ergens nog jacht gemaakt wordt op IJsvogels.

Over het voorkomen van onze reptielen: Adder, Gladde slang, Ringslang, Duinhagedis, Kleine hagedis, Muurhagedis, Hazelworm, Moerasschildpad zijn al heel wat berichten ingekomen en nu ze weer ontwaakt zijn, verwacht ik er nog meer, liefst met de afmetingen. Ook graag berichten over adderbeet met al of niet ernstige gevolgen.

Dan hebben we de Bloedzuigers (zie vorige aflevering). Daarover kreeg ik alvast één heel mooi bericht van een van onze beste biologen. Hij schrijft: „Uit eigen bloederige ervaring kan ik uw verhaaltje uit de vorige aflevering bevestigen. Niet op Texel, maar in het „Malpivon bij Valkenswaard en het Sarsven bij Nederweert werd ik in 1932 en 1933, bij het „planktonvisschen met bloote beenen in het water staand, telkens onmiddellijk besprongen „door verscheidene groote zwarte bloedzuigers, die in een minimum van tijd sterk bloedende,