

VRAGEN EN KORTE MEDEDELINGEN

Zwarte kraai en Spreeuw. Bij het doornemen van vogellitteratuur las ik ook de mededeling van Prof. Dr. N. Tinbergen over de „Zwarte kraai met slechtvalkmanieren” (D.L.N. 56, 6). Daarin wordt vermeld hoe een kraai een Kievit aanvalt en dodelijk verwondt. In D.L.N. 56, 8, verteld Dr. D. M. de Vries over een jonge Houtduif, die in de lucht door twee Zwarte kraaien werd achtervolgd en ook op de grond werd gedood. Het roven van eieren en jonge vogels uit nesten, is van de kraai wel bekend. Maar het aanvallen van vliegende vogels schijnt weinig voor te komen. Dit jaar heb ik ook iets dergelijks waargenomen. Medio juni 1957 fietste ik op een middag omstreeks vijf uur te Amsterdam langs de Amstelveense weg nabij de stadswallen. Vanuit de bomen van de volkstuinten aldaar kwam een jonge Spreeuw aangevlogen, die achtervolgd werd door een volwassen Zwarte kraai. Achter de kraai vlogen weer een paar oudere Spreeuwen, die luid schreeuwend de kraai probeerden te hinderen bij zijn jacht. De kraai trachtte enkele keren met zijn snavel de jonge Spreeuw te raken, maar deze wist telkens de aanvalster te ontduiken. Na een paar honderd meter liet de jonge Spreeuw zich uitgeput in het gras vallen en werd door de kraai met enkele snavelhouten afgemaakt. Toen de kraai even later met zijn prooi wegvloog, verdwenen de oude Spreeuwen weer naar de volkstuinten.

J. REIJNDERS.

Bosgors? Woensdag 9 oktober jl. om pl.m. 11 uur trof ik in de tuin bij ons een Vink (wijfje) en een onbekende vinkachtige vogel. Deze was iets groter dan de Vink, die hij steeds wegpikte. In de korte ogenblikken, dat ik hem kon waarnemen, heb ik het volgende kunnen noteren: veel kastanjebruin, met zwart kuifje, witte bef, ring om de hals, vuil witte buik. Hij ging even later op een hekwerk zitten, de kuif was toen nagenoeg verdwenen. Daarna vloog hij weg en ik heb hem niet weer gezien, hoewel ik de omgeving nog afgezocht heb. Volgens de afbeelding in de verschillende boeken moet het een Bosgors geweest zijn. Maar daar dit een zeer zeldzame dwaalgast

is, die vijf keer in Nederland is waargenomen, twijfel ik wat. Maar het opzetten van de kuif moet een kenmerk van deze vogel zijn.

De gegevens, hierboven genoteerd, zijn te gering, maar ik vond de waarneming toch wel vermeldenswaard, daar er misschien meer meldingen binnenkomen, die de mijne kunnen bevestigen.

Wapenveld.

L. W. WILLEMS.

Drie Flora's. Als aanvulling op mijn artikel „Drie Flora's” in D.L.N. van oktober mogen de volgende opgaven dienen.

Agrimonia eupatoria (Agrimonie). Bij Sieringhoek, bij Ochtrup (Molenbelt en Weiner Esch) en bij Rheine.

Agrimonia odorata (Welriekende agrimonie). De Lutte (het Beernink, aan de Snoeiinkbeek en bij de voetbrug), het Agelerbroek en bij het Agelerbroek aan het kanaal.

Dryopteris oreopteris (Stippelvaren). Rheine, vrij zeldzaam (R), in Bentlage bij Rheine (R), Schotthok bij Rheine (R.).

Dryopteris thelypteris (Mcerasvaren). Dene-kamp (Strengveld).

Medicago × *varia* (Gele luzerne). Ochtrup (Weiner Esch). R. LUIKEN.

Noodlanding van Aardhommel. Ongeveer eind september zag ik vanuit mijn kamer een hommelmkoningin (*Bombus terrestris*), dus van de nieuwe generatie, aanvliegen op Oost-Indische kers. Vlak voor ze de bloemen bereikte stortte ze neer en bleef onder kramp-trekkingen op de grond liggen. Toen ik de hommel in een glazen potje bestudeerde zag ik, dat slechts twee mijten, die zich om de vleugelwortel bevonden, de oorzaak van het neerstorten moeten zijn geweest. Meer dan deze twee mijten kon ik aan de hommel niet ontdekken.

B. J. J. R. WALRECHT.

Rectificatie. In het artikel van B. J. J. R. Walrecht „De orde in de wanorde van het hommelnest” in het oktobernummer van dit jaar is een verkeerde regel ingevoegd. Voor regel 19 v.o. in de linker kolom van p. 234 leze men: honingcellen en broednest anderzijds de ... RED