

De vier hierboven genoemde *Medicago*-soorten werden aangetroffen in het materiaal, dat gebruikt werd bij de bewerking van dit geslacht voor de flora van Nederland. Zie voor nadere bijzonderheden *Acta Botanica Neerlandica* 7, 1958, p. 90—123, waar ook uitvoerige beschrijvingen en afbeeldingen van de soorten worden gegeven.

Ornithopus compressus L. var. *leiocarpus* Eig; Bennekom, in dennenaanplant, 2 juni 1957 (Ir. A. N. Koopmans en mej. J. A. C. Veth).

De typische variëteit van deze soort, die reeds in Nederland adventief was aangetroffen, heeft behaarde peulen; het bovengenoemde exemplaar daarentegen kale. *O. compressus* komt oorspronkelijk voor door het gehele Middellandse-Zeegebied; de var. *leiocarpus* werd beschreven uit Palestina.

Oenanthe aquatica (L.) Poir, met purperkleurige bloemen.

Door de heer R. Tolman werden in de laatste jaren op een aantal plaatsen aan of bij de kust van het IJsselmeer (Muiden, Eemnes, Spakenburg, Nijkerk, Putten) exemplaren van het Watertorkruid gevonden, met opvallend purper-

kleurige bloemen. Zij traden vooral in het najaar op; de heer Tolman spreekt zelfs van een herfst- en wintervorm.

Euphrasia borealis Townsend; Schiermonnikoog, 1925 (C. den Hartog en A. G. de Wilde); ook verzameld in 1956 (exc. Kon. Ned. Botanische Ver.).

Dr. de Wilde, die zich de laatste jaren bezig houdt met een studie van de in Nederland voorkomende ogentroostsoorten, geeft een uitvoerige bespreking van deze nieuwe vondst in *Acta Botanica Neerlandica* 7, 1958, p. 43—46.

E. borealis was tot nu toe bekend van Noord-Engeland, Schotland, Ierland, de Fär Öer, Denemarken en Noorwegen.

Ligustrum vulgare L. var. *chlorocarpum* Loud.; Westenschouwen, in de duinen, okt. 1957 (N. Lijssen).

Een exemplaar met groenblijvende bessen werd gevonden tussen talrijke andere met normale zwarte vruchten; deze var. werd nog niet eerder in de Nederlandse literatuur vermeld. Evenmin is dit het geval met een plant met gele bessen (var. *xanthocarpum* Loud.), die door de heer C. Sipkes in 1947 gevonden werd bij het Quackjeswater te Rockanje.

NIEUWE VONDSTEN VAN ZELDZAME PLANTEN IN NEDERLAND IN 1957

S. J. VAN OOSTSTROOM en TH. J. REICHGELT.
(Rijksherbarium, Leiden)

Behalve opgaven uit 1957, waarbij hieronder geen jaar is vermeld, bevat deze lijst ook een aantal oudere, nog niet eerder gepubliceerde vondsten, die van belang zijn voor de Nederlandse floristiek. Naast nieuwe vondsten van zeldzame soorten werden ook een aantal vermeldenswaardige nieuwe vindplaatsen van minder zeld-

zame opgegeven. Evenals voorheen houden wij ons ook nu weer aanbevolen voor toezending van materiaal en voor opgave van vindplaatsen aan ons adres, Rijks-herbarium, afdeling Nederland, Nonnensteeg 1, Leiden.

Voor de namen van vaak in de lijst voorkomende vinders zijn de volgende afkor-

tingen gebruikt: (B.) voor Dr. D. Bakker te Ens, NO-Polder; (B. v. d. B.) voor Dr. R. C. Bakhuizen van den Brink te Leiden; (F.) voor D. Franke te Eernewoude, Fr.; (G.) voor H. Gaasenbeek te 's-Hertogenbosch; (I.V.O.N.) voor Excursie Instituut voor het Vegetatie-onderzoek van Nederland; (M. T. J.) voor M. T. Jansen te Veenendaal; (de J.) voor Prof. Dr. S. E. de Jongh te Leiden; (K.) voor J. H. Kern te Leiden; (v. L.) voor Chr. G. van Leeuwen te Utrecht; (v. O.) voor Dr. S. J. van Ooststroom te Oegstgeest; (v. d. P.) voor D. T. E. van der Ploeg te Murmerwoude, Fr.; (R.) voor Th. J. Reichgelt te Leiden; (Unio) voor Excursie Kon. Ned. Botanische Ver.; (de V.) voor A. de Visser te St. Laurens, Zeel.; (v. d. V.) voor E. E. van der Voo, Stichting Onderzoek Levensgemeenschappen, te Woerden; (W.) voor Dr. V. Westhoff te Driebergen.

Lycopodium complanatum L. var. *chamaecyparissus* (A. Br.) Döll; Paardeslenkten ten NO van Vasse, Ov. (v. O.). Niet vermeld op verspreidingskaartje in Ned. Kruidk. Arch. 50, 1940, p. 408.

Equisetum arvense L. $\times$ *E. fluviatile* L. (*E. $\times$ litorale* Kühlew.); Tietjerk, Fr., langs spoorweg, 1956 (v.d.P.).

Equisetum hyemale L.; Eexterveld, Dr. (R. Hoogervorst).

Equisetum variegatum Schleich.; oude zand- en kleigroeve ten ZO van Asperen aan de Groene dijk (v. L. en W.).

Asplenium adiantum-nigrum L.; Veenendaal, op muur bij het station (M. T. J. en J. A. E. de Kleuver).

Asplenium trichomanes L.; Veenendaal, op muur bij het station, 1956 (M. T. J. en v. d. P.); Neerijnen, op muur (M. T. J.); Utrecht, walkant, 1954 (G.).

Athyrium filix-femina (L.) Roth; Utrecht, walkant, 1954 (G.).

Dryopteris filix-mas (L.) Schott; als voren.

Dryopteris linnaeana C. Chr.; Zeijer Stroot, tussen Zeijen en Vries, Dr. (G.).

Dryopteris thelypteris (L.) A. Gray; Monnikendam, 1952 (J. Reijnders); Gouda, walkant, 1952 (J. Reijnders); id., 1953 en 1954 (G.); Dordrecht, 1953 (J. J. Guittart en v. O.). Zie D.L.N. 55, 1952, p. 180 en 220.

Matteucia struthiopteris (L.) Trodaro; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).

Ophioglossum vulgatum L.; oude zand- en kleigroeve ten ZO van Asperen, aan de Groene dijk (v. L. en W.).

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.; Middelburg, spontaan in kas van kwekerij (de V.).

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn; Leiden, opgespoten bouwterrein (de J.); Dordrecht, op kademuur (J. Guittart, K., R. en mej. B. Sinnema).

Viscum album L.; Gendringen, bij boerderij achter Engbergen, op appel (W. Anema); Utrecht, aan oude Vleutense weg, op populier, 1956 (Fr. Alexander).

Polygonum cuspidatum Sieb. & Zucc.; Brummen, stationsterrein (B. v. d. B.). Zie ook Corr. bl. Floristiek etc. van Nederland no. 6, 1957, p. 68.

Polygonum sachalinense F. W. Schmidt; Kortenhoef, op legakker in een der plassen, veel (R.).

Rumex thyrsiflorus Fingerh.; Bloemendaal, bij meertje van Caprera (B. J. Wieland Los).

Rumex triangulivalvis (Dans.) Rech. f.; Oostelijk Flevoland, buitendijkse stortgrond ten NO van het gemaal Lovink (B.).

Chenopodium berlandieri Moq.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.); Oostelijk Flevoland, op-

- gespoten buitendijks terrein bij Harderwijk, 1956 (B.); Eysden, aan de Maasoever (M. T. J. en v. d. P.).
- Chenopodium pumilio* R. Br.; Herperduin, N. Br., de Heuvels (Dr. A. G. de Wilde).
- Chenopodium vulvaria* L.; Leiden, stortterrein aan de Zijl (W. Vader en W. J. J. O. de Wilde). Deze soort werd in 1840 ook al eens bij Leiden gevonden.
- Halimione pedunculata* (L.) Aellen; Westenschouwense Inlaag (v. L. en W.). Niet vermeld op verspreidingskaartje in Ned. Kruidk. Arch. 52, 1942, p. 431.
- Monolepis trifida* (Trev.) Schrad.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Amaranthus angustifolius* Lamk. var. *silvester* (Vill.) Thell.; Oss, losterrein van de spoorwegen (de J.).
- Amaranthus blitoides* S. Wats.; Leiden, stationsterrein, 1951 (Dr. W. Vervoort).
- Amaranthus hybridus* L.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F., M. T. J. en v. d. P.); Veenendaal, woladventief (M. T. J.).
- Claytonia sibirica* L.; Donkerbroek, Fr., aan bospad, vele exx. (F.); Bakkeveen, Fr., bij landhuisje in bos (F.).
- Agrostemma githago* L.; Wijnbergen, gem. Bergh, Gld., veel in roggeveld (W. Anema).
- Dianthus deltoides* L.; tussen Exlo en Buinen (de J.).
- Dianthus deltoides* L. var. *glaucus* (L.) Ser.; Hilversum (J. van der Veen).
- Silene armeria* L.; Ederveen, Slaperdijk, ruderaal (E. van Veldhuizen; opg. (M. T. J.)).
- Silene gallica* L., stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F., M. T. J. en v. d. P.).
- Stellaria nemorum* L.; tussen Brummen en Eerbeek, schaduwrijke slootkant langs bos (B. v. d. B.).
- Vaccaria pyramidata* Med.; Doesburg, losterrein (I.V.O.N.).
- Anemone apennina* L.; Neerijnen, bos (M. T. J.).
- Anemone ranunculoides* L.; Oud-Zuilen, gem. Maarsen, in bos (D. van Delen).
- Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt.; 's-Gravenhage, Westduinen, 1956 (R. M. van Urk).
- Ceratophyllum submersum* L.; Anjum, Fr. (O. Hoekstra en v. d. P.).
- Corydalis cava* (L.) Schw. & Körte; Neerijnen, bos (M. T. J.).
- Eschscholtzia californica* Cham.; Borger, akkerrand (de J.).
- Brassica juncea* (L.) Czern. & Coss.; Doesburg, losterrein (I.V.O.N.); Andel aan de Maas, bij graansilo (Unio).
- Hirschfeldia incana* (L.) Lagrèze—Fossat; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (Plantenziektenkundige Dienst); Doesburg, losterrein (I.V.O.N.); Cadzand, ruderaal terrein, 1956 (de V.).
- Lepidium neglectum* Thell.; Oosterwijk, gem. Kedichem, vuilnisbelt (Unio).
- Lepidium perfoliatum* L.; Doesburg, losterrein (I.V.O.N.).
- Nasturtium officinale* R. Br.; aanvullingen op het verspreidingskaartje in Acta Bot. Neerl. 5, 1956, p. 105; Dalem, Gld., aan de N-oever van de Merwede (Unio); ten W van Gorinchem, in de Avelingen (Unio); Sleeuwijk, grienden aan de Merwede (Unio); Woudrichem, aan de Maas bij het veer naar Loevestein (Unio); ten W van Veen, uiterwaard aan de Maas (Unio); Pezaken, gem. Gulpen, aan beekje bij het kasteel (M. T. J. en v. d. P.).
- Rorippa austriaca* (Crantz) Besser; griend aan de Waal ten O van Loevestein

- (Unio); Vuren, aan de Waal, bij steenfabriek (Unio).
- Rorippa prostrata* (Bergeret) Sch. & Thell.; opgespoten zandgrond ten W van Gorinchem (Unio).
- Elatine hexandra* (Lapierre) DC.; wiel bij Nieuwkuik (v. L.).
- Sedum spurium* Bieb.; Mheer, L., wegberm (M. T. J.); Reijmerstok, L., wegberm (M. T. J.).
- Tolmiea menziesii* (Pursh) Torr. & Gray; Zwartewegsend, Fr., in het bos Vijversburg, al sedert vele jaren (v. d. P.); Ede, Gld., in een bos (Mevr. A. A. Zwart—de Graaf).
- Agrimonia odorata* (Gouan) Mill. De opgaven in de Nederlandse literatuur van *A. eupatoria* L. voor Friesland en aangrenzend Groningen blijken groten-deels betrekking te hebben op *A. odorata*. Zie Corr. bl. Floristiek etc. van Nederland no. 7, 1958, p. 77; no 8, 1958, p. 94.
- Cotoneaster horizontalis* Dcne.; Dordrecht, kademuur (J. Guittart, K., R. en mej. B. Sinnema).
- Filipendula vulgaris* Moench; Gennep, bij Zonlichtheide (v. L. en W.). Deze soort, waarvan werd vermoed, dat zij uit de Nederlandse flora was verdwenen, werd in 1957 in de nabijheid van de vroegere vindplaats teruggevonden.
- Fragaria moschata* Duch.; Neerijnen, bos (M. T. J.); Zoelen, bos (M. T. J.); Echteld, bos (M. T. J.).
- Potentilla norvegica* L.; bij leemaafgraving Rode Veld bij Volthe, gem. Weerselo, Ov., talrijk (v. O.).
- Rosa afzeliana* Fr.; Elst, Utr. (M. T. J.).
- Rosa micrantha* Sm.; Rhenen Donderberg (J. A. E. de Kleuver; opg. M. T. J.).
- Medicago spec. div.* Voor nieuwe vindplaatsen van reeds uit Nederland bekende soorten verwijzen wij naar Acta Bot. Neerl. 7, 1958, p. 90—123.
- Trifolium micranthum* Viv.; zandige ZW-helling van de Bentsdijk, gem. Ambt Vollenhove (B.).
- Trifolium ornithopodioides* L.; Terschelling, bij Midsland, zonder datum (J. B. Tijm); Oranjezon, gem. Vrouwenpolder, vroonduinen (de V.); Oostkapelle, vroonduinen (de V.). Op de laatstgenoemde plaats werd de soort in 1879 verzameld; nadien niet meer tot zij in 1957 werd teruggevonden.
- Trifolium resupinatum* L.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F.); Hoedekenskerke, stortplaats, 1956 (de V.).
- Trifolium scabrum* L.; Cadzand, grazige duinen (de V.).
- Trifolium subterraneum* L.; Langendam, gem. Graauw, dijkhelling (de V.).
- Trifolium vesiculosum* Savi; Middelburg, terrein van de voormalige meelfabriek (de V.).
- Vicia lutea* L.; Dokkum, langs spoorweg (O. Hoekstra en v. d. P.).
- Lythrum virgatum* L.; Brummen, stortplaats bij station (B. v. d. B.).
- Anoda cristata* (L.) Schlechtend. (A. lavateroides Med.); stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F., M. T. J. en v. d. P.).
- Erodium moschatum* (L.) L'Hérit. ex Ait.; Veenendaal, woladventief (M. T. J.).
- Geranium phaeum* L.; Linschoten, bij boerderij De Nes (v. d. V.).
- Geranium pratense* L.; langs spoorlijn bij Didam (W. Anema); Hummel, bos van Enghuizen (I.V.O.N.); Veenendaal, stationsterrein (M. T. J.); Woudrichem, aan de mond van de Maas (Unio).
- Impatiens glandulifera* Royle; Maasoeveren tussen Eysden en Maastricht (M. T. J.).

- en v. d. P.). Zie ook Corr. bl. Floristiek etc. van Nederland no. 6, 1957, p. 68.
- Cornus alba* L.; Nieuweramstel, aan de Amstel (H. H. Prell); Dordrecht, kade-muur (J. Guittart, K., R. en mej. B. Sinnema).
- Ammi majus* L.; Wageningen, haven (M. T. J.).
- Angelica archangelica* L.; Scheelhoek bij Stellendam (v. L.).
- Crithmum maritimum* L.; bij Nieuwe Sluis, gem. Groede, 1955 (P. van de Vyvere).
- Petroselinum segetum* (L.) Koch; op de dijk van de Zwarte Polder, gem. Nieuw-vliet, Zeel., 1956 (P. van de Vyvere); id., 1957 (de V.).
- Sanicula europaea* L.; bos bij Nietap, ten Z van Leek, 1948 (J. van Borssum Waalkes); id., 1957 (Dr. F. M. Muller).
- Torilis leptophylla* (L.) Rchb.; Doesburg, losterrein (I.V.O.N.).
- Clethra alnifolia* L.; Baarn, Groenendaal, verwilderd (K.W. van der Meer).
- Erica tetralix* L., met sterk verlengde bloei-wijze; Terschelling, Bosplaat (v. L.).
- Oxycoccus macrocarpus* (Ait.) Pers.; veentje ten NW van Vries, Dr. (G.).
- Vaccinium myrtillus* L. $\times$ *V. vitis-idaea* L. (*V. \times intermedium* Ruthe); Imbosch, Veluwe, talrijk (B. v. d. B.).
- Vaccinium uliginosum* L.; Terschelling, ten W van de Badweg, bij paal 8 (W. Boer Leffef); ten Z van Weldam, gem. Diepenheim, 1956 (J. Wartena).
- Ipomoea purpurea* (L.) Lamk.; stort-terrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Cuscuta campestris* Yuncker; Rotterdam-Zuid, in tuin, op *Callistephus chinensis* (L.) Nees (H. W. Vink).
- Cuscuta lupuliformis* Krocke; Vuren, aan de oever van de Waal (Unio).
- Lappula myosotis* Moench; Doesburg, los-terrein (I.V.O.N.).
- Datura ferox* L.; Leiden, stortterrein aan de Zijl (Prof. Dr. R. Hegnauer en de J.).
- Solanum dulcamara* L., met ongeveer witte bloemkroon, zonder vlekken aan de voet; Hoorn (W. Porte).
- Solanum nitidibaccatum* Bitter; Ewijkse Waard (Dr. A. G. de Wilde).
- Solanum rostratum* Dunal; Veenendaal, stortterrein (M. T. J.).
- Gratiola officinalis* L.; wiel bij Nieuw-kuik (v. L.).
- Limosella aquatica* L.; Oostelijk Flevoland, kavelstrook langs de dijk tussen Roggebotsluis en Elburg (B.). Vgl. D.L.N. 57, 1954, p. 237.
- Linaria elatine* (L.) Mill.; Rafelder, gem. Gendringen (W. Anema); kleigroeve Havikerwaard bij Ellekom (v. L.).
- Linaria repens* (L.) Mill.; bij kasteel Zilven tussen Eerbeek en Loenen (B. v. d. B.).
- Linaria spuria* (L.) Mill.; Rafelder, gem. Gendringen (W. Anema); kleigroeve Havikerwaard bij Ellekom (v. L.).
- Veronica anagallis-aquatica* L. $\times$ *V. catenata* Pennell (*V. \times lackschewitzii* Keller); Delft, in sloten, zonder datum (Dr. H. M. de Witt Hamer); Dordrecht, 1916 (onbekende verzamelaar).
- Veronica montana* L.; Denekamp, Borgbos (v. O.).
- Veronica peregrina* L.; Doesburg, langs de IJssel (I. V. O. N.).
- Utricularia intermedia* Hayne; Valkenswaard, Vaarven (J. van Donselaar en v. d. V.).
- Verbena officinalis* L.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Salvia nemorosa* L.; duinen van de Amsterdamse Waterleiding, Zandvoort vlakje (J. H. Wieffering).

- Salvia verticillata* L.; Wassenaar, Meyendel, 1956 (Ir. J. H. A. Boerboom).
- Stachys palustris* L. $\times$ *S. sylvatica* L. (*S. $\times$ ambigua* Sm.); Beverwijk (W. J. J. O. de Wilde).
- Plantago indica* L.; Piekenwaard bij Alem (Dr. A. G. de Wilde).
- Vinca minor* L.; Neerijnen, bos, 1919 (Dr. L. S. Wildervanck); id., 1957 (M. T. J.).
- Asperula odorata* L.; Neerijnen, bos (M. T. J.).
- Galium mollugo* L. $\times$ *G. verum* L. (*G. $\times$ ochroleucum* Wolff); aan de weg Dene-kamp-Oldenzaal, bij Beuningen (v. O.).
- Linnaea borealis* L.; boswachterij Gieten (G.); ten W van Hoekenbrink, Die-verder zand, Dr. (D. J. Rypkema).
- Lonicera caprifolium* L.; Neerijnen, bos, verwilderd, 1919 (Dr. L. S. Wildervanck); id., 1957 (M. T. J.).
- Dipsacus sativus* (L.) Scholler; Leiden, stortterrein aan de Zijl (de J. en R.).
- Campanula latifolia* L.; Neerijnen, bos (M. T. J.).
- Phyteuma nigrum* F. W. Schmidt; Varsseveld, in en bij het Idinkbos (W. Anema).
- Ambrosia elatior* L.; Schaykse Hoek bij Schayk (Dr. A. G. de Wilde).
- Ambrosia psilostachya* DC.; Putten, Gld., 1940 (H. H. Prell); Druten, aan de Waaloever ten W van het veer naar Ochten (Dr. A. G. de Wilde); Oegstgeest, met zand aangevoerd (v. O.).
- Ambrosia trifida* L.; Leiden, stortterrein aan de Zijl (Prof. Dr. R. Hegnauer en de J.).
- Arctium tomentosum* Mill.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Arnica montana* L.; Varsseveld, Noorderbroek (W. Anema).
- Aster novi-belgii* L.; Borger, Dr., slootkant (de J.).
- Bidens connatus* Mühlenb. var. *anomalus* Farwell; Zwijndrecht, balkenhaven (J. Guittart, K., R. en mej. B. Sinnema); Dordrecht, balkenhaven (idem).
- Carduus crispus* L. $\times$ *C. nutans* L. (*C. $\times$ polyacanthus* Schleich.); Piekenwaard bij Alem (Dr. A. G. de Wilde); bij Fort St. Andries (idem).
- Carduus tenuiflorus* Curt.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (Plantenziektenkundige Dienst); Veenendaal, woladventief (M. T. J.).
- Centaurea solstitialis* L.; Heeswijk, gem. Linschoten, terrein van steenfabriek (A. Verhart).
- Chrysanthemum myconis* L.; Hulsberg, L., in boomgaard (Plantenziektenkundige Dienst).
- Crepis setosa* Hall. f.; Oude Pekela, aan nieuwe verkeersweg, met graszaad aangevoerd (opg. J. M. Duiven); Enschede, spontaan in tuin (J. Bol); dijk van de Zwarte Polder, Nieuwvliet, Zeel., 1955 (de V.).
- Doronicum willdenowii* Rouy; Neerijnen, bos, 1919 (Dr. L. S. Wildervanck); id., 1957 (M. T. J.).
- Galinsoga ciliata* (Raf.) Blake; Brummen, vuilstortplaats bij station (B. v. d. B.).
- Guizotia abyssinica* (L.) Cass.; Veenendaal, stortterrein (M. T. J.); Reijmerstok, L., wegberm (M. T. J.); Eysden (M. T. J. en v. d. P.).
- Helianthus laetiflorus* Pers.; Veenendaal, verwilderd (M. T. J.).
- Helianthus tuberosus* L.; tussen Obbicht en Grevenbicht, aan de Maasoever, vele exx., 1955 (I.V.O.N.); Meers, L., aan de Maasoever (I.V.O.N.); tussen Eysden en Maastricht, aan de Maasoever, op vele plaatsen (M. T. J. en v. d. P.).
- Hieracium amplexicaule* L.; Valkenburg.

- op muur langs de Geul (M. T. J. en v. d. P.).
- Inula racemosa* Hook. f.; Noordwijk-Binnen, wegrand (W. J. C. de Koning).
- Iva xanthiifolia* (Fresen.) Nutt.; Heinkenszand, in kippenloop (de V.).
- Lactuca virosa* L.; Oranjezon, gem. Vrouwenpolder, waterleidingduinen, langs de rand van een bomtrechter (de V.).
- Leontodon autumnalis* L. var. *uniflorus* v. d. Bosch; Beetsterzwaag, in weiland aan de Boorn (v. d. P.).
- Picris echioides* L.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Rudbeckia laciniata* L.; Hollandsche Rading, aan bosrand, 1946 (H. H. Prell). Zie ook Corr. bl. Floristiek etc. van Nederland no. 6, 1957, p. 69.
- Senecio erucifolius* L. var. *bipinnatifidus* Van Ooststr.; aan de Lange Dijk ten ZW van Asperen (Unio).
- Silybum marianum* (L.) Gaertn.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F., M. T. J. en v. d. P.).
- Tagetes minuta* L.; Veenendaal, woladventief (M. T. J.).
- Tragopogon dubius* Scop.; Nieuwe Sluis, gem. Groede, in de duinen ten W van het afwateringskanaaltje (de V.).
- Scilla italica* L.; Beverwijk (W. J. J. O. de Wilde). Reeds in 1931 vermeld; in 1956 nog ca. 500 exx., in 1957 verdwenen door vergraving van het terrein.
- Trillium erectum* L., met paarse en met witte bloemen; Laren, N.H., in bos (leerling van de heer J. G. de Heer).
- Tulipa sylvestris* L.; Neerijnen, bos (M. T. J.).
- Leucojum aestivum* L.; noordelijke Lingeoever bij Spijk (J. Entrop).
- Juncus filiformis* L.; A-polder bij 's-Hertogenbosch, Bossche Broek (v. L.).
- Juncus subnodulosus* Schrank; Terschelling, vochtige vallei ten Z van het Wietduin, Groede (B. en W.).
- Juncus tenuis* Willd.; Kornwerderzand, sluisput, 1929 (Mevr. D. Koopmans—Forstmann en Ir. A. N. Koopmans). Niet vermeld op verspreidingskaartje in Ned. Kruidk. Arch. 51, 1941, p. 464.
- Luzula luzuloides* (Lamk.) Dandy & Wil-mott; Baarn, bos bij De Roskam, 1946 (H. H. Prell).
- Carex appropinquata* Schum.; moeras-gebied bij De Punt (G.); aan het Lieverderdiepje, Dr. (v. L.); aan het Peizerdiep, ten Z van de weg Roden—Lieveren (Dr. F. M. Muller).
- Carex aquatilis* Wahlenb.; Groningen, slootkant ten Z van het Winschoter-diep en ten O van Gideon (Dr. F. M. Muller); Tolberter Petten (v. L.); Linde-vallei, Driessenpolder (Mevr. I. Quené—Boterenbrood); Loon, Dr., aan het Lonerdiep (G.); tussen Frederiks-oord en Wapserveen, ten Z van de Wapserveense A. in petgat (B. en A. C. Boer); langs de Baarwel, OZO van Beilen, verlande plas (B.); tussen Steg-gerda, Fr. en Hoeve (petgat (B. en A. C. Boer); langs de Leemweg bij Steg-gerda, uitgeveende heiplas (B. en A. C. Boer); tussen Eesveen en Steenwijk, ten N van de Steenwijker A. aan veen-sloot (B.).
- Carex extensa* Good.; Colijnsplaat, inlaag (de V.).
- Carex flava* L.; Gameren, komgrondgras-landen ten ZW van de eendenkooi (v. L.).
- Carex pairaei* F. W. Schultz; Zeddam, molenberg, vele exx., 1954 (Dr. F. M. Muller).
- Carex paniculata* L. $\times$ *C. remota* L. (*C. $\times$ boeninghausiana* Whe.); Remmerden, gem. Rhenen (M. T. J. en de J.); Rens-

- woude, kasteelpark (M. T. J.).
- Carex sylvatica* Huds.; bos bij Nietap, ten Z van Leek, 1948 (J. van Borssum Waalkes); id., 1957 (Dr. F. M. Muller); Angerlo, bosjes aan de Pierikse straat (I.V.O.N.); Zoelen, bos (M.T. J.); Maarsen, Utr., bos bij kasteel Doornburg (W.).
- Carex vulpina* L.; Angerlo, greppelrand aan de Pierikse straat (I.V.O.N.).
- Scirpus americanus* Pers.; Oostelijk Flevoland, kwelstrook ten ZW van Elburg (B.).
- Aegilops cylindrica* Host; Oostelijk Flevoland, ten NO van het gemeal Stroink (B.).
- Avena byzantina* C. Koch; Leiden, stortterrein aan de Zijl (de J.).
- Brachypodium distachyon* (L.) P.B.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F., M. T. J. en v. d. P.).
- Brachypodium pinnatum* (L.) P. B.; Linschoten, Linschoterbos (v. d. V.).
- Bromus erectus* Huds.; Herwijnen, Gld., zuidhelling van de Nieuwe Zuider Lingedijk, talrijk (v. L. en W.).
- Bromus macrostachys* Desf.; Veenendaal, woladventief (M. T. J.).
- Bromus unioloides* H. B. K. (B. catharticus auct. an Vahl?); Veenendaal, woladventief (M. T. J.).
- Deschampsia setacea* (Huds.) Hack; Ossendrecht, ven bij de Hoogerheidse Plantage (v. d. V.).
- Digitaria adscendens* (H.B.K.) Henr.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F., M. T. J. en v. d. P.).
- Elymus canadensis* L.; Wageningen, stortplaats van graanafval (A. A. Kruijne).
- Glyceria declinata* Bréb.; Hoog-Keppel, aan bospad (I.V.O.N.).
- Hordeum marinum* Huds. subsp. *gussoneanum* (Parl.) Thell.; Veenendaal, woladventief (M. T. J. en de J.).
- Lagurus ovatus* L.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Panicum capillare* L.; als voren.
- Phalaris minor* Retz.; als voren.
- Poa chaixii* Vill.; Gennep, bos van Zonlichtheide (v. L. en W.).
- Polypogon monspeliensis* (L.) Desf.; Veenendaal, woladventief (M. T. J.); Rotterdam, Vondelingenplaat (R. Lat-houwers).
- Puccinellia fasciculata* (Torr.) Bicknell; Oostelijk Flevoland, zandvlakte ten W van de zandplaat „Het Spijk”, 1 ex. samen met verscheidene exx. van *P. distans* (L.) Parl. en *P. retroflexa* (Curt.) Holmb. (B.).
- Epipactis palustris* (Mill.) Crantz; oude zand- en kleigroeve ten ZO van Asperen, aan de Groene dijk (J. Entrop).
- Goodyera repens* (L.) R. Br.; Groene Pollen bij West-Terschelling, 1956 (W. Boer Leffef), reeds vermeld in D.L.N. 59, 1956, p. 264; Terschelling, langs Longway (W.); Norg, Tonckensbos (R. Hoogervorst).
- Orchis morio* L.; Gamenen, komgrondgraslanden ten ZW van de eendenkooi (v. L.).
- Arum italicum* Mill.; Aardenburg, Elderschans (de V.).

