



Fig. 2. Vangsten op De Horst. A = Bosmuis, C = Rosse woelmuis, T = totaal.

Grootste vangst op dinsdag en een andere dag:	5 maal
Grootste vangst op woensdag:	3 maal
Grootste vangst op woensdag en een andere dag:	1 maal
Rest:	0
Rosse woelmuis. Grootste vangst op dinsdag:	9 maal
Grootste vangst op dinsdag en een andere dag:	4 maal
Grootste vangst op woensdag:	1 maal
Rest:	0

Overduidelijk blijkt de vangst onmiddellijk na het weekeinde het grootst om in de loop van de week af te nemen.

De verklaring zou dus kunnen zijn: na de vangstonderbreking hebben de dieren hun schuwheid verloren en lopen daardoor op de eerste vangdag, dinsdag, gemakkelijk in de val. 's Woensdags vangt men mogelijk de dieren die de vorige dag niet aan

bod kwamen, hardleers zijn of door het toeval niet in de buurt van een val waren geweest.

Tegen het einde van de week hebben de meeste dieren weer enige recente ervaring met de vallen en blijven de vangsten laag. De bijzonder hoge pieken na een langere vangstonderbreking worden mogelijk veroorzaakt door het feit dat dan (bijna) alle dieren hun ervaringen vergeten zijn en de hele populatie dus weer vangrijp is. Enkele dagen zou voor een aantal exemplaren te kort kunnen zijn om de onaangename ervaringen te vergeten.

De verkregen resultaten zouden er op kunnen wijzen dat het geheugen van *Apodemus sylvaticus* beter is dan dat van *Clethrionomys glareolus*; de Rosse woelmuis wordt immers op dinsdag veel meer gevangen dan de Bosmuis, m.a.w. meer Rosse woelmuizen dan Bosmuizen zijn hun ervaringen vergeten.

Bovenvermelde gegevens en conclusies zijn uiteraard van betrekkelijke waarde, ze hebben slechts betrekking op één populatie van elke soort en zijn gebaseerd op de waarnemingen van een half jaar. Met mogelijke andere biotische of abiotische factoren is niet of nauwelijks rekening gehouden. Het was echter uitsluitend de bedoeling van schrijver dezes het verschijnsel te signaleren, in deze geest (informatief) dient dit artikeltje dan ook te worden opgevat.

Vragen en korte mededelingen

Vondsten van de Braam, *Brama raii* (Bloch), in Zeeland. De recente vondst van een fraai exemplaar van de Braam, aangespoeld op het strand tussen Domburg en Westkapelle, was voor mij aanleiding om de Zeeuwse vondsten van deze vissoort in een lijstje samen te stellen. De heren Drs. H. Nijssen (Zoölogisch Museum, Amsterdam) en Dr.

M. Boeseman (Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden) dank ik voor de opgaven uit de door hen beheerde vissencollecties.

Gestrand bij Zoutelande, 8.XII.1937, lang 49 cm (thans in Zeeuws Museum, Middelburg) (Redeke, Fauna v. Nederland, vol. 10, 1941, blz. 191)

Gestrand bij Domburg, 14.XI.1952, lang 55, hoog

23 cm, leg. B. J. J. R. Walrecht (thans in Rijksmuseum v. Natuurlijke Historie, Leiden) (Prov. Zeeuwse Ct. 20.XI.1952)

Gestrand bij Domburg, 8.XI.1955, lang 53, hoog 22 cm (thans in Zoölogisch Museum, Amsterdam)

Gestrand bij Oranjestad, 11.XII.1955, leg. G. J. M. de Grees (thans in Rijksmuseum v. Natuurlijke Historie, Leiden)

Gestrand tussen Domburg en Westkapelle, 15.XI.1967, lang 55, hoog 22 cm, leg. J. Warners (thans in Zoölogisch Museum, Amsterdam)

Het zijn allen volwassen exemplaren. De data liggen tussen 8 november en 11 december.

Voor afbeeldingen van de Braam en voor vermelding van andere vondsten aan onze kust verwijs ik naar:

Kristensen, I., 1950. Ray's Braem, *Brama raii* (Bloch). Amsterdam Natur. 1 : 49-52.

Nijssen, H., 1966. Zeevissen. Wetensch. Meded. Kon. Ned. Nat. Hist. Ver. no. 65, 68 blz.

Redeke, H. C., 1941. Vissen. Fauna v. Nederland, vol. 10, 331 blz.

Domburg. W. S. S. VAN BENTHEM JUTTING.

Vogelwerkgroep voor het Deltagebied. De verandering door de Deltawerken van de zoute en brakke getijden-wateren in het Deltagebied in zoete stilstaande meren zal grote gevolgen hebben voor de flora en fauna. Ook de vogelwereld zal hiervan sterk de invloed ondervinden.

Door de afdeling Delta-Onderzoek van het Hydrobiologisch Instituut is de laatste jaren enig oriënterend ornithologisch onderzoek verricht. Te noemen zijn bijvoorbeeld onderzoek naar het voorkomen van Rotganzen, tellingen van wadvogels in het hele Deltagebied en tellingen van het aantal broedparen van de Kluut in het Deltagebied. De resultaten hiervan zullen binnen afzienbare tijd worden gepubliceerd in diverse tijdschriften. Hieruit is gebleken dat tijdens de uitvoering van de Deltawerken een rijk veld van ornithologisch onderzoek in het Deltagebied braak ligt. Het Instituut in Yerseke, dat vooral op hydrobiologisch terrein werkt, ontbreekt het echter aan de tijd en aan de mensen om dit braakliggende veld te ontginnen.

Het is hierom dat wij een beroep willen doen op de medewerking van serieuze amateurs om zoveel mogelijk onderzoek tijdens dit grote biologische experiment, dat de Deltawerken eigenlijk zijn, te kunnen verrichten. Dergelijk onderzoek kan zuiver wetenschappelijk van belang zijn, maar het kan ook waardevolle argumenten voor het natuurbehoud

opleveren, bijvoorbeeld voor het scheppen van reservaten voor bepaalde vogelsoorten.

Hierom willen wij overgaan tot het oprichten van een „Vogelwerkgroep voor het Deltagebied”, waarvan het secretariaat op het Hydrobiologisch Instituut in Yerseke zal zijn gevestigd, maar waarvan het bestuur uit de medewerkers zal zijn samengesteld. Mocht u belangstelling voor deze werkgroep hebben en er van overtuigd zijn dat u er ook een deel van uw tijd aan zult besteden, dan verzoeken wij u om u op te geven als medewerker bij ondergetekende. U ontvangt dan t.z.t. een uitnodiging voor de oprichtingsvergadering. Kosten zijn aan het lidmaatschap niet verbonden, wel zullen de medewerkers de publikaties van de werkgroep ontvangen.

Als mogelijkheden voor onderzoek willen wij noemen: in de eerste plaats het vastleggen van de ornithologische situatie op het ogenblik op de verschillende eilanden in de vorm van lokale avifauna's. Een goed voorbeeld hiervan is de publikatie van de heer H. Enkelaar over de Avifauna van West-Zeeuws-Vlaanderen, 1957-1967. Deze avifauna's kunnen dan verder dienen als uitgangspunt bij het volgen van de veranderingen. Aangezien het Hydrobiologisch Instituut in Yerseke over zeer veel gegevens over het voorkomen van de voedseldieren en -planten van vogels beschikt, zal het ook mogelijk zijn om het voorkomen van bepaalde vogelsoorten te correleren met het voorkomen van hun voedsel. Voor de Rotgans konden wij hierdoor reeds een interessante correlatie vastleggen. Dergelijke verbanden kunnen waarschijnlijk ook gelegd worden voor vele steltlopers, eenden en andere ganzen. Waarom komen er bijvoorbeeld zo weinig Brandganzen in de Biesbosch voor? Een verder punt is waar de grote aantallen broedvogels van pas drooggevalen platen in afgesloten zeearmen (Braakman, Veerse Meer) vandaan komen. Voor de Kluut lijkt het er op dat er in normale jaren een niet-broedende reserve in de broedpopulatie voorkomt. Bij het afsluiten van de Grevelingen zou dit bestudeerd kunnen worden. In de loop van het onderzoek zullen ongetwijfeld nog vele andere vragen rijzen.

Deze circulaire zal in zoveel mogelijk tijdschriften worden gepubliceerd en ook aan zoveel mogelijk personen in en om het Deltagebied worden toegestuurd. Hoogst waarschijnlijk zullen wij echter niet iedereen kunnen bereiken, zodat wij een ieder willen verzoeken dit rondschrijven in zo ruim mogelijke kring bekend te maken.

Drs. W. J. WOLFF

Contactorgaan voor vogelstudie van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Oproep tot medewerking aan vogelinventarisaties. Het onderzoek naar het voorkomen van een aantal Nederlandse broedvogels loopt nu twee jaar. De resultaten van 1966 zijn gepubliceerd in het Natuurnummer van maart 1967. De gegevens over 1967 zullen zo gauw mogelijk verschijnen.

In 1968 worden 11 soorten onderzocht. Van de lijst van 12 soorten, die in 1967 onderzocht werden, zijn er nu 2 afgevoerd (de Fuut en de Grutto), terwijl 1 nieuwe soort kon worden toegevoegd (de Wielewaal). De bewerkers van de Fuut en de Grutto zullen misschien op enige speciale punten het onderzoek voort willen zetten, maar zullen daarvoor zelf met een klein aantal medewerkers contact zoeken.

Het is te hopen, dat de gewaardeerde steun die de vele medewerkers ons de afgelopen twee jaar hebben gegeven, ook in de toekomst verwezenlijkt kan worden.

Het hoofddoel van het onderzoek blijft een vaststelling (in veel gevallen een zo goed mogelijke schatting) van het aantal broedparen van een bepaalde soort. Voor de ene soort is deze doelstelling redelijk goed te bereiken, voor de andere slechts in beperkte mate.

De bestaande medewerkers zullen de telformulieren voor 1968 toegestuurd krijgen. Nieuwe medewerkers wordt gevraagd zich op te geven bij de bewerk(er)s van de soort(en), die ze hebben gekozen.

Lijst van soorten en bewerkers.

Dodaars: Drs. D. Dekker en M. van Herp. Walvisstraat 6, Jisp (N.-H.). Alle gegevens zijn welkom, ook negatieve. Tellingen in en buiten broedseizoen met nauwkeurige opgave van plaats, gemeente, datum, enz.

Boomvalk: R. Dantuma, Hyacinthstraat 180, Groningen. Tellingen van vogels in de broedtijd d.m.v. nestvondsten, rondvliegende vogels of waarnemingen van vliegvlugge jongen, in de buurt van vermoedelijke broedplaats.

Torenvalk: F. Koning, Belkmerweg B 110, Burgerbrug (N.-H.). Tel. 02268-459. Het onderzoek wordt voortgezet door tellingen van nesten en vogels in de broedtijd.

Ransuil: D. A. Boeije en P. Zegers, Lobeliastraat

35a, Vlaardingen. Het onderzoek wordt nog zeker twee jaar voortgezet. Het samenstellen van een verspreidingskaart voor de broedtijd, is de belangrijkste opgave van het onderzoek.

Gierzwaluw: N. A. Ferbeek, De Slag 20, Drachten. Tel. 05120-4352. Het onderzoek wordt voortgezet door het tellen van vliegende vogels in de broedtijd.

Huiszwaluw: J. Philippona, Noordermeent 29, Kraggenburg (N.O.P.). Het onderzoek wordt op beperkte schaal voortgezet. Opgaven worden gevraagd van kolonies van 25 en meer nesten en van opvallende nieuwe vestigingen. Ook zal aan een klein aantal medewerkers gevraagd worden of zij de controle van enige duidelijk begrensde gebieden willen voortzetten.

Wielewaal: M. Bouman, Marterlaan 10, Wageningen. Deze soort wordt voor het eerst onderzocht. De methode zal zijn het tellen van zingende mannetjes in de broedtijd.

Roek: H. R. Feijen, Buitenruststraat 6a, Leiden. Evenals vorig jaar worden gevraagd: Al of niet voorkomen van kolonies per gemeente, aantallen wel en niet bezette nesten per kolonie, vroegere gegevens, slaapplekken.

Braamsluiper: J. Taapken, Utrechtseweg 43, Hilversum. Tel. 02150-46391. De bedoeling is, dat van zingende mannetjes ook wordt nagegaan of dit trekkers of blijvers zijn. Het is daarom wenselijk, dat een gebied enige keren gecontroleerd wordt.

Gele kwikstaart: Drs. J. J. Frieswijk, Burg. van der Pollstraat 483, Amsterdam 16, tel. 020-138910. Het onderzoek wordt voortgezet met het vaststellen van het aantal territoria in terreinen met verschillende begroeiingstypen.

Geelgors: J. Reijnders, Nieuwe Meerdijk 382, Badhoevedorp. Tel. 02968-4268. Het onderzoek wordt op dezelfde wijze als voorgaande jaren voortgezet. Tellen van zingende mannetjes en opgave van gemeenten of gebieden met of zonder zingende Geelgorzen; verder ook schattingen van de aantallen per gebied of gemeente.

Alle verdere inlichtingen over de methoden van onderzoek krijgen de medewerkers toegestuurd van de betreffende bewerkers.

Noordermeent 29, J. PHILIPPONA,
Kraggenburg (N.O.P.) Technisch lid van het
Contactorgaan voor Vogelstudie.

BIJLAGE ARTIKEL BRAAKSMA uit De Levende Natuur 71 (1968).

Overzicht van de gegevens over de verspreiding van de Laatvlieger, *Eptesicus serotinus* (Schreb.), in Nederland.

R.M.N.H. = Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden. Z.M.A. = Zoologisch Museum te Amsterdam.

PROVINCIE + GEMEENTE:	PLAATS:	DATUM:	GEGEVENS:
GRONINGEN:			
Adorp	N.H. kerk Adorp	6-9-1962	1 dood jong gevonden (S. Cats en S. Braaksma).
Delfzijl	N.H. kerk Meedhuizen	27-8-1963	1 adult ex. gezien (idem).
Eenrum	N.H. kerk Pieterburen	11-9-1964	1 dood jong gevonden, wellicht in 1964 geboren (E. J. Klever en S.B.).
Marum	Geref. kerk Marum	18-2-1964	1 ex. gezien (zie Braaksma, 1964), volgens de koster ook aanwezig in zomer van 1963.
FRIESLAND:			
Baarderadeel	N.H. kerk Oosterlittens	4-8-1964	9 ex. gezien waarvan wellicht 3 juveniele dieren (H. T. v.d. Meulen en S. B.).
Doniawerstal	N.H. kerk Langweer	18-6-1959	1 ♂ gezien (Dr. J. W. Sluiter en Dr. P. F. van Heerdt).
Ferwerderadeel	N.H. kerk Ferwerd	27-6-1959	22 ex. gezien, nl. 2 juv. ♂ ♂, 12 juv. ♀ ♀ en 8 adulte ♀ ♀ (Dr. J. W. Sluiter en Dr. P. F. van Heerdt).
		juli 1959	kleine kraamkolonie (Van Heerdt en Sluiter, 1961).
		juli 1960	geen enkel ex. gezien (idem).
		25-9-1964	1 dood jong + veel vrij verse mest (H. T. v.d. Meulen en S. B.).
		23-6-1965	21 adulte vleermuizen gezien, waarvan 1 met zekerheid herkend als zijnde een Laatvlieger (idem).
		27-7-1966	60 à 80 ex. aanwezig (Dr. J. W. Sluiter c.s.).
Hennaarderadeel	N.H. kerk Spannum	4-8-1964	12 dode ex. gevonden (H. T. v.d. Meulen en S. B.).
Leeuwarden	Leeuwarden	13-3-1961	1 dood ex. gevonden (Med. Fries Nat. Hist. Museum, nr. 16. p. 1-2).
		22-7-1964	1 ♂ idem (idem, nr. 26, p. 1).
		30-8-1967	1 ex. idem (Veld en Vitrine nr. 34).
Leeuwarderadeel	Huizum	30-4-1962	1 ♂ gevonden (Med. Fries Nat. Hist. Museum, nr. 19, p. 1).
		14-6-1967	alleen 1 dood jong gezien, vermoedelijk van vorig jaar (Dr. P. F. van Heerdt en Drs. A. M. Voûte).
Menaldumadeel	N.H. kerk Blessum	14-6-1967	alleen 1 dood jong gezien, vermoedelijk van vorig jaar (Dr. P. F. van Heerdt en Drs. A. M. Voûte).
		26-7-1967	4 adulte en 4 juv. ex. gezien, volgens de koster dit jaar in totaal ± 15, in 1966 zeker ± 25 ex. aanwezig (idem).

PROVINCIE + GEMEENTE:	PLAATS:	DATUM:	GEGEVENS:
Tietjerksteradeel	N.H. kerk Oudkerk	12-8-1965	$\pm$ 30 ex. gezien (H. T. v. d. Meulen en S. B.).
		26-7-1966	idem (Dr. J. W. Sluiter c.s.).
Weststellingwerf	Nijetrijne	12-5-1964	1 ♂ Z.M.A.
Wijmbritseradeel	N.H. kerk Nijland	12-9-1963	1 dood ex. gevonden (H. T. v. d. Meulen en S. B.).
OVERIJSEL:			
Dalfsen	R.K. kerk Lemelerveld	14-7-1967	1 adult ex. gezien (J. J. Kleuver en S. B.).
Deventer	Deventer	1955	meermalen waargenomen (zie Hoekstra, 1955).
		1960	idem (1960).
Wierden	N.H. kerk Enter	3-8-1967	2 adulte ex. gezien (idem).
Olst	N.H. kerk Olst	9-7-1956	resten van 21, wellicht door Bosmuizen gedode, ex. gevonden in spouwmuur (zie Hoekstra, 1956).
Olst	Olst	18-12-1958	resten van 1 ex. aangetroffen in een braakbal.
		17-1-1959	idem (zie Hoekstra, 1960).
Olst	Welsum	30-7-1957	1 ex. aangetroffen (zie Hoekstra, 1960).
Stad Delden	Delden	1962	voorkomend (zie Hoekstra, 1962).
UTRECHT:			
Leusden	R.K. kerk Hamersveld	18-8-1967	1 ex. gezien (F. van Ommen en S. B.).
NOORDHOLLAND:			
Amsterdam	Amsterdam	10-9-1952	1 ex. Z.M.A. (zie ook Van Laar, 1961).
		29-11-1957	idem.
		16-9-1960	idem.
Bloemendaal	Bloemendaal	1-2-1964	1 in Z.M.A.
Den Helder	Den Helder	5-7-1964	1 ex. in R.M.N.H.
Texel	Den Burg	aug.-sept. '57	2 en 2 in Z.M.A. (zie ook Van Laar, 1960).
Texel	Den Burg	sept. 1963	1 ex. dood gevonden, nu in Texels Museum (G. J. de Haan).
ZUIDHOLLAND:			
Everdingen	N.H. kerk Zijderveld	10-8-1966	1 dood ex. gevonden en 5 of 6 levende ex. gezien (B. J. Riemersma en S. B.).
Hellevoetsluis	N.H. kerk Nieuwenhoorn	18-7-1967	11 adulte en 3 juv. ex. gezien (H. G. v. d. Weijden en S. B.).
Leidschendam	R.K. kerk Stompwijk	4-10-1963	1 dood ex. gevonden, volgens de koster deze zomer $\pm$ 14 ex. aanwezig (J. C. T. v. Blommestein en S. B.).
		29-7-1964	14 dode ex. gevonden (idem).

PROVINCIE + GEMEENTE:	PLAATS:	DATUM:	GEGEVENS:
Streefkerk	Bakkerij Vlot, Streefkerk	29-5-1964	1 skelet gevonden en veel verse mest gezien (Dr. J. W. Sluiter en Dr. P. F. van Heerdt).
Waarder	N.H. kerk Waarder	6-10-1966	4 dode ex. gevonden, alle nog vrij jonge dieren; volgens omwonenden huisden hier enkele jaren geleden wellicht ongeveer 300 ex.!! (H. G. v. d. Weijden en S. B.).
		29-6-1967	± 30 adulte dieren gezien, die wellicht vrijwel alle pasgeboren jongen hadden, er werden 1 pas dood en 1 levend jong gevonden (idem).
Warmond	Warmond	7-1-1952	1 ♀ in R.M.N.H.
Westmaas	N.H. kerk Westmaas	15-9-1965	1 levend ex. gezien en 3 dode ex. gevonden, nl. 1 adult en 2 juv.; veel mest van deze soort aanwezig (idem).
ZEELAND:			
Clinge	R.K. kerk Nieuwnamen	30-8-1967	2 reeds lang dode ex. gevonden, nl. 1 adult en 1 juv. (C. H. J. van Erp, J. C. A. M. Bervaes en S. B.).
Domburg	Landgoed „Westhove”	4-7-1964	1 ex. aangetroffen (Dr. A. v. Wijngaarden).
Groede	R.K. kerk Groede	aug. 1964	5 dode en wellicht 4 levende ex. aanwezig (Jaarboek C.J.N.).
Kloetinge	Kloetinge	zomer 1964	resten van 1 ex. aangetroffen in een braakbal; nu in Z.M.A.
Middelburg	„Lange Jan”, Middelburg	dec. 1964	waargenomen (zie A. Bijl, 1966).
Wissekerke	Kamperland-polder	10-7-1944	resten aangetroffen in kerkuil-braaksel.
		26-9-1945	idem (zie Van Wijngaarden, 1959).
NOORDBRABANT:			
Aarle-Rixtel	Aarle-Rixtel	1958	resten aangetroffen in een braakbal (Pater W. H. Th. Knippenberg).
Alphen en Riel	R.K. kerk Riel	2-8-1967	55 à 60 ex. aanwezig (J. W. C. Entrop, D. R. Veenhuizen en S. B.).
Berlicum	Kasteel „de Wamberg”	28-8-1963	1 ex. gekregen, dat aldaar was gevangen; het dier stierf helaas vlak daarna (G. T. M. v. d. Laar en S. B.).
Den Dungen	Den Dungen	12-9-1958	waargenomen (Pater W. H. Th. Knippenberg).
Gemert	R.K. kerk Gemert	11-9-1962	1 ex. gezien; mest van meer ex. aanwezig (idem).
		23-4-1964	alleen oude mest gevonden (Dr. A. van Wijngaarden en S. B.).
Nieuw-Vossemeer	R.K. kerk Nw-Vossemeer	30-11-1964	3 dode ex. aangetroffen (D. R. Veenhuizen).

PROVINCIE + GEMEENTE:	PLAATS:	DATUM:	GEGEVENS:
Oosterhout	R.K. kerk Oosteind	16-9-1963	5 dode ex. gevonden (J. W. C. Entrop en S. B.).
Oploo	R.K. kerk Oploo	okt. 1958	waargenomen (Pater W. H. Th. Knippenberg).
		9-6-1959	skeletten gevonden van 1 juv. en 2 adulte ex. (Dr. J. W. Sluiter en Dr. P. F. van Heerdt).
Ravenstein	Herpen	1944	waargenomen (zie Knippenberg, 1956).
Roosendaal c.a.	R.K. kerk Nispen	1-10-1965	2 ex. gezien (C. H. J. van Erp en D. R. Veenhuizen).
St. Michielsgestel	R.K. Seminarium Beekvliet	18-4-1953	1 ♂ waargenomen.
		28-6-1954	idem (Pater W. H. Th. Knippenberg).
Vierlingsbeek	R.K. kapel Groeningen	juli 1961	10 à 15 ex. gezien (Dr. A. van Wijngaarden).
Zundert	R.K. kerk Achtmaal	3-9-1963	8 ex. aanwezig (T. W. Jansen, J. W. C. Entrop en S. B.).
LIMBURG:			
Berg en Terblijt	Kloostergroeve	jan. 1963	1 ex. dood gevonden (Dr. A. van Wijngaarden).
Heer	Grotten Voogdijgesticht	1960	1 ex. overwinterend (Van Heerdt en Sluiter, 1961).
Kerkrade	R.K. kerk Kerkrade (St. Lambertus)	21-9-1967	1 reeds lang dood ex. gevonden (J. T. ter Horst en S. B.).
Oirsbeek	R.K. kerk Doenrade	22-8-1967	1 ex. gezien (idem).
Schinveld	Nieuwijkstraat Schinveld	17-8-1955	1 half volgroeid ♂ gekregen, dat een week tevoren was gevonden bij een spouwmuur, waar volgens inlichtingen geregeld 20 tot 60 vleermuizen uitvliegen; hier zelf alleen mest gevonden (Dr. J. Sluiter en Dr. P. F. van Heerdt).
Valkenburg c.a.	Grotten	winter 1961	1 ex. aangetroffen (Van Heerdt en Sluiter, 1962).
Valkenburg c.a.	Kasteel Chaloen	18-8-1965	3 ex. gezien (J. T. ter Horst en S. B.).
Venray	R.K. kerk Castenray	28-9-1967	1 ex. aanwezig (T. W. Jansen en S. B.).
Venray	R.K. kerk Leunen	28-9-1967	idem.
Wittem	R.K. Pastorie Eijs	omstreeks begin aug.	78 uitvliegende ex. geteld, wellicht alle van deze soort. (Dr. P. J. Van Nieuwenhoven).
		18-8-1965	nog tenminste 10 ex. aanwezig (J. T. ter Horst en S.B.).
Wijlre	R.K. kerk Scheulder	17-8-1956	1 juv. ♂ gevangen en de moeder gezien (Dr. J. W. Sluiter en Dr. P. F. van Heerdt).