

Broedvogelaantallen in Noordholland-Noord

P. BOER Jr.

Aan de hand van recente publikaties, voornamelijk verschenen in het periodiek „De Pieper” van de Vogelwerkgroep Noordhol-




Fig. 1. Noordholland-Noord; begrenzing van het geïnventariseerde gebied.

lands Noorderkwartier (1963 t/m 1967), is het mogelijk geworden van de broedvogels in Noordholland-Noord (zie fig. 1), met als zuidelijke grens de lijn Egmond-Alkmaar-Hoorn, het aantal broedparen bij benadering te schatten. Voor aanvullingen van de gepubliceerde gegevens heb ik dankbaar gebruik gemaakt van schattingen en aanvullingen van Mej. G. van der Baan, J. A. Klop, G. R. Monsees, K. Roselaar en C. N. Venneker.

Opvallend hoog zijn de aantallen Stormmeeuwen, Oeverzwaluwen, Boomleeuwrieken, Snorren, Braamsluipers, Baardmannetjes en Barmsijzen. Lage aantallen vindt men bij de roofvogels, de Zilvermeeuwen en de Holenduiven.

Soorten die als broedvogel zijn verdwenen, zijn o.a. de Aalscholver, de Ooievaar, de Eidereend, de Lachstern, de Griel, de Grote

stern, de Grauwe gors, de Raaf en de Roek. Vogels die hier af en toe in 1 of meer paren broeden, zijn o.a. de Geoorde fuut, de Purperreiger, de Bonte strandloper, de Steltkluut en de Bonte vliegenvanger; deze soorten zullen verder buiten beschouwing worden gelaten.

Praktisch alle aantallen in de hieronder volgende opgave zijn minimum aantallen, voornamelijk gebaseerd op gegevens uit de jaren 1966 en 1967. Bovendien steunen zij voor een groot deel op inventarisaties uit de jaren 1963 t/m 1967. Binnen afzienbare tijd zal de „Commissie voor de Avifauna van Noordholland” van de Vogelwerkgroep Noordhollands Noorderkwartier nog eens een bijzonder nauwkeurig overzicht publiceren van de broedvogelaantallen benoorden het Noordzeekanaal.

Een literatuurlijst zal achterwege gelaten worden, gezien de bijzonder grote omvang. Publikaties over broedvogels in dit gebied zijn vrijwel alle in bovengenoemd tijdschrift




Fig. 2. Zwemmende jonge Kluut. Foto P. Boer Jr.

te vinden. Voor op- en aanmerkingen en eventuele aanvullingen houdt de schrijver zich ten zeerste aanbevolen. Zijn adres is: Hobbemalaan 145, Alkmaar.



Fig. 3. Vliegvlugge jongen van de Blauwe reiger. Foto P. Boer Jr.

× Fuut	250	Waterral	70
× Dodaars	80	Porseleinhoen	2
× Blauwe reiger	225 °	? Klein/Kleinst waterhoen	1
Woudaapje	1-3 °	Kwartelkoning	max. 10 °
Roerdomp	11 °	Waterhoen	575 °
× Lepelaar	80 °	Meerkoet	2000 °
Wilde eend	3500	Scholekster	1000
Wintertaling	15	Kievit	2500
Zomertaling	110	Bontbekplevier	5
Pijlstaart	1	Kleine plevier	20-35 °
Slobeend	500	Strandplevier	15 °
× Kuifeend	115 +	Watersnip	15
Tafeleend	5 +	× Houtsnip	30
Bergeend	85 °	Wulp	55
Knobbelzwaan	210	× Grutto	2500 °
Sperwer	1-2	× Tureluur	1000
Bruine kiekendief	3	× Kemphaan	100 °
Grauwe kiekendief	1	Kluut	25 °
× Boomvalk	7	Kleine mantelmeeuw	3
× Torenvalk	35	Zilvermeeuw	260 °
Patrijs	400	Stormmeeuw	950 +
Kwartel	20 °	Kokmeeuw	3300 °
Fazant	1800	Zwarte stern	35 °

Visdief	500 °	Tuinfluit	280
Noordse stern	1-10 °	Grasmus	500 &
Dwergstern	1	× Braamsluiper	50
Holenduif	58 &	Fitis	750 &
Houtduif	1200 &	Tjiftjaf	140
Tortelduif	70	Fluiter	2-10 °
× Turkse tortel	200	Goudhaantje	5
Koekoek	130 &	Grauwe vliegenvanger	90
× Kerkuil	5-12	Koolmees	1100 &
Steenuil	15-30	Pimpelmees	350 &
× Bosuil	3-4	Zwarte mees	20 °
× Ransuil	45-74	Kuifmees	30
× Velduil	1-3	Glanskop	20 °
Nachtzwaluw	4-7	Staartmees	12
Gierzwaluw	800 ° &	× Baardmannetje	30 +
? IJsvogel	1 °	? Boomklever	1
Groene specht	12 °	Boomkruiper	120
Grote bonte specht	20 °	× Geelgors	38-63
Kuifleeuwerik	60	Rietgors	850 &
Boomleeuwerik	20	Groenling	200
Veldleeuwerik	6500	Putter	30 +
Boerenzwaluw	4000 ° &	? Sijs	1-5 °
Huiszwaluw	900 ° &	Kneu	600 &
Oeverzwaluw	200 °	× Barmsijs	35 +
Boompieper	25	Europese kanarie	1
Graspieper	2500 &	? Kruisbek	1 (1967)
Witte kwikstaart	1000 &	Vink	400
Gele kwikstaart	400 ° &	Huismus	80.000 + &
Grauwe klauwier	1-3	Ringmus	400 ° &
Winterkoning	850 &	Spreeuw	15.000
Heggemus	150	Wielewaal	25-33 °
Grote lijster	100 +	Kraai	110
Zanglijster	500	Kauw	2000
Merel	2000 &	Ekster	800
Tapuit	60	Vlaamse gaai	100
Roodborsttapuit	10		
Paapje	40	? broeden niet bewezen, wel waarschijnlijk geacht.	
Gekraagde roodstaart	100	× van de soort is een inventarisatie-verslag van het gebied Noordholland benoorden het Noordzeekanaal gepubliceerd (t/m 1967).	
Nachttegaal	100	° sterke jaarlijkse verschillen in broedvogelaantal.	
? Blauwborst	1-2	+ vertoont de laatste jaren een duidelijke vooruitgang.	
Roodborst	900	& gezien de beschikbare gegevens was het niet mogelijk een hogere schatting te maken, in deze gevallen is het minimum aantal echter stellig hoger.	
Sprinkhaanrietzanger	50 °		
× Snor	40 ° +		
Grote karekiet	90 °		
Kleine karekiet	1100 ° &		
Bosrietzanger	30		
Rietzanger	1300 ° &		
Spotvogel	500		
Zwartkop	120		