

Enkele aanvullingen op de lichenologische kennis van Terschelling en Vlieland

Leo Spier

J.L. Spier. Some additions to the lichen flora of Terschelling and Vlieland.

Much is already known from the lichen flora of Terschelling and Vlieland. Additional species for Terschelling are: *Aspicilia grisea*, *Chaenotheca ferruginea*, *Hobsonia christiansenii*, *Opegrapha confluens*, *Parmelia caperata*, *P. exasperatula*, *P. perlata*, *P. soledians*, *Pertusaria albescens*, *Scoliciosporum gallurae*, *Syzygospora physcia-cearum* and *Verrucaria halozoa*. New to Vlieland: *Calicium viride*, *Lecanora aitema*, *Lepraria lobificans*, *Micarea nitschkeana*, *Peltigera neckeri* and *Usnea subfloridana*.

Overzichten van de licheenflora van Terschelling zijn te vinden in Brand (1983), Van den Boom (1986), Ketner-Oostra (1972, 1989, 1995, 1997) en Sipman (1969). Aptroot & Van Herk (1999) vermelden *Xanthoria ulophyllodes* als nieuw voor Nederland van Terschelling.

Overzichten van de licheenflora van Vlieland zijn te vinden in Brand (1975, 1979, 1983). Tot nu toe waren er van *Usnea subfloridana* alleen onzekere opgaven (cf. of s.l.). Van den Boom (1992) vermeldt *Lecania atrynoides* van Texel, Vlieland en Terschelling.

De hier gepresenteerde aanvullingen komen uit privé-excursies zowel van Kok van Herk als van de auteur.

Nieuw voor Terschelling:

Aspicilia grisea: Terschelling, op graniet van havendijk van De Kom, West-Terschelling, coörd.: 143/596, herb. van Herk.

Chaenotheca ferruginea: Terschelling, op *Pinus* langs Badweg te Hoorn, coörd.: 152/602, herb. Spier.

Hobsonia christiansenii: Terschelling, op *Fraxinus* (op *Physcia tenella*) langs Kunneweg te Hoorn, coörd.: 152/601, herb. Spier.

Opegrapha confluens: Terschelling, De Kom, West-Terschelling. herb. van Herk.

Parmelia caperata: Terschelling, op *Alnus* nabij Bospaviljoen aan de Badweg te Hoorn, coörd.: 151/602; op *Acer* nabij Bospaviljoen aan de Badweg te Hoorn, coörd.: 152/602; op *Quercus* tOv Oosterend, coörd.: 154/602, alle herb. Spier.

Parmelia exasperatula: Terschelling, op *Betula* in Berkenvallei, coörd.: 155/602. Op dia van Kok van Herk.

Parmelia perlata: Terschelling, op *Alnus* in het bos tWv het Bospaviljoen, coörd.: 151/602, herb. Spier.

Parmelia soledians: Terschelling, op *Tilia*, Oosterend, 154/602. Veldwaarneming van Kok van Herk.

Pertusaria albescens: Terschelling, op *Tilia*, Oosterend, coörd.: 154/602. Op dia van Kok van Herk.

Scoliciosporum gallurae: Terschelling, op *Quercus*, Koegelwieck te Hoorn, coörd.: 151/602, herb. Spier.

Syzygospora physciacearum: Terschelling, op *Physconia grisea* op *Ulmus* in de Commandeurstraat te West-Terschelling, coörd.: 153/596, herb. Spier.

Verrucaria halizoa: Terschelling, op havendijk van De Kom, West-Terschelling, coörd.: 143/596, herb. van Herk.

Nieuw voor Vlieland:

Calicium viride: Vlieland, *Acer* op kerkhof in dorp, coörd.: 133/590, herb. Spier.

Lecanora aitema: Vlieland, op *Pinus* bij vuurtoren, coörd.: 133/589, herb. Spier.

Lepraria lobificans: Vlieland, op greppelwand in bos, coörd.: 132/590, herb. Spier.

Micarea nitschkeana: Vlieland, op *Quercus* in Oude Eendenkooi, coörd.: 128/587, herb. Spier.

Peltigera neckeri: Vlieland, tussen mos langs fietspad r. Posthuis, ± 1km ZW van de Ankerplaats, coörd.: 131/590, herb. Spier.

Usnea subfloridana: Vlieland, op *Quercus* tussen Ankerplaats en Vuurtorenvijver, det. Philippe Clerc, coörd.: 132/589; op *Quercus* in Oude Eendenkooi, met TLC/TDA thamnolzuur aangetoond, coörd. 128/587, beide herb. Spier.

Met dank aan Kok van Herk voor het beschikbaarstellen van zijn gegevens.

Literatuur

Aptroot, A. & K. van Herk. 1999. *Xanthoria ulophyllodes*, een nieuw macrolicheen voor Nederland. Buxbaumiella 48: 45-46.

Boom, P. van den. 1986. De najaarsexcursie naar Terschelling (22-23 sept.1984). Buxbaumiella 18: 16-20.

Boom, P.P.G. van den. 1992. The saxicolous species of the lichen genus *Lecania* in The Netherlands, Belgium and Luxemburg. Nova Hedwigia 54 (1-2): 229-254.

Brand, M. 1975. De lichenen van de Vlieland-excursie. Buxbaumiella 4: 76-87.

Brand, M. 1979. Aanvullingen en verbeteringen voor de licheneflora van Ameland en Vlieland. Buxbaumiella 8: 42-047.

Brand, A.M. & R. Ketner-Oostra. 1983. Lichens, in: Dijkstra & W.J. Wolf (red). Flora and vegetation of the Wadden Sea Islands and coastal areas. pp. 73-85.

Ketner-Oostra, R. 1972. Het terrestrisch voorkomen van *Alectoria fuscescens* Gyeln. s.l. in de droge duinen van Terschelling. Gorteria 6: 103-107.

Ketner-Oostra, R. 1989. Lichenen en mossen in de duinen van Terschelling. RIN-rapport 89/7. Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum.

Ketner-Oostra, R. 1993. Buntgrasduin op Terschelling. De Levende Natuur 94: 10-16.

Ketner-Oostra, R. 1995. De opzet van een monitoring-programma in korstmos-rijke Buntgras-vegetatie op Terschelling. Staatsbosbeheer Regio Friesland-Noord.

Ketner-Oostra, R. 1997. Monitoring-programma buntgrasduin op Terschelling. Staatsbosbeheer. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Ketner-Oostra, R. 1997. De korstmosrijke Duin-Buntgras-Gemeenschap op Terschelling. Staatsbosbeheer, regio Fryslan. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Sipman, H.J.M. 1969. Verslag over een onderzoek naar de vegetatie op de noordhelling van enkele duinen op Terschelling. Inst. Syst. Plantkunde, RUU.