




Bloeiende Fourcroya.
foto Pangeran Saoenan.

BLOEIENDE FOURCROYA'S.

Op mijn erf zijn ook plekken die begaanbaar zijn in dezen al te natten moesson. Alzoo staat er alleen gras en dan nog erg slecht ook, *domdoman*, dat met zijn scherpe vruchtjes leelijk kan prikken.

Een jaar of drie geleden zette ik op de minst moerassige plekken bibit van *Fourcroya*; en zooals van deze woestijntrappers te verwachten was; ze groeiden, ondanks de armoedige grond. De reusachtige rozetten doen het wel in gazons; bloeiend is *Fourcroya* werkelijk een decoratieve plant. Hard en vezelig zijn de bladen; de punt is venijnig scherp en ook de randen zijn gewapend.


In rijen van zes om een huis heen geplant kan je er heel aardig een draadversperring mee imiteren. En de scherpste golok wordt er gauw stomp op; niet ongeschikt, dunkt me, voor sommige streken op de buitenbezittingen. Het schijnt, dat hier en daar touw van de vezels gemaakt wordt. Pulque zou de meest gewiekste Mexikaan er zeker niet uithalen, geen droppeel — al heeten de bladen vleezig.

In 't begin van October kwamen bij twee van onze planten bloeistengels uit de rozet opschieten.


Na een dag of tien was het kleinste exemplaar al een meter of vier, de groote — zie foto — is nog aan 't groeien en komt al boven mijn huis uit. De kleine is ± 5 , de groote 7 à 8 jaar. Die bloeistengel is een stevige, rolronde stam met hier en daar een gestekelde schub. Het heele gevaarte moet vrij zwaar zijn, want de kleine kapsijsde

bij de eerste, de beste bui.

Toen had ik met een gelegenheid de bloemen te bekijken. Ze zitten aan een grootte rijk bloeiende pluim, mooie zespuntige bungelende sterren. Geelwit, van binnen wat groen, met een aardig figuurtje van meeldraden en



Bloeiende *Fourcroya*
top.



Fourcroya-bloemen.

Links van terzijde. Midden doorsnede. Rechts van boven.

stamper. Doordat de top zoo ver in de lucht zit, waar zoo weinig achtergrond is, vallen ze niet genoeg in 't oog. Daarom heb ik die top maar afgesneden laten kieken. Sterk zijn ze, die bloemen. 15 October openden zich de eerste knoppen en nu begin Dec. staat de bloeitop nog frisch, en dan afgesneden!

Eerst zitten de beweeglijke helmknoppen vrij dicht bij de glanzende stempel, maar als het stuifmeel rijp is, buigen ze zich wat meer naar buiten en dan valt de bloem gauw af. Insecten-bezoek heb ik niet opgemerkt; vruchten kunnen er bezwaarlijk ontstaan door 't afvallen.

Misschien, dat er hoog in de lucht, bij het groote exemplaar bestuiving zal plaats hebben.

Dit na te gaan lijkt me een aviateurs-prestatie. Want omvallen doet-ie vast niet! Op Tjiniroeën zag ik eens een plant, die broedknoppen in plaats van bloemen droeg. Die vielen op den grond en schoten dan lustig wortel. Op de foto kan men nog even zien, dat er onder uit de rozet een klein, krom bloei-stengeltje komt. Het draagt normale bloemen. Ondertusschen is een derde aan 't bloeien geslagen! Wonderlijk, dat de tuin, waaruit ze afkomstig zijn — en die veel beter is! — nog nooit bloeiers opleverde.

Jammer, dat al die fraaiheid gauw weg is; de bladen worden geel en slap en als de bloei afgelopen is, sterft de heele plant. De Inlanders noemen hem hier: *ganas sabrang*; de overeenkomst met een ananas schijnt hun dus opgevallen te zijn.

De soortnaam ken ik niet. Is het *F. gigantea*?

Dat zou wel passen, want reusachtig is-ie!

Bandoeng.

De foto's zijn van PANGERAN SAOENAN.



C. J. F. DENKER.

KORTE MEDEDEELINGEN.

Verslag van de vergadering der afdeling Bandoeng op Zaterdagavond 13 Januarië in het gebouw der H.B.S. Aanwezig waren 24 leden en een introducee, lid van de vereniging. Na voorlezing der notulen van de vorige vergadering en een verslag van de eerste excursie besprak de voorzitter de mogelijkheid van het maken ener excursie naar de plek, waar de Tjitaroem in een grot verdwijnt in de buurt van Radjamandala.

Daarna hield mej. REIJNVAAN een korte voordracht over het leven en de bouw van een slijmzwam, de *Stemonitis splendens*. Deze voordracht zal over enigen tijd in de *Tropische Natuur* afgedrukt worden.

Vervolgens liet de voorzitter enkele merkwaardigheden zien. Een in Bandoeng in bloei gekomen exemplaar van *Nephelaphyllum tenuiflorum* Bl. een in de vochtige bossen van het gebergte vrijveel voorkomend aardorchideetje, welke op donkere plaatsen tussen rotte bladeren groeit.

Verder een bloeiend exemplaar van *Dorstenia spec.* De bloeiwijze werd besproken in verband met de bloeiwijze der *Ficus*-soorten.

Als curiosum werd rondgegeven een levend uit het ei gekomen, maar dadelik daarop gestorven kuiken met 4 poten en 4 vleugels. Een kop was duidelijk, een andere minder goed te zien. De poten en vleugelparen waren in tegengestelde richting aan het lichaam bevestigd. Ook een gewone aardworm met een gevorkt lichaam trok de aandacht.

Aan de wand waren enkele stereoscoopplaten opgehangen van de grot van de Tjitaroem en van de ontwikkeling in het ei van een salamandersoort.

De Secretaresse,
Mej. C. REIJNVAAN.

AFDEELING BANDOENG.

Excursie naar Radjamandala en de grot van de Tjitaroem. Eerst door de theetuinen en dan langs een gemakkelijke weg door het bos. Aan het einde een afdeeling in het ravijn en tot slot een zeer interessant riviergezicht. De deelnemers moeten zorgen voor een spoorkaartje naar Radjamandala, wat eten meenemen en een veldfles. Een paar stevige schoenen zijn voor de wandeling nodig, welke ongeveer 2 uur duurt en evenzoveel uren terug. Heengaande zal de wandeling waarschijnlijk wat meer tijd kosten. We vertrekken uit Bandoeng om 5 uur v. m.

Per briefkaart zal nog nader worden medegedeeld op welken Zondag in Februarië de tocht zal plaats hebben.

De Secretaresse,
Mej. C. REIJNVAAN.