VERZAMELEN VAN NATURALIËN.

Door buitenlandsche verzamelaars worden herhaaldelijk aan het Zoölogisch Museum te Buitenzorg en via leden der vereeniging ook aan de Redactie, adressen gevraagd van verzamelaars in naturaliën in Nederlandsch-Indië.

Zij, die genegen zijn om naturaliën te ruilen of te verkoopen, worden beleefd verzocht hun adres met opgave van de diergroepen, die aangeboden kunnen worden, in te zenden aan het Zoölogisch Museum te BUITENZORG.

CORRESPONDENTIE.

Den Heer H. S. te B. — Volgens bij het Zoölogisch Museum alhier ingewonnen inlichtingen is inderdaad de keel en borst van het mannetje van de koetjita (*Copsychus musicus*) gitzwart en dat van het wijfje leikleurig. De waargenomen verschillen zijn sexe-verschillen.

Den heer J. H. S. te S. — Een werk, waarin alle dieren van Java beschreven staan, bestaat niet, doch in onderstaande werken, welke door elken boekhandel geleverd kunnen worden, is een groot deel beschreven:

J. H. van BALEN. *De dierenwereld van Insulinde.* Deel I. *Zoogdieren.* Deel II. *Vogels.* (v. d. BURGH. Deventer).

P. A. OUWENS. *De giftslangen van Nederlandsch-Indië.*

Dr. K. W. DAMMERMAN. *Landbouwdierkunde van Oost-Indië.* (DE BUSSY. A'dam).

en de meer systematische werken:

The Reptiles of the Indo-Australian Archipelago. (BRILL. Leiden).

Deel I. Dr. NELLY DE ROOY. *Lacertilia, Chelonia, Emydosauria.*

Deel II. Dr. NELLY DE ROOY. *Ophidia.*

The Fishes of the Indo-Australian Archipelago. (BRILL. Leiden).

Deel I. Dr. M. WEBER and Dr. L. F. de BEAUFORT. *Index of the Ichthyological papers of P. Bleeker.*

Deel II. Dr. M. WEBER and Dr. L. F. de BEAUFORT. *Malacopterygii, Myctophoidea, Ostariophysi: I. Siluroidea.*

Deel III. Dr. M. WEBER and Dr. L. F. de BEAUFORT. *Ostariophysi: II. Cyprinoidea, Apodes, Synbranchi.*

Vraag. Onderstaand beschreven vogeltje heb ik iederen dag op de Wilis (± 600 M.b.z.), doch ook wel elders waargenomen, kan het evenwel in het werk van VAN BALEN niet thuis brengen, heb het ook niet in het Zoölogisch Museum in Buitenzorg aangetroffen. Zoudt u misschien opheldering kunnen geven?

1. Het beestje heeft alle allures van een vliegenvanger, doch doet in vorm en kleur denken aan de Europeesche zwartkopmees, is alleen wat grooter: de borst en verdere benedendeelen zijn grijs (wit), het deel van den kop boven vanaf de oogen (naar boven) en verder alle bovendeelen bij ♂ glanzend blauwzwart, bij ♀ dof zwart.

2. Gaarne zou ik ook willen weten wat voor vogeltje dat is (het draagt een geelgroen kleed en is ook insecteneter, zoekt zijn voedsel in de kronen der boomen in tegenstelling met de vorige, die van af den buitenkant zijn prooi beloert), hetwelk het typische geluid: tjieieieie (lang) touw (kort) voortbrengt.

Kaban Djahe (Sum. O. Kust). F. H. HANSEN.

Antwoord. 1. Het eerst door u aangeduide vogeltje is zoo goed als zeker *Hemipus obscursus* HORSF. (fam. *Prionopidae*). VAN BALEN noemt het *Brilklauwier* (volgens BREHM). Het herinnert in uiterlijk en gedrag aan mees, klauwier(snavel), vliegenvanger, zelfs (volgens KONINGSBERGER) aan een honingzuiger. U vindt op pag. 472 in VAN BALEN, dl. II nadere bizonderheden. Verder vindt u bizonderheden in „De Vogels van Java" enz. en in „Java, zoölogisch en biologisch" van KONINGSBERGER.

Zelf zag ik een wijfje en een mannetje in Juni 1913 op de helling van den Kloet (± 300 M.b.z.). Ze volgden vooral de telegraaflijn, zetten zich op de draden neer en vingen insecten. De maaginhoud bestond uitsluitend uit insecten.

2. De beschrijving van het andere vogeltje is te vaag om met eenige zekerheid inlichtingen te geven, aangezien er zoovele insecten-etende groen-gele vogeltjes zijn. In verband met het door U aangeduide geluid, durf ik echter wel te *vermoeden*, dat het de *Tjipo* is geweest (*Aegithina scapularis* HORSF., familie *Ixodidae*); zie VAN BALEN, dl. II pag. 421. S. L.