

„*Lebensbedingungen und Vegetationsverhältnisse der Mittelmeerländer und der atlantischen Inseln*”. Een vanaf den voet in eenige stammen opgeloste jeneverbes (*Juniperus phoenicea*) bereikte op een der Kanarische Eilanden een hoogte van slechts enkele meters, en alle groote zijtakken en de geheele verdere vertakking bevindt zich in voornamelijk horizontale richting van den heerschenden wind afgekeerd. De top reikt bijna tot den grond.

Maar ook zijn er in Europa van een enkele boomsoort windvormen bekend, waarbij de spil den rechten stand heeft bewaard, niettegenstaande de kroon zich slechts aan één kant heeft kunnen ontwikkelen. Het voorbeeld vindt men bij MASSART; dergelijke windvormen levert de *Populus italica*, waarvan de takken steil naar boven zijn gericht, zoodat de eindloot ook bij eenzijdige ontwikkeling van de bladermassa niet wordt gebogen. Iets dergelijks zou men kunnen veronderstellen bij de pala, waarvan echter de takken veel minder steil zijn opgericht dan die van genoemde populier.

J. B.

KORTE MEDEDEELINGEN.

Bestrijding van behangersbijtjes.

In de December-aflevering van verleden jaar raadde S. L. mij in de correspondentie-rubriek aan een proef te nemen met verdunde Bordeauxsche pap tegen de schade aan rozen door bladsnijders. Over het resultaat ben ik zeer tevreden, en betuig ik mijn besten dank voor de raadgeving.

Mijn vraag van verleden jaar was het gevolg van het feit, dat de bladsnijders of behangersbijtjes het er niet bij lieten uit een rozeblad een of twee halfcirkelvormige stukken te snijden, maar zij waren er — en zijn er trouwens nog — in zeer groot aantal, en door aller samenwerking waren de rozestruiken ten slotte letterlijk kaal; enkele exemplaren gingen dientengevolge zelfs dood.

De Bordeauxsche pap werd volgens recept klaargemaakt, en daarmee werd elk nieuw blaadje bestreken met een zachte kwast. En deze bladeren bleven gespaard! Spoedig stonden alle struiken weer vol in blad; twee keer per week werden ze behandeld, of wanneer een flinke regenbui gevallen was, nog eens extra. Het regende in dezen westmoesson relatief weinig, er kwamen vrij langdurige, droge intervallen voor, waardoor een behandeling twee maal 's weeks voldoende was; in de oostmoesson is éénmaal voldoende.

Inderdaad, wanneer wij en ons papoeasch huis-factotum, wien ik de zaak heb uitgelegd en aan wien de uitvoering van het bestrijken is opgedragen, goed oppassen, zoodat na een eenigszins flinke regenbui de bewerking in alle vroegte herhaald wordt, dan hebben wij wekenlang het genoegen gehad, positief *alle* bladeren geheel gaaf te zien. Zoodra de bediende echter slabakt, zijn in een ommezien de bladeren weer aangevreten.

In den vroegen ochtend heb ik het gedrag der bijtjes wel eens geobserveerd. Zij komen met hun gewone vlugge vaart aanzetten, strijken neer, loopen en „snuffelen” nerveus wat rond aan diverse bladeren, — het leek ook alsof zij begonnen te „snijden” —, maar al heel gauw vlogen zij weer weg.

Dr. H.

MEDEDEELINGEN VAN DE VEREENIGING.

Het Hoofdbestuur ontving het volgende schrijven van den Heer NUHOFF, secretaris der afdeeling Kediri:

„In de „Levende Natuur” van September 1922 komt eene mededeeling voor van de hand van Dr. GARJEANNE over de Tami-microscoop. Gelijk uit de November-aflevering van datzelfde tijdschrift en eveneens uit het Januari-nummer 1923 van „Natura” blijkt, is genoemd microscoop bij de firma Caminada te verkrijgen à f 42.50, terwijl abonné's der Levende Natuur resp. leden der Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging dit instrument voor f 39.50 aangeboden wordt. Na een demonstratie van een exemplaar op de laatste vergadering der afdeeling Kediri werd reeds dadelijk door enkele leden geïnformeerd waar dit instrument te verkrijgen was en hoe men het uit moest laten komen. Naar aanleiding hiervan zouden