

Gallinago stenura.

1. De snavelbasis is hooger, veroorzaakt door het daar ter plaatse naar boven opbuigen van den bovensnavel.
2. De punt van den bovensnavel is, van terzijde gezien, knotsvormig verdikt.
3. De punt van den bovensnavel is van boven gezien, nagenoeg niet spatelvormig verbreed. Het poriënveld strekt zich niet zoo ver naar achteren toe uit.
4. De ondervleugeldekeveren zijn regelmatig wit en zwart geteekend. De zwarte bandjes zijn ongeveer even breed als de witte.
5. De eerste, zeer kleine slagpen (het zoogenaamde „snippenveertje”) is aan de buitenvlag bruin gekleurd of heeft hoogstens een smal wit randje.
6. De armpennen (secundaire slagpennen) hebben smalle grijswitte zoomen.

Gallinago gallinago.

1. De snavelbasis is minder hoog, doordat de bovensnavel vrijwel recht verloopt.
2. De punt van den bovensnavel is nagenoeg niet knotsvormig verdikt.
3. De punt van den bovensnavel is duidelijk spatelvormig verbreed. Het poriënveld strekt zich veel verder uit.
4. De ondervleugeldekeveren zijn niet zoo regelmatig geteekend. Het wit heeft de overhand.
5. „Het snippenveertje” is op den buitenvlag geheel of nagenoeg geheel wit.
6. De armpennen hebben breede helderwitte zoomen.

Heeft men dus een snip, waarbij het staartkenmerk niet klopt met dat van *stenura*, dan zal men goed doen eerst bovengenoemde kenmerken nog eens na te gaan en pas als ook deze uitkomen te besluiten, dat men werkelijk met de hier zeldzame *Gallinago gallinago* te doen heeft.

Het zou natuurlijk wel wenschelijk zijn ook dergelijke verschillen op te geven voor *gallinago* en *megala* of voor *stenura* en *megala* doch daartoe ontbreken mij op het oogenblik nog de noodige gegevens.

Uit het bovenstaande blijkt dus wel dat er nog heel wat op te lossen is op snippengebied en zou ik allen, die ertoe in de gelegenheid zijn, willen opwekken om mede te helpen de leemte in onze kennis aangaande voorkomen enz. te doen verdwijnen. Ondergeteekende stelt zich gaarne beschikbaar in twijfelachtige gevallen de exemplaren te onderzoeken. Een conserveering volgens de in de Tropische Natuur 1924 afl. 2 en 4 gegeven methode is voor de toezending zeer aan te bevelen.

Buitenzorg April 1926.

H. C. SIEBERS.

KORTE MEDEDEELINGEN.

Aseroë rubra, var. Junghuhnii. — Naar aanleiding van het artikel over deze interessante zwam in aflevering 3 van den loopenden jaargang, wil ik nog een en ander daarover mededeelen. De zwam kwam in October van het vorige jaar om Tjibodas in groote hoeveelheid voor, veel talrijker dan andere jaren het geval was. Meestal vond ik hoogstens 2 à 4 stuks bijeen. Dezen keer duurde het ontwikkelen van half October tot einde Januari. De familie GEERTS vond ze, toen juist de regens begonnen door te komen. Naarmate het meer ging regenen werden de exemplaren grooter en bereikten een doorsnede van 10 à 14 c. M.


Steeds wanneer ik exemplaren van *Aseroë* ontdekte, was ook de *Ithyphallus* aanwezig. De laatste kwam in April ook nog voor.

Zijn er enkele scheurtjes in de volva ontstaan, zoo kan het nog een 2 à 3 dagen duren eer er iets van gleba of tentakels is te zien. Zijn echter slechts enkele puntjes van de tentakels naar buiten gedrongen, dan is de verdere ontplooiing binnen 10-15 minuten afgelopen en de *Aseroë* geheel geopend. Ditzelfde verschijnsel heeft ook bij *Phallus impudicus* en *Ithyphallus* plaats. Met het oog is de strekking gemakkelijk waar te nemen.

Nog geen enkele maal zag ik deze Phallacea op dezelfde plaats terug komen, ieder jaar kwam ze ergens anders voor.

L. B.

Homonoia riparia LOUR. — De vorige aflevering was goed en wel uit, waarin ik mijn vermoeden mededeelde, dat onze „wilg” op Borneo wel niet gevonden zou worden, of ik krijg de jongste aflevering van het Philippine Journal of Science in handen, waarin MERRILL mededeelt (XXX, p. 81), dat door Mrs. BATESON in 1923 aan de Maroedoe Baai in Britsch-Noord-Borneo deze *Homonoia* gevonden werd op de voor haar karakteristieke groeiplaats. Toch doet deze vondst nog niets af aan de veronderstelling, dat deze *Homonoia* van het vaste land van Azië langs twee wegen den Maleischen Archipel is binnengedrongen. De nieuwe vindplaats toch sluit aan aan die op het eiland Palawan, dat een verbinding tusschen de Philippijnen en Borneo vormt van groote plantengeographische beteekenis. J.B.



Hibiscus mutabilis L. Op bloem tallooze conidiëndragers van *Choanephora infundibulifera* SACC. — 15. VI 1926.

Een Choanephora op een stokroos. — Na lezing van het artikel van Dr. S. C. J. JOCHEMS in de Tropische Natuur van Januari 1926, getiteld „Een interessante schimmel op de kembang sepatoe”, vermoedde ik, dat op de stokroos (*Hibiscus mutabilis* L.), een tot dezelfde familie en zelfs tot hetzelfde geslacht behorende struik, ook wel *Choanephora*'s zouden kunnen voorkomen. Een dadelijk ingesteld onderzoek in mijn tuin leverde echter niets op.

Doch op 13 April was ik zoo gelukkig in mijn tuin twee bijna verdroogde bloemen van die witte stokroos, nog aan den struik zittend, te vinden, met een aantal schimmels erop (conidiëndragers), die ik voor *Choanephora*'s hield, en die volgens de determinatie van het naar Buitenzorg opgezonden materiaal door Dr. C. VAN OVEREEM ook identiek is met die van de kembang sepatoe.

Ter toelichting diene, dat na weken droogte het Deli proefstation voor 11 April, dus twee dagen te voren, 13 mm regen noteerde, en het daarop weer droog weer was. De stokroos staat vlak naast een bloeiende kembang sepatoe-struik met lichtgele bloemen, waarvan enkele, reeds uitgebloeide, ook schimmels droegen, zeer waarschijnlijk weer de *Choanephora infundibulifera* SACC.

Medan.

L. C. HEYTING.

MEDEDEELINGEN VAN DE VEREENIGING.

Vacantie in de bergen. — Het doet het Hoofdbestuur genoegen, onzen leden te kunnen aankondigen, dat nummer 2 van onze populaire wetenschappelijke Bibliotheek dezer dagen ter perse is gegaan en zeker voor het eind van het jaar gereed zal zijn. Het is geschreven door Mevr. S. J. GEERTS-RONNER; de titel luidt: „Vacantie in de bergen” en het zal meer dan 200 afbeeldingen naar foto's en teekeningen van Dr. GEERTS bevatten. De leden zullen het tegen verminderden prijs kunnen ontvangen, maar deze prijs zal niet zoo laag kunnen zijn als bij het vorige boekje. Het zal dan ook wel niet mogelijk blijken, dat de afdelingen het, evenals bij het eerste boekje, aan hare leden gratis aanbieden, wellicht echter wel tegen nog meer verminderden prijs, dan aan het Hoofdbestuur mogelijk is. Mogen de penningmeesters daarmede rekening houden!

Het eerste boekje (Dr. H. C. DELSMAN: Uit de Tropische Natuur) wordt franco toegezonden na ontvangst van postwissels ten bedrage van f 1.— door de penningmeesteres, Mej. L. S. D. MERKUS, Van Heutz-boulevard 12, Weltevreden (Voor niet-leden is de prijs f 1.25— porto ad f 0.20).