

het mannetje een stuk grooter dan het wijfje en eveneens is hier duidelijk een verschijnsel, dat bij alle radjoengans min of meer te vinden is, namelijk dat de eene schaar wat krachtiger ontwikkeld is dan de andere. Bij sommige soorten is dit de rechter, bij andere de linker.

Tot een waar exces is dat verschijnsel geworden bij de kleine, bonte wenkkrabbetjes (*Uca* of *Gelasimus*) der modderstranden. Maar daarover een ander maal.

H. C. DELSMAN.

KORTE MEDEDEELINGEN

Slangen en varanen. — Het zal waarschijnlijk aan vele lezers bekend zijn, dat er op het oogenblik groote interesse bestaat in den handel in slangen- en varanen-(leguanen-)huiden.

Dat de groote export van deze huiden uit zal loopen op een uitroeien van deze dieren, zoo hierin niet wordt ingegrepen, ligt voor de hand. In 1925 steeg de uitvoer van varanenhuiden van 190.000 tot ruim 400.000 stuks. Voor Nederlandsch-Indië is een uitvoerverbod van reuzenslangen en varanen voorgesteld in de ontwerpverordening in de Javasche Courant van 4 Maart 1927.

Van het „Department of Agriculture“ te Ceylon werd ons dezer dagen een schrijven toegezonden, waarin om inlichtingen verzocht werd over den broedtijd bij varanen, het aantal eieren, dat een dier per seizoen legt, en waarin tevens gegevens gevraagd werden over de voeding bij deze dieren. Dit alles met het oog op het instellen van een gesloten jachtijd.

Niets is echter nog vastgelegd omtrent de biologie van deze toch algemeen bekende dieren. Een ieder wordt daarom verzocht hem of haar mogelijk bekende gegevens hieromtrent op te willen zenden aan den Directeur van het Zoölogisch Museum te Buitenzorg.

A. G. V.

Larongs. — Naar aanleiding van het stukje „Jacht op larongs“ in de vorige aflevering wil ik even mededeelen, wat ik hier te Kediri op een „laron-ochtend“ waarnam. De gevleugelde termieten kropen tegen zeven uur in den ochtend uit den grond, en onder de jagers, die toen reeds op het appèl waren, zag ik ook een drietal terkoekoers (*Turtur tigrinas* TEMM.), de duivensoort, die op den overgang van hals naar romp een geparelde vlek aan de nekzijde heeft. Gretig pikten zij de op den grond kruipende larons op. Met mijn Zeiss 12× waren zij zoo duidelijk waar te nemen, dat ik bij wijze van spreken de baarden der veeren kon zien, zoodat vergissing uitgesloten is. Larons zijn blijkbaar zoo lekker, dat zelfs deze duiven, die toch zaadeters bij uitnemendheid zijn, er door verleid werden.

Ook de korenbouten, kindjengs, waren van de partij. Deze beten de arme diertje vlak achter de vleugels door en aten alleen het achterlijf op, terwijl zij het voorstuk met pooten en vleugels lieten vallen.

W. VISSER.

MEDEDEELINGEN VAN DE VEREENIGING

Afdeeling Batavia. — In de Paasch-vacantie werd een 5-daagsche excursie gehouden naar de Wijnkoopsbaai, welke tocht door zeer fraai weêr begunstigd werd. Gelogeerd werd in de nieuwe pasanggrahan te Karang Hawoe, die weliswaar slechts een bescheiden accommodatie heeft, maar waarin het uit 26 personen bestaande gezelschap niettemin bleek te kunnen worden ondergebracht, met dien verstande evenwel, dat een tiental veldbedden op de voorgalerij werd opgeslagen en de zitkamer 's nachts als slaapvertrek en overdag als eetzaal dienst moest doen.

Den dag na aankomst werd een gemeenschappelijke wandeling gemaakt via Tji-Solok naar de geysirs van dien naam (feitelijk slechts thermen), nadat de weg reeds daags tevoren door een drietal deelnemers was verkend geworden. Deze spuitende warmwater-bronnen, in het stroombed van een beekje te voorschijn komend, vertoonen de bekende sintervorming, die gewoonlijk door de werking van algen en bacteriën wordt ingeleid; jammer is evenwel dat men de monding der krachtigste bron door middel van