



DE STERRENHEMEL IN MAART



STERRENGROOTTEN: 0 en 1 ★, 2 ☆, 3 ◆, 4 ●; veranderlijk ○

De kaartjes gelden op 1 Mrt. te 22 u.; op den 15-den te 21 u. en op den 31-sten te 20 u. en voorts op
 15 Nov. 15 Dec. 15 Jan. 15 Feb. 15 Mrt. 15 Apr.
 5 u. 3 u. 1 u. 23 u. 21 u. 19 u.

Aan het begin van iedere maand gelden zij één uur later, aan het einde één uur vroeger.

DE MAAN. — N. M. 5 Mrt.; E. K. 12 Mrt.; V. M. 20 Mrt.; L. K. 28 Mrt.;

DE PLANETEN. — MERCURIUS. R. K. op 1 Mrt. 21.4; 15 Mrt. 22.0; 31 Mrt. 23.2. Opkomst resp. 4 u. 50 m; 4 u. 27 m; 4 u. 43 m. Grootste elongatie op den 15-den. De planeet is als morgenster goed waarneembaar. Zij komt op 22 Maart in conjunctie met SATURNUS.

VENUS — R. K. op 1 Mrt. 9.3; op 15 Mrt. 1.3; op 31 Mrt. 2.5. Ondergang resp. 20 u. 3 m; 20 u. 15 m; 20 u. 31 m. Fraaie avondster.

MARS. — (R. K. op 15 Mrt 15.4; opkomst te 22 u.) passeert op het einde der maand Spica.

JUPITER — R. K. op 15 Mrt. 15.4; opkomst te 22 u; in de Weegschaal.

SATURNUS. — R. K. 22.4; opkomst 4 u. 55 m. In de ochtendschemering dichtbij MERCURIUS.

S. W. VISSER.

KORTE MEDEDEELINGEN

Slangenbuizerd (*Spilornis*). — In de maag van een in de maand Juli 1934 geschoten slangenbuizerd (*Spilornis cheela bassa* FORST.), trof ik twee slangetjes aan, welke werden opgezonden naar Dr F. KOPSTEIN, die zoo vriendelijk was mede te delen, dat het hier twee bijna volwassen exemplaren van *Ablabes baliodirus* (BOIE) betrof, een soort, die in de recente literatuur *Gongylosoma baliodeirum* heet. Dr KOPSTEIN merkte omtrent deze slang nog op, dat zij van de kustvlakte tot ca. 5000 voet boven zee voorkomt, echter waarschijnlijk nergens menigvuldig. De onderhavige slangenbuizerd werd geschoten op een thee-onderneming, ongeveer 1000 m boven zee gelegen.

Garoot, Nov. 1934

F. J. A.

Onderzoek naar de bekerfauna van *Nepenthaceae* op West-Borneo. — In jaargang 1934 van dit tijdschrift werd op blz. 146–151 en blz. 157–163 het een en ander gepubliceerd over de bekerfauna van *Nepenthaceae* op West-Borneo. Over de daar voorkomende Culiciden kon toen nog niets worden medegedeeld, daar ze nog niet op naam waren gebracht. Inmiddels echter is het materiaal door de vriendelijke tussenkomst van Dr H. SCHMITZ gedetermineerd door Dr S. L. BRUG (Nat. Hist. Maandblad, jaargang 1934 blz. 149–150). Het blijkt te bestaan uit de navolgende soorten: 1) *Uranotaenia brevis* in *Nepenthes Rafflesiana*, 2) *Tripteroides (Rachinotomyia) aranoides* in *N. ampullaria* en *N. mirabilis*, 3) *Tripteroides vicinus* in *N. mirabilis*, 4) larven van *Armigeres brevitibia* (?) in *N. bicalcarata*, *N. ampullaria* en *N. Rafflesiana*, 5) *Culex (Lophoceratomyia) navalis* in *N. bicalcarata* en *N. Rafflesiana*, 6) *Culex curtipalpis* in *N. mirabilis* en *N. gracilis*.

Heteren (G.), Holland.

Dr C. FRANSSEN.