

BROEDENDE VOGELS IN BEPLANTE SAWAH

In den omtrek van Buitenzorg kan men twee soorten vogels aantreffen, welke een groeiende padi-aanplant gaarne als broedgelegenheid kiezen. De vogel, die er betrekkelijk veel in wordt aangetroffen is *Cisticola juncidis malaya* LYNES, uit de verwantschap van de rietzangers en bij de bevolking bekend onder den naam van boeroeng padi, — een naam, die overigens niet veel zegt. Omdat het een insecteneter is, doet dit weinig opvallende, grijs gekleurde vogeltje aan het padigewas veel nut. Of het zich dat bewust is moet betwijfeld worden, maarschuw is de vogel in geen geval. Bij niet te dicht naderen blijft hij lustig doorgaan met zijn helder en krachtig: „twiet-twiet-twiet”. 't Is een vroolijk baasje, een en al bewegelijkheid ook tijdens het zingen en daardoor draagt hij veel bij tot de vroolijkheid van het reeds zoo mooie Javaansche landschap.



Fig. 1. *Cisticola*, zingend in de padi.



Fig. 2. Jonge kaneelreiger op het nest.

Het kokervormig gebouwde nestje, dat van boven meestal is afgesloten, zit tegen vijanden beveiligd, kunstig gevlochten tusschen de padihalmen boven het sawah-wateroppervlak. Meestal treft men er een viertal $1\frac{1}{2}$ cm groote eitjes in. De kleur daarvan is zeer verschillend, in dit geval heel zacht blauw met onregelmatige chocolade-
kleurige vlekjes; vooral op het stompe gedeelte. Dit maakt dat het zeer decoratief gekleurde eitjes zijn. Op foto 1 zien wij den vogel lustig zingen.



Door een toeval kon de ontwikkeling van een nest met jongen gevolgd worden, en het was de vraag hoe het zou aflopen wanneer de jongen het nest zouden verlaten. Maar de vrees was ongegrond. De Natuur heeft het zoo geregeld, dat de jongen vliegklaar het nest verlaten. Mocht na het verlaten toch nog één in het water terecht komen, wat één van deze jongen overkwam, dan is er in de directe nabijheid wel een padiplant waar het in de uitstoeeling daarvan een droog plekje vindt om op te drogen en te bekomen van den schrik. De ouders zorgen intuschen wel voor voedsel.

Een andere, minder opvallende sawahbewoner is de kaneelreiger, *Ixobrychus cinnamomeus* GM., bij de bevolking bekend als kokondongan. Het is een kleine reiger, die zooals de naam reeds zegt, kaneelbruin gekleurd is. In tegenstelling met het eerst genoemde vogeltje is deze zeer schuw. Hij is dan ook, wanneer het oog er opvalt, niet alleen te herkennen aan de effen bruine kleur — welke sterk afsteekt tegen het groen van de omgeving — maar meer nog aan de, dezen vogel zoo typeerende, schuwe vlucht juist over en door de planten. Foto 2 geeft een jonge kaneelreiger op zijn nest te zien.

Is de eerstgenoemde vogel zeer nuttig als insectenverdelger, deze tweede wordt tot de schadelijke vogels gerangschikt, omdat hij schadelijk is in vischvijvers.

P. ROORDA.

DE STERRENHEMEL IN MEI



GELDIGHEID VAN DE KAARTJES:

15 Jan.	15 Feb.	15 Mrt.	15 Apr.	15 Mei	15 Juni.
5 u.	3 u.	1 u.	23 u.	21 u.	19 u.

Aan het begin van iedere maand gelden zij telkens één uur later, aan het einde één uur vroeger.

MAANPHASEN:— V.M. 6 Mei; L.K. 14 Mei; N.M. 21 Mei; E.K. 28 Mei.

PLANETEN.—MERCURIUS is voor waarneming ongunstig. De planeet komt in benedenste conjunctie op 31 Mei.

VENUS en MARS zijn onzichtbaar.

JUPITER komt in het begin der maand te 21 u. op, tegen het einde reeds te 18.7 u. en is dus den geheelen nacht zichtbaar.

SATURNUS (R.K. 23.5) in de Vijschen, komt op te 2.8 u., 1.9 u. en 0.9 u., resp. op 1,16 en 31 Mei en is dus in den nacht waarneembaar.

Leersum.

S. W. VISSER.

AANGEBODEN

Aan den meestbiedende: een bijna volledige serie van De Tropische Natuur, ongeschonden en in keurigen staat: jg. 1—13 gebonden, jg. 14—24 in afleveringen; alleen jg. 11 ontbreekt, op 1 afl. na. Verzending franco naar Indië.

Adres: F. BOTHMA, Stadhouderskade 9, Amsterdam W. (Holland).