



Als inlandsche namen worden opgegeven ko e b o e n g voor Z. Sumatra; koelin (Javaansch) en k a g o e a n g voor waarschijnlijk ergens in de Molukken. In de Preanger heb ik het dier nooit anders hooren noemen dan t a n d o.

Bandjarwangi, Februari 1937.

C. P. J. DE HAAS.

DE STERRENHEMEL IN OCTOBER



STERRENGROOTTEN: 0 en 1 ✱, 2 ✱, 3 ✱, 4 •, veranderlijk ○

GELDIGHEID DER STERRENKAARTJES:

15 Juni	15 Juli	15 Aug.	15 Sept.	15 Oct.	15 Nov.
5 u.	3 u.	1 u.	23 u.	21 u.	19 u.

Aan het begin van iedere maand gelden zij één uur later, aan het einde één uur vroeger.

MAANPHASEN. — N.M. 4 Oct.; E.K. 12 Oct.; V.M. 20 Oct.; L.K. 26 Oct.

PLANETEN. — MERCURIUS, (morgenster) komt op 29 October in bovenste conjunctie, maar staat de geheele maand in ongunstige positie.

VENUS komt even na 4 u. op, blijft nog als morgenster te zien.

MARS (R. K. 18.0 tot 19.6) beweegt zich door de Schutter; de ondergang verloopt van 23.4 u. naar 22.9 u.

JUPITER (R. K. 19.3 — 19.5) loopt ook door de Schutter en ontmoet MARS in den nacht van 29 op 30 Oct. Ondergang van 0.6 u. tot 22.8 u.

SATURNUS (R. K. 0.1; in de Vissen, vlak bij het Lentepunt) gaat eerst laat onder (5.5 u. tot 3.3 u.) en is derhalve vrijwel den geheelen nacht aan den hemel te vinden.

Leersum.

S. W. VISSER.

KORTE MEDEDEELINGEN

***Ipomoea pes caprae* in Z. Celebes.** — Op blz. 70-72 van dezen jaargang heb ik vermeld, dat ik op Bali „binnenlandsche” exemplaren van *Ipomoea* heb aangetroffen met vruchten. Thans kan ik mededeelen, dat ik deze plant overvloedig heb aangetroffen langs wegranden in het binnenland van Z. Celebes. Het beginpunt van deze vindplaats, die eenige tientallen kilometers lang is, is dáár waar de groote weg van Pare Pare naar Enrekang vlak voor Enrekang het dal van de reusachtige Saädang rivier ingaat. Dit is op ca 60 m boven zee. Vandaar vindt men ze overal langs den grooten weg Enrekang-Kalosi, tot ongeveer bij de z.g. richelgraven, op ca 600-700 m boven zee. Overal werd het voorkomen van vruchten (in de maand Juni) geconstateerd. Nergens werd de plant ver buiten den wegrand aangetroffen, hetgeen er wel op wijst, dat ze (vermoedelijk door den mensch met transporten) van de kust is meegebracht.

Nog een andere kustplant wordt daar op die plaatsen veelvuldig aangetroffen, nl. *Cassytha filiformis*, het bruine duivelsnaaigaren.

VAN STEENIS