

UIT DE AFDELINGEN

BOGOR

Onder het motto: "Ken Uw eigen woonplaats" organiseerde de Afdeling een rondwandeling om het landelijke Bogor op Zondag 20 Aug. 1952. Onder de kundige leiding van de Heren Kern en van Borssum Waalkes van het Herbarium Bogoriense werd te voet een speurtocht ondernomen door de Tjiliwung vallei. Het was voor velen van de ongeveer 20 deelnemers een verrassing zo vlak naast de deur dat natuurschoon te vinden, waarvoor meestal veel verder van huis wordt gereisd.

Vanaf de Djalan Guntur daalde de weg direct steil af naar de in de vallei gelegen kampong. Een mengelmoes van adventieven en wegplanten (voornamelijk Composieten, Malvaceae, Acanthaceae, Scrophulariaceae) vormde in zijn verscheidenheid voor velen reeds bij de aanvang een onbegrensde bron van studie. Een verrassing was *Petiveria alliacea*, een Phytolaccaceae.

In het rivierdal werden verscheidene karper- en gorami- (*Asphronemus gorami* Lac.) vijvers aangetroffen, waarin ook moed'jaar (*Tilapia mosambica* P.) bleek voor te komen. Aan waterplanten noteerden wij behalve *Eichhornia crassipes*, *Nymphaea* en *Limocharis flava* nog *Monochoria vaginalis* (Pontederiaceae), *Fimbristylis miliacea* en op drassige plekken *Peristrophe* en *Amorphophallus*.

Vervolgens voerde de inmiddels weer droge weg langs vele vruchtbomen, o.a. *Psidium guajave* (djambu bidji), *Anacardium* sp., *Syzgium* sp. div. en nog vele andere soorten. Het zou de moeite waard zijn bij een volgende gelegenheid eens wat meer aandacht aan de inheemse vruchtgewassen te besteden, b.v. tijdens een wandeling door Depok, waar van oudsher vele soorten en variëteiten worden gekweekt.

Langs het pad werd *Eupatorium odoratum* aangetroffen, een soort die eerst kort voor de oorlog vaste voet op Java heeft verkregen, zich sindsdien in Bantam een geduchte alang-alang-bestrijder getoond heeft, doch voor zover bekend nog niet verder dan tot Bandjar aan de grens van Midden Java is verbreid.

Voorts vallen te vermelden *Crescentia marmelos*, een Bignoniaceae en een uitstekende heggeplant, *Sauropus androgynus* (katoek) een Euphorbiaceae, waarvan het blad een rijke bron van vitamine A, B en C is (resp. 47.500, 51 en 110 I.E. per 100 gram).

Voor velen een waagstuk, leverde tenslotte de primitieve hangbrug over de Tjiliwung geen onoverkomelijke hindernissen. Het pad voerde door droge sawahs met een schat van dwerg- en tredplanten, voornamelijk Scrophulariaceae, *Pilea microphylla*, *Elysanthus*, *Aneilema*, *Fimbristylis miliacea*, *Bacopa*, *Eclypta alba*, *Oldenlandia*, *Lindernia*. In de vochtige aarde waren talrijke rode Chironomiden-larven aanwezig. Bij een brede waterval, gevormd door een riviertak over een harde puimsteentufbank, leek de tocht haar natuurlijk einde te zullen vinden. Enige natte voeten waren de prijs, die betaald moest worden om via een klein huissmederijtje van anglos weer in de bewoonde wereld terug te komen.

T.