

vijver van ongeveer 50 bij 20 meter werden gedurende een jaar ongeveer 30 waterslangen gevangen. Nu worden daar slechts af en toe 1 of 2 exemplaren signaleerd.

De verschillende exemplaren van *ularbelang*, die ik in gevangenschap heb, hebben ieder hun eigen kooi. Dit is nodig, want toen dit niet het geval was, deed zich afgezien van de vele vechtpartijen, een geval van kannibalisme voor, waarbij het niet ging om het betwisten van een prooi. *C. rhynchops* is daarentegen heel wat socialer van aard. Onder de pannen, die in de plassen van de slangenbak liggen, kunnen zij met alle andere waterslangen¹⁾ vredig in een kluwen rusten, zodat bezoekers menigmaal opmerkten, dat mensen aan deze slangen een voorbeeld kunnen nemen.

UIT DE AFDELING PALEMBANG

Excursie op 2 Augustus 1953.

Ondanks ingewonnen adviezen van experts, die indrukwekkende getijtafels raadpleegden en de uren van de hoogste waterstanden van de Musi-rivier voor een reeks Zondagen opgaven, viel de oorspronkelijke opzet dezer excursie vrijwel geheel in het water door gebrek aan dit vocht. Hoe dit ook zij, een klein deel der plannen kon toch worden uitgevoerd nadat de gegadigden, die in flinken getale waren opgekomen, zich in drie sampans hadden ingescheept. Van natuur-beschouwing is op de Sekanak (een zijstroompje van de Musi) echter weinig gekomen, doch niettemin was het een interessant tochtje tussen de duizenden palen waarop een groot deel van Palembang is gebouwd. Reeds voor de grens van de stad bereikt was, geboden modderbanken en gezonken bomen rechtsomkeert; op het uitgangspunt teruggekomen werd besloten de Musi-rivier af te varen tot Sungei Gerong. Uiteraard gaf ook dit traject weinig gelegenheid tot natuurstudie, doch de schilderachtige aanblik van de honderden op vloten gebouwde toko's en huizen vergoedde veel. Tot algemene vrolijkheid kwam het toeval onze oogmerken enigszins tegemoet, toen een tegenligger een vreemdsoortig opgezette tijger bleek te bevatten. Voorts werd nog een vliegende marabu waargenomen alsmede enige zilverreigers (*Egretta intermedia*).

P v GB

¹⁾ *Homalopsis buccata* (Linné); *Fordonia leucobalia* (Schlegel); *Enhydris enhydris* (Schneider), en *E. plumbea* (Boie.)