

BIJZONDERE SOORTENPROJECT: 5 SOORTEN (VERVOLG)

Evert van Huijssteeden

In het vorige nummer van De Fitis werd een nieuwe opzet van het BSP-project gepresenteerd. Kort gezegd komt het neer op het zoeken van een vijftal (zeldzame) soorten per kwartblok (2,5 bij 2,5 km = 625 ha).

Deze vijf soorten, te weten: GEOORDE FUUT, BONTBEKPLEVIER, KLUUT, BRUINE KIEKENDIEF en PAAPJE zijn allen vrij gemakkelijk herkenbaar en goed te inventariseren. Het moet daarom mogelijk zijn deze soorten regiodekkend te inventariseren.

Aandachtspunten

Bij deelname moet met de volgende punten rekening worden gehouden:

- Het is altijd mogelijk om meer soorten te inventariseren (zie lijst in Fitis 1987 (4): p. 183-184).
Inventariseert u in het duin het Paapje, dan zal het weinig moeite kosten om ook de Roodborsttapuit te inventariseren, en bij het zoeken naar Kluten in polders, stuit u vast ook op de Kleine Plevier. Het inventariseren van meer soorten is uiteraard niet verplicht.
- Geeft u a.u.b. ook nul-waarnemingen door; wanneer u zeker weet dat een bepaalde soort niet in uw telgebied heeft gebroed, legt u dit dan vast.
- Vindt u één van de vijf soorten buiten uw eigen telgebied, geef dit dan snel door aan de teller van het betreffende gebied of aan de waarnemingscoördinator Pim de Nobel.
- De gegevens kunnen op de officiële waarnemingsformulieren (die iedere teller zal ontvangen) aan SOVCN worden verzonden, maar houdt de telgegevens zelf ook achter en geef deze per kwartblok gescheiden door aan de coördinator.

Veldwerk

Per soort zal kort uiteen gezet worden wanneer men deze het beste kan inventariseren (de tellers krijgen een uitgebreidere handleiding).

soort	inventarisatietijd	criterium
GEOORDE FUUT	eind april/begin juni	2 waarnemingen, 1 tussen 10 mei en 20 juli
BRUINE KIEK	april-eind juni	4 waarnemingen, 2 tussen 15 mei en 30 juni
KLUUT	mei en juni	2 waarnemingen, 1 tussen 15 mei en 30 juni
BONTBEKPLEVIER	mei tot begin juli	2 waarnemingen, 1 tussen 15 juni en 15 juli
PAAPJE	half mei - begin juli	1 waarneming tussen 1 juni en 20 juli

De criteria (wanneer mag U een broedgeval meetellen) gelden alleen indien u géén nestindicatieve waarneming heeft gedaan. Wanneer dit wel het geval is, dan telt deze waarneming uiteraard mee als broedgeval.

Conclusie: met 3 - 5 bezoeken kunt u de vijf soorten vrij nauwkeurig in kaart brengen, mits deze op het juiste moment plaatsvinden.


Om een indicatie te geven van de plaatsen waar u moet gaan zoeken, is in figuur 1 en 2 aangegeven waar in 1982 van de vijf genoemde soorten broedgevallen hebben plaatsgevonden (gegevens PWS).

Deelname

De invulling van de telgebieden (zie figuur) is nu als volgt:

gebied 1: Jan Vegelin/Fred Cottaar	geb. 8: Martin de Jong
" " 2: Evert van Huijssteeden	geb. 9: - -
gebied 3 oost: Pim de Nobel	geb. 10: E. van Huijssteeden
west: Roy de Haas	geb. 11: Tom van den Boomen
gebied 4: Chris van Deursen	geb. 12: Tibor Gras/
" " 5oost: ---	Steve Geelhoed
west: Hans Vader	geb. 13: Piet van Vliet
gebied 6: Ferdy Hieselaar	geb. 14: Coen Looy
" " 7: Piet van Vliet	

Alle tellers ontvangen nog bericht (bestaande uit een handleiding en een kaartfragment van het telgebied), ook de nog niet ingedeelde aanmelders.



Figuur 2. Territoria van: ● Paapje in 1982.
○ Bruine Kiekendief

Het enige dat u daarvoor hoeft te doen, is even opbellen.

Evert van Huijsteeden, Gen. Cronjestr. 107rd, 2021 JD Haarlem
tel.: 023 - 270036