

BRUEDVOGELINVENTARISATIE

de "WIERINGEN" en
het "HOUTGLOP"

1975

Beschrijving en begrenzing van de "Wieringen" :

De "Wieringen" is gelegen in het noordwestelijk gedeelte van "de Kennemerduinen", met als begrenzing in het noorden Landgoed "Duin en Kruidberg", in het westen de hoge duinrug die de "Wieringen" van de "Houtglop" scheidt, in het zuiden de betonweg naar Parnassia en in het oosten het schelpenpad dat de "Wieringen" van het "Klein-Olmen" scheidt. Door dit gebied lopen slechts één ruiterspad in het oosten en één wandelpad in het zuidoostelijke deel, waar echter opvallend weinig gebruik van

wordt gemaakt.

De eigenlijke "Wieringen" wordt omsloten door hoge duinruggen en in het centrum domineert de duindoorn, met hier en daar een laag berken- of abeelbosje.

In het zuiden ligt een klein meertje waar vaak vogels uit de omgeving komen drinken.

Ook op de grens "Wieringen"-KleineOlmen" is een meertje gegraven. Daarachter ligt een oud karrespoor dat vroeger "Duin en Kruidberg" in liep.

Op de hoge duintoppen heeft men een magnifiek uitzicht over het gehele gebied. Het was echter een moeilijk te belopen gebied, zodat na elke keer inventariseren de pincet ter hand moest worden genomen, als gevolg van de ondoordringbare duindoornvegetatie.

Aantekeningen:

Het weer liet nogal te wensen over, daar het vaak somber was met dikwijls mist en regen waardoor de zang niet op topniveau was. Er werden pulli waargenomen van de Scholekster en er werd één nest van de Meerkoet gevonden in de "Wieringen" langs het meertje, met 7 eieren. Verder werd er op 4 mei een Buizerd waargenomen en op 17 mei zag dhr. Klinkenberg 2 Futen in het meertje in de "Wieringen".

Beschrijving en begrenzing van het "Houtglop":

Het "Houtglop" is gelegen in het uiterste noordwesten van de "Kennemerduinen", met als begrenzing in het noorden "Duin en Kruidberg", in het westen de zeereep, in het oosten de heuvelrug die het "Houtglop" van de "Wieringen" scheidt, en in het zuiden een lage heuvelrug. Het gedeelte ten zuiden van deze heuvelrug dat begrensd wordt door de schelpenweg naar het "Schuitemgat" en de betonweg is echter ook geïnventariseerd.

Het "Houtglop" ligt geheel afgesloten voor publiek, er leidt slechts één weg naar de zomerverblijven in het "Schuitemgat"

In ornithologisch opzicht is dit een vrij arm gebied, door de afwezigheid van opgaand hout, waardoor de boombroeders hier geen geschikt biotoop hebben.

Ook hier treft men een gegraven meertje aan, ongeveer van gelijke grootte als de meertjes in de "Wieringen en "Klein-Olmen".

Aantekeningen:

Er werd van de Kievit, die hier heeft gebroed 1 jong dood gevonden en 1 jong waargenomen aan het meer.

Het gebied is in soorten vooruit gegaan met 6 stuks (1967: 11 soorten. 1975: 17 soorten).

Aantekeningen bij de territoria:

Winterkoning: Een enorme vooruitgang in het gehele duin is te vinden bij dit vogeltje, die nu samen met de Heggemus de meest algemene vogel in het duin bleek te zijn.

Nachtegaal: Ook voor deze vogel geldt een geweldige vooruitgang, in de "Wieringen" en "Houtglop" waren alle geschikte biotopen vol.

Roodborsttapuit: Ontbrak dit jaar geheel, alle vogels hadden hun territoria zuidelijker gelegen, zoals in de zeereep ten zuiden van de "Kattendel"

Wulp: Helaas ook hier een daling van 4 paar in de "Wieringen", zeer waarschijnlijk door het verdwijnen van de meeuwen, die protectie boden aan de Wulpen en aan de Scholekster en Kievit.

Zilvermeeuw: De geweldige kolonie die hier eens heeft gezeten is in zijn totaliteit verdwenen.

Volgens de Groot (zie Fitis jrg.5 afl.4 dec.1969) was de kolonie hier een kolonie met toekomst.

Dit omdat er regelmatig de Kleine Britse Mantelmeeuw en de Stormmeeuw werden waargenomen en omdat daarom de kans op broeden van deze soort in de toekomstverwachtingen lag.

Men heeft echter op last van de directie deze kolonie totaal vernietigd met het verderfelijke gif, strychnine. Vele honderden meeuwen (van verschillende soorten) zijn slachtoffer geworden van deze misselijke manier van regulatie (lees vernietiging!).

Er is dus:

1. Een unieke meeuwenkolonie vermoord, totaal zinloos.
2. Het broeden van een unieke meeuwensoort (Kleine Britse Mantelmeeuw) onmogelijk gemaakt.
3. Het broeden van de Stormmeeuw onmogelijk gemaakt.
4. Indirect een broedvogel benadeeld, n.l. de Wulp, maar ook de Kievit en de Scholekster.

Meerkoet: Zoals eerder vermeld één broedgeval bij het meertje in de "Wieringen", met 7 eieren die alle zijn uitgekomen.

Kleine Plevier: Werd voor de eerste maal waargenomen op 25 mei en bleek later gebroed te hebben nabij het meertje in "Klein-Olmen". Het nest is

niet gevonden, maar zeer waarschijnlijk heeft deze vogel gebroed in het karrespoor achter deze vijver.

Bij de inventarisatie werd en passant medewerking verleend door P.J. van Galen en C. de Groot.

Inventariseren waren P. Klinkenberg en ondergetekende.

Namens de medewerkers,

H. Wijkhuisen jr.
Generaal Bothastraat 8
Haarlem.

Aantal territoria van broedvogels

in de "Wieringen" in de jaren

1967-1969 en 1975.

	1967	1969	1975
1. Bergeend	2	2	1
2. Fazant	n.g.	n.g.	n.g.
3. Meerkoet	-	-	1
4. Schalekster	4	4	2
5. Kievit	6	7	3
6. Kleine Plevier	-	-	1
7. Houtsnip	1	1	-
8. Wulp	526	5	1
9. Zilvermeeuw	±250 paar	±150 paar	-
10. Houtduif	4	4	1
11. Tortelduif	2	4	-
12. Koekoek	-	2	2
13. Boonleeuwerik	4	2	-
14. Veldleeuwerik	-	1	1
15. Boompieper	-	-	2
16. Graspieper	-	-	1
17. Witte Kwikstaart	-	-	-
18. Winterkoning	-	2	12
19. Heggemus	7	16	14
20. Merel	2	3	4
21. Tapuit	2	9	3
22. Roodborsttapuit	2	-	-
23. Paapje	1	1	-
24. Gekraagde Roodstaart	3	1	1
25. Nachtegaal	4	6	8
26. Zwartkoptuinfluter	-	-	1
27. Grasmus	9	5	3
28. Fitis	16	17	18
29. Koolmees	1	1	2
30. Pimpelmees	-	1	-
31. Kneu	2	4	5
32. Kleine Barmsijs	-	-	2
33. Ekster	1	1	1
34. Vlaamse Gaai	1	-	-

	1967	1969	1975
Aantal soorten	23	26	25
Aantal territoria	329-330	249	90

Aantal territoria in het "Houtglop" over de jaren 1967 en 1975.

	1967	1975	
1. Fazant	n.g.	n.g.	
2. Scholekster	-	1	
3. Kievit	1	1	
4. Wulp	-	1	
5. Koekoek	-	1	
6. Boomleeuwerik	-	1	
7. Boompieper	2	1	
8. Graspieper	-	1	
9. Witte Kwikstaart	1	-	
10. Winterkoning	-	2	
11. Heggemus	3	2	
12. Merel	1	2	
13. Tapuit	3	2	
14. Roodborsttapuit	1	2	
15. Nachtegaal	-	2	
16. Grasmus	1	1	
17. Braamsluiper	-	1	
18. Fitis	2	3	
19. Kneu	3	5	
	<hr/>	<hr/>	
Aantal soorten	11	17	(+6)
Aantal territoria	18	27	(+9)