

# Broedvogelinventarisatie in het duingebied het "Kraansvlak" inclusief het noordwestelyk deel van "Middenduin", in 1979.

In het voorjaar van 1978 is dit gebied ook op broedvogels onderzocht en dus nu weer in 1979.

Het gebied, groot ca. 350 ha., is niet voor het publiek toegankelijk. Het wordt begrensd in het noorden door de zeeweg, in het oosten door het bos van "Middenduin", in het zuiden (van oost naar west gaande) deels door de spoorlijn Overveen-Zandvoort en verder door de rand van de bebouwing van Zandvoort, in het westen door de terreinen van het circuit en de campings. In het onderzochte gebied is mede begrepen het voor het publiek eveneens niet toegankelijke deel van "Middenduin" van Staatsbosbeheer; dit stuk wordt begrensd in het noorden door de zeeweg, in het zuiden door de populierenlaan en (in oostelijke richting gaande) door het pad ongeveer in het verlengde daarvan; de oostgrens is het verharde pad dat naar de zeeweg loopt.

Voor het resultaat van de inventarisatie van het voorafgaande jaar 1978 verwijzen we naar het desbetreffende rapport, waarvan tevens een speciaal nummer van ons blad "De Fitis" is gemaakt.

Het is natuurlijk interessant om de uitkomsten van beide jaren met elkaar te vergelijken en te zien of bepaalde soorten in aantal achteruit of vooruit zijn gegaan.

Er zijn echter verschillende factoren waardoor de verkregen cijfers voor de verschillende jaren moeilijk vergelijkbaar zijn:

1. De weersomstandigheden in de verschillende voorjaren, waardoor de zang waarop in hoofdzaak geïnvetariseerd moet worden, sterk wordt beïnvloed.
2. Heeft men in beide jaren wel evenveel tijd aan het onderzoek besteed en op dezelfde tijden van seizoen en dag?
3. Is het in beide jaren door dezelfde personen gedaan of door verschillende personen met uiteraard verschillende waarnemingsvermogens?
4. Diverse andere toevallige omstandigheden, die de resultaten kunnen beïnvloeden.

Wat betreft de factor 1, het weer, kan opgemerkt worden dat het voorjaar van 1978 niet gunstig voor het inventariseren was. In het desbetreffende rapport is er sprake van koud en somber weer in april en mei, zodat er vaak weinig zang was. In 1979 waren de weersomstandigheden zeker niet beter, eerder nog slechter; het was een koud voorjaar met weinig zang, zodat weer niet optimaal geïnventariseerd kon worden.

En dan de factoren 2 en 3. Aan de hierin genoemde criteria voldoen sommige vakken niet, deels omdat daarin in dit voorjaar andere waarnemers gewerkt hebben dan in 1978, deels omdat sommige delen mogelijk minder goed onderzocht zijn dan het vorig jaar.

Het is daarom niet raadzaam, de totaalcijfers per soort voor de beide jaren zonder meer met elkaar te vergelijken.

Om toch een enigszins redelijke vergelijking tussen de jaren mogelijk te maken, zullen we een viertal vakken beschouwen, die in beide jaren door dezelfde mensen zijn onderzocht, die er in beide jaren ongeveer evenveel tijd aan hebben besteed. Tevens betreft het hier waarnemers, die voor het inventariseren niet op de week-einden waren aangewezen, zodat ze ook van de weekse dagen met beter weer gebruik hebben kunnen maken.


Dit zijn de vakken B, E, H en G, die op bijgaand kaartje gearceerd zijn aangegeven. Zoals u ziet, vormen deze vakken een doorsnee van het gehele terrein van west naar oost, waarin de kalere buitenduinen vertegenwoordigd zijn.

Opgemerkt zij nog, dat met het kiezen van deze vier vakken als een doorsnee van het terrein voor een vergelijking in de jaren, niet gezegd wil zijn, dat de andere vakken niet goed geïnventariseerd zouden zijn. Ook de gegevens daarvan zijn zeer waardevol en komen in dit rapport ook zeker tot uiting. Zie o.a. lijst totaalcijfers op pagina

Vergelijking tussen de beide jaren 1978 en 1979 van de aantallen territoria per vogelsoort, gevonden in de vakken B, E, H en G.

In bijgaan de tabel zijn voor dit deel van het gebied de gevonden aantallen per vogelsoort per vak genomen, alsook steeds het totaal per soort.

Hierbij zijn wel enige soorten weggelaten, namelijk die waarvoor een vergelijking toch niet goed mogelijk is, zoals bijv. de Houtsnip en de Koekoek, waarvan de territoria moeilijk vast te stellen zijn. Verder de Houtduif, waarvan de aantallen voor 1978 deels op schattingen berusten, en nog enkele anderen zoals Kauw, Tjiftjaf en Ringmus.



Torenvalk

Torenvalk Voor dit deel werd het aantal territoria gesteld op 2 à 3 tegenover 4 in het vorig jaar. Er is echter een ander vak dat een groter verschil te zien geeft, en wel vak A met 1 à 2 territoria dit jaar tegen 5 in 1978. Dit betreft het vak, waarbij de vuilstortplaats aan de Zeeweg gelegen was.

Het buiten gebruik stellen van deze vuilstortplaats kan in de vermindering daar van het aantal Torenvalken een rol gespeeld hebben.

Scholekster; Daarvan waren er dit voorjaar blijkbaar belangrijk minder 3 à 4 tegen 7 paar in 1978.

Kievit en Wulp; Deze beide grondbroeders waren er nog in even groot aantal als vorig jaar. Wij hebben niet kunnen konstateren, dat er jongen waren. In vak B alarmeerden 27/5 wulpen van 2 jaar.

Holenduif; Er zijn wat meer Holenduiven gezien, zodat men schat dat er 4 paren waren tegenover 2 paren in 1978. Dit wil nog zeker niet zeggen, dat hier van een toename sprake is, want de soort is moeilijk te inventariseren in het duingebied en nesten zijn niet gevonden.

Tortelduif; Er waren er wat meer dan vorig jaar: 16 à 17 territoria tegenover 12 in 1978.

Bosuil; Men komt voor deze soort in dit deel op 3 à 4 territoria tegenover 1 in 1978. Dit verschil zal, zeker voor een deel, toe te schrijven zijn aan het feit, dat er dit voorjaar meer in de avonduren is waargenomen.

Ransuil; Voor 1978 hadden we geschat, dat er in dit hele duingebied 1 à 2 paar zouden zijn. Dit jaar niet in genoemde 4 vakken waargenomen. Zie voor geconstateerd broedgeval blz.

Groene Specht; Van beide soorten is het aantal ongeveer

Grote Bonte Specht; gelijk gebleven.

Boomleeuwerik; Het thans waargenomen aantal territoria van 7 à 8 is nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar.

Veldleeuwerik; Deze soort schijnt iets in aantal teruggelopen te zijn, 7 à 8 territoria tegen 11 vorig jaar. In een ander vak, vak F, waar er in 1978 niet minder dan 16 geteld waren, kwam men dit jaar slechts op een aantal van 7.

Mogelijk heeft de strenge winter van 1978/1979 met de zware ijzel een teruggang in het aantal veldleeuweriken veroorzaakt.

Zwarte Kraai; Deze schijnt toegenomen te zijn. Men komt op 4 paar in deze vakken, tegen 1 paar het vorig jaar. In mei werd 1 Kraai dood gevonden in vak H.

Ekster; In beide jaren nagenoeg gelijk in aantal, ruim 10 paar. Er is ook een ekster met jongen gevonden.

Vlaamse Gaai; Daarvan zijn er thans minder waargenomen. Het aantal territoria werd gesteld op 3 tegenover vorig jaar 6.

Koolmees; Er zijn er weliswaar minder geteld dan vorig jaar, namelijk 48 tegenover 60, maar dat hoeft nog niet op een vermindering te duiden. Het al of niet zingen van de vogels speelt hier een grote rol.

Pimpelmees; Men komt hier op ongeveer hetzelfde aantal als het vorig jaar, 15 territoria tegen 17 in 1978.

Glanskop; Deze mees is hier totaal gelijk gebleven met 6 territoria, maar wel met een andere verdeling over de vakken. Vak G geen tegen 2 het vorig jaar, terwijl de soort in vak H is toegenomen van 4 naar 6 territoria. In de meer westelijk gelegen vakken komt de soort niet voor.

Staartmees; In beide jaren zijn 2 territoria vastgesteld.

Boomklever; Waren er 1978 in het oostelijk vak H 2 territoria aangetroffen, dit jaar ontbrak de soort in het gehele gebied.

Boomkruiper; Van deze soort zijn er dit jaar belangrijk minder waargenomen dan in 1978; slechts 1 tegenover 5 het vorig jaar. Dit zal ongetwijfeld toe te schrijven zijn aan de voorafgaande strenge winter.

Winterkoning; De uitwerking van de strenge winter van 1978/1979 komt bij deze soort wel heel markant tot uiting. Slechts 4 territoria waren er over van de 68 die er in 1978 waren.

Voor de vogels die niet wegtrekken en vooral voor die soorten die niet bij de mensen op de voertafel komen, waartoe ook de winterkoning behoort, was die winter wel buitengewoon hard. Behalve door de dikke sneeuwlaag kwam dit vooral door de ijzel, die meerdere dagen achtereen alle bomen en struiken met een ijslaag afsloot voor de vogels die daarop aangewezen waren voor hun voedsel.

Nu maar zien, hoe gauw de soort op haar oude aantal teruggekomen zal zijn.

Roodborst; Het aantal roodborsten bleek ook belangrijk minder te zijn dan in 1978. Vastgesteld werden 16 territoria tegenover 28 het voorafgaande jaar.

Nachtegaal; Voor de nachtegaal komen we voor beide jaren op ongeveer hetzelfde aantal uit, namelijk + 30 territoria in deze 4 vakken.

Paapje; Deze soort was dit jaar zwakker vertegenwoordigd. Het aantal territoria in deze vakken was 3 á 4 tegen 5 á 6 in 1978. Opmerkelijk is, dat er nu een gevestigd was in het oostelijk vak H.

Roodborsttapuit; Deze soort werd in beide jaren in ongeveer hetzelfde aantal waargenomen, + 10 territoria.

Tapuit; In de beide jaren werden 2 territoria in deze vakken vastgesteld.

Merel; Een weinig belangrijk verschil tussen de beide jaren. Er werden + 20 territoria geteld tegenover 24 in het jaar ervoor.



Gekraagde Roodstaart; Van deze soort waren er nog iets meer dan er in 1978 al waren, namelijk 32 territoria tegenover 27 het jaar daarvoor.

Zanglijster; In beide jaren 2 á 3 territoria.

Sprinkhaanrietzanger; In beide jaren vond men ongeveer 5 territoria.

Zwartkop; Dit zomierzangertje komt alleen in het oostelijk deel van het gebied voor, waar hoger geboomte is. Dit voorjaar 3 territoria tegen 2 in 1978.

Tuinfluitier; Deze kwam alleen in de meest oostelijke vakken G en H voor. In beide jaren 2 territoria.

Grasmus; We komen voor deze soort op minder territoria dan vorig jaar, namelijk 11 à 15 tegenover 19 in 1978. Het verschil wordt veroorzaakt door aantallen in vak B, dat een zeer gunstig terrein voor de grasmus is en dat voornamelijk bestaat uit open duin met veel duindoornbegroeiing. Op dat stuk werden vorig jaar 8 territoria vastgesteld en nu met zekerheid maar 2. Er zijn daar op vele plaatsen nog wel exemplaren waargenomen, maar dat betrof in hoofdzaak maar 1 of 2 malige waarnemingen en wel in de tijd van sterke doortrek van de soort, omstreeks half mei, zodat we die voor doortrekkers houden.

In vak H zijn drie maal jonge grasmussen gezien.

Braamsluiper; Dit is een nogal moeilijke soort om te inventariseren. De meeste van de waarnemingen betreffen doortrekkende vogels. We hebben dit voorjaar 3 territoria kunnen vaststellen, vorig jaar 1.

Fitis; Bij dit voor het duingebied meest talrijke vogeltje, dat op de grond broedt, is tussen de beide jaren geen aantalsverschil van betekenis te constateren.

Heggemus; Er blijken wat minder Heggemussen te zijn waargenomen dan vorig jaar; 49 tegen 57 in 1978.

Graspieper; Aantal in beide vakken hetzelfde, zij het, dat ze thans meer verspreid waren over verschillende vakken; in 1978 kwamen ze alleen in het meest westelijke vak voor. Het duin is overigens geen optimaal biotoop voor deze soort vandaar dat deze er slechts in klein aantal voorkomt.

Boompieper; Deze werd iets minder waargenomen dan vorig jaar, maar het verschil van 21 à 22 dit jaar tegen 25 in 1978 is van weinig betekenis.

Spreeuw; Er broeden niet zoveel spreeuwen in dit gebied. De vermelde aantallen van 18 tegen vorig jaar 25 zou op een vermindering in aantal van de spreeuw kunnen duiden. De spreeuw is in onze streek al sinds jaren sterk achteruit gegaan, waarschijnlijk door landbouwvergiften, vooral ook op de bollenvelden. Overigens hebben we de indruk, dat onze spreeuwen in de strenge winter van 1978/1979 een harde klap gekregen hebben tijdens hun verblijf in England.

Groenling; Terwijl men in 1978 op 5 territoria van de groenling kwam, kon men er thans niet één in dit gebied vaststellen. Slechts éénmalige waarnemingen werden van deze soort genoteerd. Ook in de andere vakken haast allemaal éénmalige waarnemingen.

Kneu; Deze kwam weer even talrijk in het duin voor. Een vaste plaats van deze vogels is altijd moeilijk te bepalen. Het aantalsverschil van 21 tegen 25 is daarom ook niet van betekenis.

Vink; Van de vink, die er in 1978 slechts met 3 paar voorkwam, werden thans 9 territoria geteld, een flinke toename dus.

Rietgors; De rietgors, die men hier in dit duingebied niet zo gauw zou verwachten, was evenals in 1978 nu ook weer in vak B present met 2 territoria.

Tot zover de aantals vergelijking, die betrekking heeft op de genoemde 4 vakken.

Verdere opmerkingen over de vogels in het gehele gebied.

Fuut; Ook thans weer 1 paar in het meer.

Bergeend; Is moeilijk te tellen. Het hoogste aantal, dat waargenomen werd, is 24 ex. in het meer op 22 april. Op 13 mei is er een bergeend met 4 jongen gezien

Nijlgans; Was ook thans weer met 2 à 4 ex. in het meer aanwezig.

Wilde eend; In klein aantal hier en daar waargenomen.

Buizerd; Deze werd veelvuldig gezien. Er zou een broedgeval geconstateerd zijn, maar dat trekken we in twijfel. Op 8 mei is er evenwel een paar baltsend gezien boven het dennebos in vak H. Op 10 juni zag familie van Galen 4 buizerden cirkelend boven vak K, terwijl ze de indruk kregen dat er 2 jongen bij waren.

Sperwer; Deze werd weer vele malen waargenomen in vak H door mevr. Antonisse en ook door anderen. Op 19 april zag mevr. Antonisse een copulatie van sperwers en op 16 mei nam ze 's morgens een baltsvlucht heel hoog in de lucht waar. Het nest is echter niet gevonden.

Boomvalk; Een broedgeval hiervan is geconstateerd. Er zijn 3 jongen uitgevlogen.

Patrijs; Deze is ook weer waargenomen, slechts op één plek.

Fazant; niet geteld.

Waterhoen; Weer in twee paar aanwezig.

Meerkoet; 2 paar in het meer.

Kleine plevier; Er waren weer 2 paartjes aan het meer. Er waren 2 legsels. Geen jongen waargenomen.

Houtsnip; Op grond van de verschillende waarnemingen schatten we dat er in het geheel gebied wel + 6 paar huizen.

Turkse tortel; Er zijn 2 paar gesignaleerd.

Koekoek; Deze soort zal er weer in + 6 territoria aanwezig geweest zijn. Het is heel moeilijk te bepalen. Ze komen in elk geval door het gehele gebied voor. In vak H soms 2 mannetjes tegelijk waargenomen.

Bosuil; Volgens de beschikbare waarnemingen zouden we nu het aantal van deze soort op 3 à 4 territoria kunnen stellen.

Ransuil; Van deze soort minstens 1 paar in het dennenbos in vak A te zuidwesten van de manege, zijn jongen gehoord.

Kleine bonte Specht; Deze was ook weer aanwezig met 1 territorium in vak G.

Zwarte specht; Deze is in het gebied wel enkele keren waargenomen.

Wielewaal; Deze is ook dit voorjaar weer waargenomen in vak G tegen de zuidoosthelling.

Grote lijster; Hiervan 1 à 2 territoria tegen 1 in 1978. Eén rond het grote dennenbos van vak H. De andere in vak F, dicht bij de zuidgrens, maar deze is slechts éénmaal gehoord.

Spotvogel; In vak D werd in juni een zingende spotvogel waargenomen.

Goudhaan; Waargenomen in april in het dennenbos van vak D. Ze zaten daar te zingen, het zou kunnen zijn dat ze daar hun territoria hadden. Latere waarnemingen ontbreken; zijn het doortrekkers geweest?

Witte kwikstaart; Was ook weer present met 2 à 3 paar.

Ringmus; Werd ook weer in klein aantal waargenomen.

Barmsijs; Hiervan werd een exemplaar waargenomen aan de westrand van het noordelijk dennenbos van vak C op 8 april.



Aantal gevonden territoria in vier vakken van het Kraansvlak, geïnventariseerd in 1978 en 1979, in beide jaren door dezelfde mensen.


Vak:	B		E		H		G		Totaal in 4 vakken	
	'78	'79	'78	'79	'78	'79	'78	'79	'78	'79
Torenvalk	2	1nest	-	-	1	1?	1	1nest	4	2à3
Scholekster	4	1à2	1	1	2	-	-	1	7	3à4
Kievit	4	4	-	-	-	-	-	-	4	4
Wulp	3	3	1à2	1à2	3	3	2	1	9à10	8à9
Holenduif	-	1	1	-	1	2	-	1	2	4
Tortelduif	2	1	3	2	5	7à8	2	6	12	16à17
Bosuil	-	-	-	1	1	1	-	1à2	1	3à4
Groene Specht	-	-	-	-	2	2	1	1	3	3
Gr.B.Specht	-	-	-	-	2	3	1	1	3	4
Boomleeuwerik	-	-	4	3à4	3	3	1	1	8	7à8
Veldleeuwerik	8	6à7	2	1	-	-	1	-	11	7à8
Zwarte Kraai	-	2	1	1	-	-	-	1	1	4
Ekster	3	4à5	2	3	3	1	2	2à3	10	10à12
Vlaamse Gaai	-	-	1	1	2	1?	3	1à2	6	3
Koolmees	4	3à4	11	6à7	21	21	24	17	60	48
Pimpelmees	-	-	4	1	7	11	6	3	17	15
Glanskop	-	-	-	-	4	6	2	0?	6	6
Staatmees	-	-	-	1	1	1	1	-	2	2
Boomklever	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
Boomkruiper	-	-	-	-	4	1	1	-	5	1
Winterkoning	9	1	9	1	24	-	26	2	68	4
Roodborst	-	-	2	2	18	8	8	6	28	16
Nachtegaal	-	-	3	3	12	15	17	12	32	30
Gekr.Roodstaart	-	-	6	6	16	18	5	8	27	32
Paapje	5	2à3	-	-	-	1	1?	-	5à6	3à4
Roodborsttapuit	8	8	1	1?	-	-	-	2	9	10à11
Tapuit	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2
Merel	3	2à3	3	2à3	6	9	12	6	24	+20
Zanglijster	-	-	1à2	1?	-	1	1	1	2à3	2à3
Sprinkh.rietzanger	2	4	-	-	3	1?	-	-	5	4à5
Zwartkop	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3
Tuinfluit	-	-	-	-	2	1	-	1	2	2
Grasmus	8	2à5	4	3	5	5	2	1à2	19	11à15
Braamsluiper	1	1	-	1	-	1	-	-	1	3
Fitis	42	+40	15	21	44	35	39	33	140	130
Heggemus	21	17à19	7	6	9	12	20	13	57	49



Aantal gevonden territoria in vier vakken van het Kraansvlak (vervolg)

Vak:	B		E		H		G		Totaal in 4 vakken	
	'78	'79	'78	'79	'78	'79	'78	'79	'78	'79
Graspieper	3	1	-	2	-	-	-	-	3	3
Boompieper	4	5à6	4	3	6	5	11	8	25	21à22
Spreeuw	-	-	3	2	10	8	12	8	25	18
Groenling	-	-	-	-	3	-	2	-	5	-
Kneu	9	9	4	4	4	3	8	5	25	21
Vink	-	-	-	1	2	5	1	3	3	9
Rietgors	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2

Verdeling in vakken van het onderzochte duingebied "Kraansvlak"



We laten hieronder toch ook een lijst volgen van de totale aantallen in het gehele onderzochte gebied gevonden territoria per soort in de beide jaren 1978 en 1979, dit ondanks de op pag.62 genoemde bezwaren tegen een vergelijking van deze cijfers.

	<u>Aantal vastgestelde territoria</u>	
	<u>1978</u>	<u>1979</u>
Fuut	1	1
Bergeend	<u>+8</u>	<u>+8</u>
Wilde Eend	aantal niet bekend	
Sperwer	regelmatig gezien; zie tekst	
Torenvalk	7à9	3à4
Patrijs	2	1
Fazant	niet geteld	
Waterhoen	1à2	2
Meerkoet	1à2	2
Scholekster	<u>+20</u>	13à15
Kievit	15	16
Kleine Plevier	2	2
Wulp	<u>+20</u>	<u>+20</u>
Houtsnip	2 of meer	<u>+6</u>
Holenduif	7	<u>+5</u>
Houtduif	150 geschat	75 geschat
Tortelduif	30	30
Turkse Tortel	1	2
Koekoek	<u>+6</u>	<u>+6</u>
Bosuil	1à2	3à4 mogelijk wel 5
Ransuil	1à2	1à2
Groene specht	4	4
Grote Bonte Specht	4	5
Kleine Bonte Specht	1	1
Boomleeuwerik	18à20	11à 12
Veldleeuwerik	33	22
Zwarte kraai	3à5	6
Kauw	<u>+12</u>	<u>+12</u>
Ekster	25à30	<u>+25</u>
Vlaamse Gaai	<u>+10</u>	4
Koolmees	90 minstens	90 minstens
Pimpelmees	26	20
Glanskop	7	8
Staartmees	2à3	5
Boomklever	2	-
Boomkruiper	6	2

Totaallijst van het gehele gebied (vervolg)

	<u>Aantal vastgestelde territoria</u>	
	<u>1978</u>	<u>1979</u>
Winterkoning	+90	+9
Roodborst	35	22
Nachtegaal	+44	+40
Gekraagde Roodstaart	+40	42
Paapje	8à9	5à6
Roodborsttapuit	26	+18
Tapuit	23	17à20
Merel	45	+37
Zanglijster	3	3
Grote lijster	1	1 mogelijk 2
Sprinkhaanrietzanger	5	7
Bosrietzanger	1	-
Zwartkop	3	4
Tuinfluitier	2	3
Grasmus	30	23
Braamsluiper	1	3
Fitis	+280	+250
Tjiftjaf	3	3
Heggemus	97	+75
Graspieper	5	8
Boompieper	44	+37
Witte Kwikstaart	1à2	2à3
Spreeuw	+30	+25
Huismus	aanwezig in klein aantal	
Ringmus	5	+8
Groenling	5	2 mogelijk meer
Kneu	+60	+50
Vink	6	13
Rietgors	3	3

Incidentele waarnemingen gedurende de periode  
van inventariseren

Behalve de broedvogels zijn er natuurlijk evenals vorig jaar verschillende soorten op doortrek waargenomen, die ten dele ook korte tijd in het terrein verbleven om er te fourageren en te rusten. Behalve de vogelsoorten, die ook in de broedvogellijst voorkomen waren dat:

Rode Wouw; Op 25 april en 6 mei overvliegend waargenomen door de dames Heidweiller en Molenaar.

Zwarte Wouw; Op 4 juni 2 exemplaren waargenomen door mevr. Heidweiller. Ze werden geattaqueerd door Zwarte Kraaien en/of Meeuwen.

Blauwe Kiekendief; Waargenomen op 4 maart en op 4 juni, beide wijfjes.

Boerenzwaluw; Op doortrek.

Beflijster; Waargenomen door de familie van Galen, en wel drie maal in de periode van 21 april tot 6 mei in vak K.

Snor; Door mevr. Vaandrager werd op 15 mei een Snor gehoord in de moerasjes in het zuidoostelijk deel van vak B.

Vuurgoudhaantje; Op 1 april nam mevr. Vaandrager er een waar van heel dichtbij, in vak L.

Bonte Vliegenvanger; Op 8 mei en 12 mei is een Bonte Vliegenvanger waargenomen.

Verdere waarnemingen in en aan het meer in vak L.

Blauwe reiger

Nijlgans, op 15 april waren er 4 exemplaren

Wilde Eeend

Wintertaling

Krakeend 1 paar op 29 april

Slobeend 8 exemplaren op 8 april

Tafeleend, 1 paar op 1 april

Kuifeend

Regenwulp

Grutto, gehoord

Tureluur

Oeverloper

Zilvermeeuw

Kokmeeuw

Voorts was er in het riet een slaappleats van Witte Kwikstaarten. Met het donker worden kwamen er daar veel Kwikstaarten slapen, in elk geval meer dan 10. Dit is waargenomen op 10 en 25 april.

Tenslotte vermelden we nog, dat er verwilderde katten en vossen in het gebied zijn aangetroffen.

Aan dit onderzoek hebben meegewerkt:

De Heren W.J.H. en C. Akkerman

mevr. A. Antonisse

hr en mevr. K. Beijlevelt

hr en mevr. F. Bloem

heer J. Daan

hr en mevr. P.J. van Galen

mevr. C. Heidweiller

hr en mevr. A. Kooy

heer A.E. Leutscher

heer J.C. Lorits

heer M. Luikinga

mevr. C. Molenaar

mevr. A.A. Vaandrager

Samensteller van dit rapport: F. Bloem

Naschrift:

Bij het met elkaar vergelijken van de beide tabellen blijkt achteraf, dat de cijfers voor de uitgekozen 4 vakken en die van het gehele onderzochte gebied toch in het algemeen een zelfde beeld geven van de verhouding van de aantallen van 1978 ten opzichte van die van 1979. Houtduif; zoals in het verslag is gemeld, berust op het genoteerde aantal van 150 paar deels op schattingen. Aangetekend werden er totaal 128 territoria van deze soort. Voor 1979 werden slechts 53 territoria aangetekend, mogelijk is er te weinig op deze soort gelet. Voor dit jaar dan ook weer een grove schatting van ca. 75 paar.

