

BROEDVOGELS

Het jaar 1968 kenmerkte zich door veel slecht weer met bijzonder veel regen in het broedseizoen, waardoor veel jonge vogels omkwamen deels door de aanhoudende regen en lage temperaturen en deels door voedsel gebrek (insekteneters) wat ook het gevolg was van het slechte weer.

Het waren vooral de kieviten, grutto's en scholeksters en later ook de meerkoeten en alle eendensoorten die het meest te lijden hadden.

Vele kieviten en grutto's hadden nog maar 1 of 2 jongen over en verscheidene hadden zelfs niets meer.

Van de meerkoet werden verscheidene dode jongen gevonden en van de eenden waren het vooral de kuifeenden die zeer veel jongen verloren hebben, ook op later leeftijd, als ze al vliegvlug waren werden nog verscheidene dode jongen gevonden. Of dat allemaal door het slechte weer met daardoor weinig voedsel kwam is niet erg waarschijnlijk, daar er ieder jaar dode kuifeend jongen gevonden worden.

Er werden in het voorjaar enige tientallen dode of stervende houtduiven aangetroffen, evenals in oktober en november. Verder werden nog gevonden in augustus een 1^e jaars Ransuil en in oktober een overjarige Ransuil (al vergaan) en op 19 december werd nog een ad. ♀ Sperwer gevonden, alle zeer waarschijnlijk het gevolg van landbouwvergiften.

De op 5 augustus gevonden Ransuil werd door ons als pull. geringd, op 7 km. ten zuiden van de vindplaats. Deze Ransuil werd opgezonden om na te gaan waar hij aan gestorven was, het resultaat van het onderzoek was zeer veronrustend. Het residu-onderzoek op gechloreerde koolwaterstoffen gaf de volgende resultaten: De hersenen bevatte 0,3 mg. hexachloorbenzeen en 0,8 mg. DDE per kg. De leverresiduen vertoonde de volgende waarden:

0,9 mg.	hexachloorbenzeen	per kg.
---------	-------------------	---------

10,7 mg.	Lindaan	per kg.
----------	---------	---------

1,9 mg.	D.D.E.	per kg.
---------	--------	---------

57,9 mg.	D.D.T.	per kg.
----------	--------	---------

Hexachloorbenzeen is een ook hier te lande veelvuldig toegepast bestrijdingsmiddel tegen schimmels. Lindaan en DDT worden in diverse toepassingen gebruikt als insecticiden. DDE is een omzettingsprodukt van DDT; residuen hiervan worden als zodanig naast DDT in vele diersoorten aangetroffen.

Het relatief geringe gehalte DDE naast een hoog gehalte aan DDT wekt de indruk dat het hier gaat om een vergiftiging met een vrij acuut karakter.

Dit jaar kunnen we weer 2 nieuwe broedvogels aan onze lijst toevoegen, wat het totaal aantal broedvogels tussen 1957 en 1968 op 99 brengt.

NIEUWE BROEDVOGELS

WATERSNIP:

De vestiging van dit aardige snipje als broedvogel hebben we reeds enige jaren geleden verwacht, er ontstonden op de drains in de infiltratiegebieden enige gunstige biotopen en er werden tot in mei watersnippen waargenomen. Zelfs werd éénmaal balts waargenomen in eind juli 1967, maar dit hielden wij op een vroege trekvogel die het mooie weer in z'n hoofd had.

Dit jaar was het echter zo ver, er werden op verschillende plaatsen in het Zwarte veld, langs het rechte schusterkanaal en in het 1^e infiltratiegebied baltsende exemplaren waargenomen.

De eerste bevestiging van een broedgeval kwam van de jachtopzichter E. Hon-schoten, die op 7 en 9 juni langs een poel tussen G10-12 een exemplaar met 4 al vliegvlugge jongen zag.

Op 14 juni was op deze plaats nog een baltsend ♂ aan wezig. Langs het rechte schusterkanaal werd op 21 april de eerste baltsende watersnip gezien. Tijdens een bezoek aan deze plaats op 24 juni kwam er een ♂ alarmeren, die duik aanvallen uitvoerde wat na 5 min. in balts overging, hier heeft ook zeker een watersnip gebroed.

Van de andere baltsende watersnippen durven we ^{niet} met zekerheid te zeggen dat ze gebroed hebben, alhoewel dit wel zeer waarschijnlijk is. Samenvattend kunnen we zeggen dat er tussen 2 en 4 paar watersnippen gebroed hebben.

GRASPIEPER

Ook van deze soort verwachtten we al enige jaren een broedgeval, vooral in het 1^e infiltratiegebied. De eerste broedgevallen waren echter op een geheel onverwachte plaats en wel in de droge en kale buitenduinen ± 500 m. ten zuiden van het brederodepad.

Daar dit een terrein is wat weinig door ons bezocht wordt, is het niet onmogelijk dat de graspieper hier al eens eerder gebroed heeft.

Op 21 april werden 2 baltsende ♂♂ gezien, op 19 mei was er alarm en op 2 juni 2 paar alarmerend met voer in de snavel. Enige tijd later werden 2 zingende ♂♂ aangetroffen, zodat we kunnen zeggen dat er minstens 2 paar graspiepers (waarschijnlijk 2x) gebroed hebben.