

DE EEND ALS BROEDVOGEL IN DE A.W.DUINEN IN 1970

Evenals vorige jaren werd ook in 1970 een eendentelling gehouden om het aantal broedparen vast te stellen. De medewerkers aan deze telling waren de heren R.M.Dubbelt, A.J.van Dijk, F.J.Koning, P.C.van Spanje, T.M.van Spanje en H.Vader. In voorgaande jaren werd de telling gehouden omstreeks half juli omdat dan de pulli van de Kuifeenden eveneens kunnen worden geteld. Om ook van de overige eendensorten het aantal broedparen vast te stellen voldeed de half-juli-telling niet. Het bleek namelijk dat een groot deel van de vroeg zwellende zwemeenden het terrein dan reeds verlaten hadden. Daarom werd dit jaar besloten om twee tellingen te houden en wel op 17 mei en 5 juli. De eerste telling (17 mei) is voornamelijk om het aantal broedparen van alle eendensorten en meerkoeten vast te stellen. De tweede telling (5 juli) is om het broedresultaat te controleren, vooral van de Kuif- en Tafeleend.

Door een aantal Russische ornithologen is een populatieonderzoek bij de Kuifeend gedaan, waar uit bleek dat hoe groter de populatie werd, hoe minder pulli groot gebracht werden. Dit is nu precies wat ons in de A.W.-duinen ook al was opgevallen, doch wat wij niet konden verklaren. Ons bleek namelijk dat er wel grote aantallen pulli geboren werden, maar binnen één week na de geboorte was een groot aantal hiervan verdwenen. De laatste week van juni waren vooral in het eerste infiltratiegebied grote aantallen Kuifeend-pulli aanwezig maar tijdens de telling van 5 juli was dat aantal al sterk verminderd. Deze vermindering zette zich ook nog later voort, waardoor het eind juli normaal was om een Kuifeend ♀ te zien waar nog maar 2 of 3 pulli bij zwommen. Slechts een klein aantal Kuifeenden bracht een normaal aantal (7 tot 10 pulli) groot. Dit betrof vooral de late broedsels.

Bij het vaststellen van het aantal broedparen werd dezelfde methode toegepast als verleden jaar.

KUIFEEND

Tijdens de eendentelling op 17 mei telden we 650 paar Kuifeenden en nog eens 119 ♂♂ en 44 ♀♀ die (nog?) niet gepaard waren. We mogen echter wel aannemen dat de toen nog aanwezige ♀♀ tot onze broedvogels behoorden. Doordat de Kuifeenden ieder jaar iets vroeger gaan broeden is het zelfs waarschijnlijk dat een aantal ♀♀ reeds op het nest zaten, zodat deze niet

geteld werden. Het is dan ook waarschijnlijk dat het aantal broedende Kuifeenden minstens 694 paar bedraagt . Dit is in vergelijking met 1969 een vooruitgang van 87 paar.

#### TAFELEEND

Bij de Tafeleend werd eveneens aangenomen dat de aanwezige niet gepaarde ♀♀ ook tot de broedparen behoorden, zodat er waarschijnlijk minimaal 21 paar gebroed hebben. De tweede telling op 5 juli gaf echter een hoger aantal ♀♀ en paren aan, zodat het juiste aantal wel 24 paar zal zijn. Dit is in vergelijking met 1969 een achteruitgang van 11 paar.

#### WILDE EEND

De Wilde eend is een vroege broedvogel, (tijdens de telling van 17 mei werden al 21 ♀♀ met pulli geteld en nog op twee plaatsen een aantal losse pulli) hierdoor moesten wij een andere telmethode toepassen. Aangezien het grootste deel der ♀♀ tijdens de telling op de eieren zat, werd aangenomen dat ieder aanwezig ♂ behoorde bij een broedend ♀. Hierbij komen dan nog de gepaarde exemplaren wat het aantal op 194 paar bracht. Dit is in vergelijking met 1969 een achteruitgang van 44 paar.

#### SLOBEEND

Het zelfde geldt voor de Slobeend. Ook bij deze eendensoort werden al tijdens de telling van 17 mei 3 ♀♀ met pulli gezien. Ook nu nemen we dus aan dat elk aanwezig ♂ behoorde bij een broedend ♀, hetgeen resulteerde in 216 paar. Dit is in vergelijking met 1969 een vooruitgang van 59 paar.

#### WINTERTALING

Het aantal broedgevallen van de wintertaling schijnt aardig konstant te blijven. Ook van dit eendje werd aangenomen dat de broedvogelbevolking bestond uit het aantal gepaarde exemplaren + het aantal solitaire ♂♂ wat het totaal bracht op 91 paar. Vorig jaar 95 paar.

#### BERGEEND

De Bergeend heeft zich weer flink uitgebreid wanneer wij aannemen dat ook alle aanwezige paren gebroed hebben. We telden 50 paar + nog 11 ♂♂ wat het totaal op 61 paar bracht.

#### KRAKEEND

De Krakeend werd in 1970 als nieuwe broedvogel genoteerd. Reeds een aantal jaren werden Krakeenden tot ver in mei waargenomen, doch een broedgeval werd nog niet eerder door ons vastgesteld. Tijdens de telling van 17 mei noteerden wij 9 paar + 7 ♂♂, wat we voor 16 paar rekenden. Op 5 juli echter werden 8 ♀♀ met pulli geteld + 7 ♀♀ zonder pulli + 6 ♂♂ +

4 paar. Dit zou kunnen betekenen dat het aantal broedparen nog iets hoger ligt, vermoedelijk rond de 20 paar.

#### ZOMERTALING

Van de Zomertaling werd slechts 1 ♂ geteld tijdens de eerste telling. Een broedgeval werd niet vastgesteld doch is niet uitgesloten.

#### MEERKOET

Van de Meerkoet is geen zinnig woord te zeggen, volgens de telling van 17 me. zouden maar ± 83 paar gebroed hebben. Het juiste aantal is echter veel hoger en zal wel tussen de 180 en 200 paar liggen.

Op bladzijde 6 en 7 vindt u de totaaloverzichten van de verrichte tellingen. De hierin gebruikte afkortingen en tekens zijn de volgende:

♂♀ = paar zonder pulli

♂ = mannetje zonder pulli

♀ = vrouwtje zonder pulli

♀+ = vrouwtje met pulli

p. = pulli = jongen

e. = volwassen exemplaren waarvan de sekse onbekend is.