

De Inlaagpolder 1979.

Deze polder, groot ca. 350 ha, gelegen ten oosten van Spaarndam, die wordt begrensd door de Spaarndammerdijk, Inlaagdijk, Ringweg en Hornweg, is in 1979 geïnventariseerd op aanwezige vogels.

De polder, die hoger ligt dan de omringende polders, bestaat voor het grootste deel uit grasland, waar koeien en schapen zich verzamelen.

Bouwland komt voornamelijk langs de Ringweg voor met kleine percelen. De waargenomen vogels zijn geregistreerd op de wijze zoals Prof. Dr. D.M. de Vries de gebondenheid van de soort met het gebied tot uitdrukking bracht.

Deze methodiek is overgenomen in 1977, maar toen ook al uitgebreid met de kolommen: aantallen, gemiddelde en voorkomend.

Hiervoor is gekozen daar er interesse aanwezig is dit poldergebied enige jaren te observeren en door harde bewijzen hopenlijk te kunnen vrijwaren voor aantasting.

Helaas is deze genoemde oud-hoogleraar en zeer kundige natuurvriend op 2 aug. 1979 overleden. Ook de V.W.G. heeft goede en waardevolle contacten met de heer de Vries gehad. Onvergetelijk was het genoeg dat hij en zijn vrouw beleefden tijdens een door de V.W.G. Haarlem verzorgde wandeling door het Nationaal Park "De Kennemerduinen" op 22 mei 1965, in het kader van de jaarlijkse contactdag voor vogelstudie van de K.N.N.V. bij het aanschouwen van de Zwartkopmeeuw in het Grote Vogelmeer.

Een leuke waarneming tijdens de winter betrof op 10 febr. twee Sneeuwgorzen langs de Inlaagdijk op zoek naar voedsel op wel het onaangenaamste plekje van de gehele polder, namelijk daar waar men meent zijn afgedankte rommel te kunnen deponeren.

Deze gorzen bekend van de basaltdijken in De Cocksdorp en in de omgeving van Parnassia in de Kennemerduinen worden hier niet verwacht. In het nu volgende totaaloverzicht wordt de standvastigheid, of gebondenheid, van een soort met het gebied tot uitdrukking gebracht in procenten en wel als volgt:

Getroffen (Getr.) x 100 = Standvastigheidswaarde (S.v.h.W.)
Bezocht (Bez.)

Naam	Aantallen			Voorkomend	Bez.	Getr.	SvhW
	Min.	Max.	Gem.				
Blauwe reiger	1	6	3.0	veelal	22	19	86.36
Wilde eend	3	172	39.9	gehele jaar	22	22	100
Wintertaling	3	74	21.8	31/3, 21/4, 28/7, 10/11 24/11 en 8/12	22	6	27.37
Pijlstaart	8	8	8.0	6/3	22	1	4.55
Slobeend	2	12	5.8	31/3, 21/4, 12/5, 8/12	22	4	18.18
Bergeend	2	8	5.3	31/3, 21/4, 12/5, 2/6	22	4	18.18
Grauwe gans	9	9	9.0	eind febr.	22	1	4.55
Kolgans	55	119	87.0	23/2 en 6/3	22	2	9.09
Rietgans	18	18	18.0	eind febr.	22	1	4.55
Knobbelzwaan	2	4	2.5	31/3, 21/4, 12/5, 9/9	22	4	18.18
Wilde zwaan	2	2	2.0	5/3, 6/3 en 14/3	22	3	13.62
Buizerd	1	1	1.0	31/3 en 18/8	22	2	9.09
Sperwer	1	1	1.0	23/12	22	1	4.55
Br.kiekendief	1	1	1.0	2/6, 1/9, 9/9, 10/11	22	4	18.18
Bl.kiekendief	1	2	1.2	10/2, 14/3, 31/3, 8/12 22/12 en 23/12	22	6	27.27
Torenvalk	1	5	2.1	veelal aanwezig	22	15	68.18
Patrijs	1	42	13.3	veelal aanwezig	22	15	68.18
Fazant	1	40	7.8	vaak aanwezig	22	11	50
Waterhoen	1	3	2.0	31/3 en 20/10	22	2	9.09
Meerkoet	3	3	3.0	14/3	22	1	4.55
Scholekster	2	31	13.3	v.a. 14/3 t/m 28/7	22	8	36.18
Kievit	16	1497	290.5	v.a. 14/3	22	20	90.91
Goudplevier	91	800	404.7	t/m 31/3 en v.a. 22/9	22	10	45.45
Kleine plevier	2	2	2.0	21/4	22	1	4.55
Watersnip	6	13	9.5	6/10 en 10/11	22	2	9.09
Bokje	1	1	1.0	23/12	22	1	4.55
Wulp	1	27	8.4	vaak aanwezig	22	11	50
Regenwulp	2	2	2.0	3/11	22	1	4.55
Grutto	4	35	16.6	v.a. 14/3 t/m 28/7	22	8	36.18
Witgatje	1	1	1.0	6/10	22	1	4.55
Oeverloper	1	1	1.0	10/11	22	1	4.55
Tureluur	1	10	5.3	v.a. 31/3 t/m 22/9	22	9	40.91
Gr.mantelmeeuw	6	6	6.0	14/3	22	1	4.55
Zilvermeeuw	2	24	8.6	14/3, 21/4, 20/10, 8/12 22/12	22	5	22.73
Stormmeeuw	1	56	10.4	veelal aanwezig	22	17	77.27
Kokmeeuw	9	311	104.7	bijna gehele jaar	22	21	95.45
Visdief	5	5	5.0	2/6	22	1	4.55
Houtduif	1	88	24.2	veelal aanwezig	22	18	81.82
Tortelduif	2	5	3.3	23/6, 28/7 en 18/8	22	3	13.62
Turkse tortel	1	9	5.0	1/9 en 9/9	22	2	9.09
Koekoek	1	1	1.0	2/6 en 23/6	22	2	9.09
Gierzwaluw	1	153	41.0	v.a. 12/5 t/m 28/7	22	4	18.18
Veldleeuwerik	2	90	11.9	bijna gehele jaar	22	21	95.45
Boerenzwaluw	8	115	41.3	v.a. 21/4 t/m 6/10	22	11	50
Huiszwaluw	3	51	17.2	v.a. 2/6 t/m 1/9	22	5	22.73
Graspieper	2	11	4.1	t/m 3/9	22	14	63.64
Witte kwikst.	2	11	4.9	v.a. 21/4 t/m 22/9	22	8	36.18
Gele kwikst.	4	12	8.4	v.a. 21/4 t/m 9/9	22	9	40.91
Kramsvogel	3	69	30.2	nov. en dec.	22	5	22.73
Koperwiek	1	61	26.3	v.a. 20/10	22	6	27.27

Naam	Aantallen			Voorkomend	Bez. Getr. SvW		
	Min.	Max.	Gem.				
Merel	1	3	1.7	14/3, 14/7 en 23/12	22	3	13.62
Tapuit	2	3	2.8	21/4, 12/5, 18/8, 22/9	22	4	18.18
Sneeuwgorst	2	2	2.0	10/2	22	1	4.55
Kneu	2	31	16.3	31/3, 21/4 en 10/11	22	3	13.62
Keep	31	31	31.0	2 ^F /11	22	1	4.55
Huismus	15	66	30.4	gehele jaar	22	22	100
Ringmus	4	4	4.0	28/7	22	1	4.55
Spreeuw	18	1119	165.4	bijna hele jaar	22	21	95.45
Zwarte kraai	1	23	6.8	bijna hele jaar	22	21	95.45
Bonte kraai	1	7	3.3	t/m 10/2 en v.a. 3/11	22	8	36.18
Kauw	1	39	9.4	veelal aanwezig	22	16	72.73
Ekster	2	7	3.2	veelal aanwezig	22	15	68.18

De Tortelduif heeft gebroed in de elzenhagen, die als windbeschutting dienen ter bescherming van de dichtbij gelegen boomgaarden.

Witgatje (*Tringa ochropus* L.)

Tijdens het inventariseren van de Inlaagpolder, gelegen oostelijk van Spaarndam, is vanaf de Ringweg in de onderbemaalde greppel F 9, gelegen in de houtrakpolder, meerdere malen een Witgatje gezien.

Deze greppel vormt de scheiding van een tarwe- en bietenveld.

De genoemde steltloper gezien op:

12 mei met 2 ex., 23 juni met 1 ex., 14 juli met 1 ex., 28 juli met 3 ex., 18 aug. met 1 ex. en 1 sept. met 2 ex.

Is op 9 sept. tijdens drukke oogstwerkzaamheden op het land niet waargenomen.

Indien leden van de Vogelwerkgroep ook over waarnemingen beschikken uit deze polder en ongeveer zelfde maanden, wordt een berichtje zeer op prijs gesteld, waardoor eventueel kan worden vastgesteld, of genoemde steltloper hier heeft overzomerd.

E. Dijkstra
Indischestraat 131
2022 VS Haarlem