

Elswout
Nestkastonderzoek 1963 en 1964

In Elswout hangen 24 nestkasten, 5 open kasten voor Vliegenvangers, 5 sleetkasten voor Pimpelmezen en Boomkruipers en 14 Koolmeeskasten.

1963

In 1963 zijn de kasten 4 maal gecontroleerd,; de eerste keer op 13 mei, vervolgens op 21 mei, op 2 juni en de laatste controle vond plaats op 18 juni.

In het voorjaar van 1963 volgden depressies elkaar regelmatig op, afgewisseld door kleine ruggen van hoge druk. Dat wil dan zeggen, om de dag regen met korte opklaringen, waarbij dan in heldere nachten sterke afkoeling optrad. Het was dus guur weer met koude nachten, wat zeer ongunstig was voor de jonge vogels. Het gras groeide hard, maar het ontluiken der bomen werd sterk geremd. Het duurde tot na half mei, voordat de eiken groen waren, wat zeer laat is. Er waren daardoor ook laat en weinig rupsen van o.a. de eikebladspinner. De legsels waren niet groot en het sterftecijfer onder de jonge Mezen was groot. De Boomkruiper en de Boomklever bezetten ieder weer 1 kast; van deze broedsels vlogen een aantal jonge uit. De Pimpelmezen bezetten 4 kasten en de Koolmezen 13 kasten. In 2 kasten vonden we een 2e broedsel.

De broedresultaten waren:

Gr. Vliegenvanger	: 3 broedparen,	10 eieren,	3 jongen.
Boomkruiper	: 1 "		6 "
Boomklever	: 1 "	onbekend,	onbekend, de schuif zat dicht- gekit.
Pimpelmees	: 4	34 eieren,	19 jongen.
Koolmees	: 13	104 "	76 " , 63 uitgevlogen.

1964

Ook in 1964 hebben wij de nestkasten 4 maal gecontroleerd; de eerste controle op 27 mei, vervolgens op 16 en 25 juni en de laatste keer op 2 juli. In het voorjaar van 1964 was het weer in mei, de belangrijkste maand voor de jonge vogels, aan de zonnige en warme kant. Eind april werden de bomen snel groen en half mei was er een overvloed van rupsen van de eikebladspinner, waar zeer veel jonge vogels meegevoerd worden. Na 2 jaren met ongunstige broedresultaten, waren er dit voorjaar beslist minder Mezen aanwezig.

Het was een geruststelling dat in 1964 de legsels groot waren en dat alle jongen goed uitgevlogen zijn.

Het is jammer, dat er dit voorjaar geen enkel paartje Pimpelmezen in de nestkasten gebroed hebben. Ook de Vliegen-vangerkasten bleven onbezet, wel was er een paartje aanwezig bij het hertekamp. Het paartje Boomkruiper en Boomklever broedde weer in een der kastjes. De Boomklevers metselen hun kast altijd zo stevig dicht, dat we het aantal jongen niet hebben kunnen tellen, maar er werd zeer druk gevoerd. Alle Koolmezen zijn goed uitgevlogen, 2 paar Koolmezen hadden een tweede broedsel.

De broedresultaten waren:

Koolmees	: 12 broedparen,	133 eieren,	132 jongen.
Boomkruiper	; 1 "	5 "	5 "
Boomklever	: 1 "	onbekend ,	onbekend.
Tweede broedsel			
Koolmees	: 2 "	13 eieren,	11 jongen.

Gecontroleerd door:

In 1963 L. Gieske.
In 1963 en in 1964 Th. Belterman.
Mevr. G.E.C. Bloem-Margadant.

	Soort uitgevl. Jongen.		paar uitgevl. Jongen.		paar uitgevl. Jongen.		paar uitgevl. Jongen.	
	1961		1962		1963		1964	
Vliegen-vanger	1 p.	4 ei.	1	5	3	3	-	-
Boomkruiper	-	-	1	6	1	6	1	5
Boomklever	1	4	1 aantal		1 aantal		1 aantal	
Pimpelmees	4	26	2	8	4	19	-	-
Koolmees	13	93	14	± 70	13	63	13	132

In 1961 begonnen de vroegste Koolmezen met broeden op ongeveer 17 april. In 1962 op 1 mei, in 1963 op 3 mei en in 1964 op 30 april.

G.E.C. Bloem-Margadant.

Thijsse's Hof.

De Heer W. Holthuizen stuurde het rapport in over de inventarisatie van het Thijsse's Hof 1965 waaruit wij het volgende ontlenen.

Alle in de Hof hangende nestkasten werden bezet door 8 paartjes Koolmezen en 1 paar Grauwe Vliegenvanger. Twee paar Koolmezen kwamen tot een tweede broedsel. Van de eerste broedsels vlogen 55 jonge Koolmezen uit van de 63 eieren. Van het tweede broedsel kwamen 11 jongen uit. De datum van de leg van het eerste ei van de Koolmezen viel dit jaar op 13 april, hoewel de gemiddelde eerste-eidatum op 22 april viel. Dit kwam, omdat de helft van het Koolmezenbestand 'half april begon met leggen en de rest in de eerste dagen van mei.