

HEKSLOOT 1981

De Heksloot, hoe lang kunnen we dit prachtige vogelgebied vlak bij Haarlem en onder de rook van de Hoogovens nog inventariseren op broedvogels en andere aanwezige vogels? Naar ik hoop nog heel lang, maar als we het Haarlems Dagblad mogen geloven dan zouden sommigen het al willen volbouwen met woningen net zoals dat gaat gebeuren met de Velsbroekpolder.

Gelukkig heb ik, met de waarnemingen van nog enkele leden van onze vogelwerkgroep (de hr. E. Dijkstra en E.v. Huijssteeden), dit jaar weer een verslag kunnen maken, dat een goed beeld geeft van de vogelbevolking van het Hekslootgebied.


De inventarisaties vonden plaats over de gehele dag, werden lopend uitgevoerd en duurde meestal + 2 uur. Het gebied werd dit jaar 57 maal geheel geïnventariseerd en verder werden nog vele losse waarnemingen in het verslag verwerkt.

In het voorjaar (eind maart - begin april) werd het gebied nog al eens bezocht door een eierenzoeker. Hij had het niet zo op de Kauwen en Zwarte Kraaien, naar ik van hem hoorde, want daar waren er toch teveel van. Hij hield dan ook angstvallig de kievit- en grutto-legsels in de gaten.

De groentetuintjes in de hoek van van de Vondel- en Spaarndamse weg beginnen nu aardig begroeid te raken, wat misschien in de loop van de jaren nieuwe soorten met zich meebrengt.

Het weer tijdens de inventarisaties.

De maand januari gaf geen echte winter, zoals die van 1978-'79 en de temp. bleef dan ook maar rond de 6°C hangen. Van half februari tot begin maart was er een kleine vorstperiode, maar erg lage temp. werden niet geregistreerd. Eind maart begon de temp. weer op te lopen tot tegen de 15°C, met een wind die meestal uit zuidelijke richtingen kwam. Rond half april waren er een paar zonnige dagen, maar later tot half mei weer temp. rond de 10°C met vaak wind uit het noordoosten. Eind mei begon het dan toch een beetje zomers te worden en tot begin september zaten we met temp. tussen de 17-21°C met vaak wind (3-5) uit zuidwestelijke richtingen en veel bewolking (meer dan 6/8). Erg heet werd het gelukkig niet (voor mij althans, want ik houd niet van die erg hoge temp.). Meer naar het einde van het jaar werd ook de temp. weer lager en zaten we rond eind december rond de 5°C met vaak een bewolking van 8/8.



Hierna volgt een opsomming van de broedvogels met een verslag van die broedvogels over de afgelopen drie jaar dat ik dit gebied heb geïnventariseerd. Dan volgt het aantal soorten per maand en het verslag van de aanwezige soorten in 1981. Tot slot ben ik iets verder ingegaan op het aantalsverloop van drie soorten weidevogels; als je de aantallen in een statistiek verwerkt komen er toch leuke dingen uit. Als u dit verslag gelezen heeft zult u het, denk ik, met mij eens zijn dat het gebied moet blijven zoals het nu is : Weidegebied.

Broedvogels.

	1981	'80	'79		1981	'80	'79
Fuut	7	6	4	Watersnip	1	-	1?
Bergeend	1?	1	-	Tureluur	6	6	6
Wilde Eend	26	22	16	Kemphaan	1?	-	-
Wintertaling	1	-	1	Veldleeuwerik	4	4	4
Slobeend	3	9	2	Graspieper	7	6	6
Kuifeend	-	2	1	Gele Kwikst.	-	1	-
Knobbelzwaan	1	2	1	Merel	1	1	2
Waterhoen	3	4	4	Kl. Karekiet	4	5	6
Meerkoet	14	11	7	Rietzanger	1	1	2
Scholekster	2	1	2	Rietgors	3	2	2
Kievit	12	13	11	Huisemus	2	2	2
Grutto	10	8	9	Spreeuw	1	1	2

De Fuut neemt hier als broedvogel nog steeds toe. Dit jaar zelfs een succesvol broedsel langs de Spaarndamseweg op het Noorder Buiten Spaarne.

Van de Bergeend krijg ik geen hoogte. Dit jaar inspecteerde ongeveer 3 paartjes de gaten in de bunkers. Later werd 1, een hele tijd alleen gezien en toen ook nog één keer jongen, maar of die nu hiervandaan kwamen kon niet met zekerheid vastgesteld worden. Het aantal Wilde Eenden nam ook weer toe (aantal ♀♀ met pulli geteld) en gelukkig was er weer een paartje van de Wintertaling. De Slobeend zit weer op het oude peil (wat zou de reden zijn voor het hoge aantal broedparen in 1980?) en de Kuifeend werd dit jaar niet met pulli gezien. Het Knobbelzwanenpaar had maar 1 pul en ik heb nog steeds het vermoeden dat iemand, op 't ene ei na, het nest heeft leeg gehaald. De Waterhoen doet het niet erg goed meer sinds de winter van 1978-'79 in tegenstelling tot de Meerkoet die goed toeneemt en al boven het aantal van voor die winter zit. De Scholekster, Grutto, Kievit en Tureluur zijn ongeveer gelijk gebleven. Opvallend is het vrijwel zekere broedgeval van een Watersnip. Wanneer je ook maar kwam, in het gedeelte van het gebied waar hij zat, je hoorde hem altijd baltsen (min. 1-2 ex., soms zelfs 3). En dan de Kemphaan, vroeger hier een normale broedvogel; dit jaar was er regelmatig een ♀ gezien en aangezien er bij Spaarnwoude een kleine baltsplaats is, had ik het vermoeden dat zij daar vandaan kwam. Eén keer zag ik haar die kant opvliegen. Veldleeuwerik en Graspieper waren met een normaal aantal vertegenwoordigd. De Gele Kwikstaart was dat dit jaar niet, alhoewel er wel ex. gezien zijn in de broedtijd, maar een aanwijzing voor een broedgeval was er niet. Ondanks de snoeiwerkzaamheden van het gemeente-personeel was er nog 1 merelpaar aanwezig. Van de Kleine Karekiet werden minder ex. gezien en ik vraag me af hoelang de Rietzanger het hier nog uithoudt, want deze soort wordt hier steeds minder gezien. De laatste twee soorten, Spreeuw en Huisemus, broeden in het Slapergemaal bij de Slaperdijk met een voor hier normaal aantal.

Aantal soorten per maand.

jan.	47	mei	49	sept.	46
febr.	45	juni	45	okt.	52
mrt.	48	juli	45	nov.	45
apr.	59	aug.	60	dec.	40

Lijst van aanwezige soorten (totaal 101).

Fuut. Het gehele jaar aanwezig. Tot half mrt. met 1-10 ex. Van half mrt. tot half sept. met 6-14 ex., en van half sept. tot eind dec. weer met 1-10 ex. Op 12 apr. werd het eerste nest gebouwd, maar het duurde tot 16 juni voor de eerste pulli werden waargenomen.

Dodaars. Drie maal waargenomen in het gebied en wel op 18 jan., 16 okt. en 2 dec. met 1 ex.

Aalscholver. Op 16 okt. 1 ex. overvliegend naar NO.

Blauwe Reiger. Het gehele jaar aanwezig. Tot half mei met 1-6 ex. Van half mei tot begin sept. 3-19 ex. en van begin sept. tot eind dec. met 2-8 ex. Op 28 aug. en 7 nov. 1 ex. hoog overvliegend naar Z.

Lepelaar. Minder gezien dan vorige jaren. Op 20 apr., 27 mei, 14 juni en 19 juli resp. 1, 1, 2 en 1 ex. (alle adult) en op 22 en 29 aug. 1 juv.


Wilde Eend. Het gehele jaar aanwezig. Tot eind mrt. met aantallen tussen de 70-130 ex. In het broedseizoen tussen de 50-100 ex., hierna weer oplopend, vooral in sept. (aantallen rond de 250 ex.) en tot eind van het jaar met 50-175 ex. Op 13 juni werden de eerste ♂♂ in eclipskleed gezien en op 29 aug. weer de eerste die terug kleurden. Op 7 juni 26 ♀♀ met 123 pulli.

Wintertaling. Het gehele jaar aanwezig. Tot half apr. met 3-37 ex. Daarna tot begin juli met 1-2 ex. Van aug. tot half nov. een top met 9-64 ex. Eind nov. en dec. aantallen tussen de 2-50 ex.

Zomertaling. Twee waarnemingen. Op 12 apr. 1 paartje en op 20 apr. een ♂, ik heb regelmatig de slootjes waar ze werden waargenomen (meestal dezelfde, waar ze ook vorige jaren zijn gezien) goed in de gaten gehouden, hopen op een broedgeval. Maar na deze data niet meer waargenomen.

Krakeend. Deze soort wordt meer in het voor- dan in het najaar waargenomen. Op 28 mrt. zelfs 28 ex. (13♂♂, 15♀♀) fouragerend op het grasland met daartussen een kruising Krakeend x Wintertaling (zie De Fitis 17 3-4 pag. 99-100). Verder 8 waarnemingen in het voorjaar (1-6 ex.) en in 't najaar 3 waarnemingen (1-3 ex.).

Smient. Tot eind jan. met 19-67 ex. hierna een toename met begin febr. aantallen tot 850 ex. en tot eind mrt. met +300-350 ex. Dan aflopende aantallen en op 26 apr. het laatste ex. Op 4 sept. weer de eerste ex. en



tot eind okt. met 27-300 ex. Begin nov. een top met 557 ex. Later weer minder (88-257 ex.) Veel uitwisseling (bijv. door verstoring van de eierenzoeker) met de Mooie Nel en het IJ bij Spaarndam, zodat de aantallen per dag behoorlijk kunnen verschillen.

Slobeend. Geen grote aantallen van deze eendesoot gezien, vooral in het voorjaar, behalve op 14 en 28 mrt. resp. 43 en 22 ex., waarvan de aantallen meestal niet boven de 15 ex. uit. Na half aug. een toename en tot begin nov. met 17-47 ex. En van half nov. tot eind dec. maar twee waarnemingen (2 en 5 ex.) Op 20 juni 3♀ met 22 pulli.

Kuifeend. Tot eind apr. aantallen tussen de 1-7 ex., behalve op 10 jan. en 8 mrt. toen er resp. 11 en 15 ex. geteld werden. Op 12 en 16 mei resp. 22 en 32 ex., daarna tot eind dec. met 1-9 ex. Dit jaar i.t.t. vorige jaren, geen ♀ met pulli gezien.

Tafeleend. Op 14 mrt. 2 ex. aanwezig, verder nog twee waarnemingen op het N.B.S.

Brilduiker. Op 7 nov. 1♀ fouragerend.

IJseend. Op het N.B.S., vlakbij het gemaal en 't witte bruggetje, een zeer mak ♂ op 12 dec.

Grote Zaagbek. Paartje aanwezig op 4 mrt.

Bergeend. Van begin jan. tot half juli met 1-16 ex., daarna pas weer waargenomen tussen half okt. en begin dec. met 1-2 ex.

Nijlgans. Deze "exoot" wordt hier al het hele jaar waargenomen. Tot half aug. met 1-7 ex., behalve op 5 juli als er 16 ex. aanwezig zijn, hierna een toename tot half nov. In die tijd worden zelfs troepen van 35 ex. gezien. Van half nov. tot eind dec. met 2-10 ex. Op 16 mei wordt een paartje gezien dat zich agressief gedraagt tegenover een ♀ Wilde Eend met pulli (ze zitten zelfs achter de pulli aan). Ook agressief gedrag tegenover Grutto's is waargenomen.

Grauwe Gans. Op 22 mei, 16 en 17 okt. en 7 nov. resp. 2, 1, 1 en 1 ex. aanwezig en op 26 jan. en 28 okt. resp. 16 naar N. en 9 naar ZO.

Kleine Rietgans. Op 16 dec. 5 ex. aanwezig.

Gans, spec. Op 31 dec. werden tussen de bunkergracht en het voetpad zeer veel ganzenkeutels gevonden, waarschijnlijk heeft zich hier voor voor korte tijd een groep ganzen opgehouden.

Knobbelzwaan. Het gehele jaar aanwezig. Tot half apr. met 2-12 ex. Op 3 apr. had het enige broedpaar het nest bezet. In de maand mei 21-55 ex. en vanaf juni tot half sept. 2-14 ex., hierna weer oplopende aantallen tot eind dec. met 8-22 ex.

Kleine Zwaan. Op 28 okt. en 14 nov. 1 ex. tussen de Knobbelzwanen.

Buizerd. Op 22 aug. 1 ex. overvliegend naar O.

Sperwer. Vier waarnemingen. Op 26 jan. 1 ex., op 3 apr. 1 ex. naar N., op 14 nov. 1 ex. en op 22 nov. 1 ex. jagend op Spreeuwen (bolvorm).

Bruine Kiekendief. Op 22 aug. 1 ex. (♀ kl.) en op 19 sept. 1 ex. (♀ kleed) eerst fouragerend en later op thermiek naar Z.

Blauwe Kiekendief. Op 14 nov. 1 ex. (♀ kl.) naar ZW.

Visarend. Je staat wel heel raar te kijken als je boven je inventarisatiegebied een Visarend ziet bidden. Later verdween het ex. op thermiek naar Z. (19 sept. $\pm$ 13.00 uur).

Boomvalk. Vier waarnemingen van 1 ex., drie in aug. en 1 in sept.

Torenvalk. Het gehele jaar aanwezig met 1-2 ex. Op 31 dec. zag ik een ♀ met een prooi, welke later een Spreeuw bleek te zijn.

Patrijs. Van begin jan. tot eind mrt. 7 waarnemingen (2-14 ex.) en in sept. en okt. 3 waarnemingen (1-5 ex.). Op 1 febr. baltsende ex.

Waterhoen. Het blijven toch maar magere aantallen die hier gezien worden (1-10 ex.), alleen op 1 febr. en 15 febr. aantallen boven de 10 ex., resp. 15 en 13 ex. Op 28 mrt. 1 ad. verkeersslachtoffer en op 25 apr. de eerste nestbouw gezien.

Meerkoet. Het gehele jaar aanwezig. Tot eind mrt. aantallen tussen 157-787 ex. Hierna flink dalend en van begin apr. tot half juli is de broedpopulatie aanwezig. Vanaf half juli weer oplopende aantallen met 42-411 ex. en op 31 dec. een top met 653 ex. Veel uitwisseling met de Mooie Nel. Op 3 apr. het eerste nest bezet en op 29 aug. weer de eerste troepvorming.

Scholekster. Aantallen zie aantalsverloop verderop in dit verslag. Op 24 juni de eerste pulli pas gezien en op 11 aug. werd nog een volgroeid jong gevoerd.

Trek: op 29 aug. 22 ex. hoog overvliegend naar Z.

Kievit. Aantallen zie aantalsverloop verderop in dit verslag. Op 12 mei de eerste pulli gezien en op 16 mei de eerste troepvorming. Trek: op 20 juni en 5 juli resp. 26³ en 99¹⁰ naar ZW.

Goudplevier. Normaal worden hier geen grote aantallen waargenomen, maar begin febr. stond ik toch even raar te kijken. Op 1 febr. 519 ex. en op 7 febr. zelfs 1214 ex. Tot 29 apr. wordt de soort gezien met 1-215 ex. Op 4 aug. weer de eerste ex. en tot 7 nov. weer normale aantallen voor de Hekslot (6-84 ex.). Trek: op 8 aug. en 22 aug. resp. 10¹ en 13² naar Z.

Bontbekplevier. Op 1 febr. en 4 apr. resp. 1 en 2 ex.

Steenloper. Vier waarnemingen uit jan. met 5-13 ex., op 7 febr. 26 ex. en op 8 mrt. 1 ex.

Watersnip. Het gehele jaar aanwezig. Tot half apr. met 2-7 ex. met een top op 4 apr. met 19 ex. Na begin aug. beginnen de aantallen weer op te lopen en tot half dec. met 2-64 ex. Op 16 okt. een uitschieter met 204 ex.

Wulp. Van half febr. tot begin apr. 5 waarnemingen met 1-5 ex. en vanaf half aug. tot half nov. 7 waarnemingen met 1-4 ex. Trek: op 19 sept. en 16 okt. 1 ex. naar Z.

Regenwulp. Deze kleinere neef van de Wulp werd op 2 en 22 aug. met 1 ex. 1 ex. gehoord en gezien.

Grutto. Aantallen zie aantalsverloop verderop in dit verslag. Op 25 apr. de eerste pulli, op 27 mei de eerste troepvorming en op 13 juni werd een ex. gezien met gedeeltelijke albinisme.

Rosse Grutto. Op 29 apr. 19² overvliegend naar N.

Witgatje. Op 26 apr. 1 ex. en in aug. 3 waarnemingen van 1 ex.

Bosruiter. Op 2 aug. 1 ex. gehoord en gezien.

Oeverloper. Op 9 mei en 8 aug. resp. 2 en 1 ex.

Tureluur. Op 10 jan. 2 ex. Pas vanaf half mrt. wordt de soort weer bij elke inventarisatie waargenomen. Op 28 mrt. een top met 34 ex. Het laatste ex. werd gezien op 28 okt. Op 27 mei werden de eerste pulli waargenomen. Trek: op 25 apr. 15 naar N. en op 5 juli en 2 aug. resp. 8² en 2 naar Z.

Zwarte Ruiter. Alleen maar waargenomen in het najaar van eind juni tot half okt. met 1-5 ex. Vaak nog aankomend in het zomerkleed en later in het overgangskleed.

Groenpootruiter. Op 26 apr. 1 ex. en verder vier waarnemingen in aug. met 1 ex. waarvan op 8 en 29 aug. 1 ex. naar Z.

Bonte Strandloper. Van begin jan. tot half febr. vier waarnemingen met 1-14 ex. Van half okt. tot half nov. zes waarnemingen met 1-46 ex.

Kemphaan. Vooral in jan. werd de soort in grote aantallen gezien. met 28-74 ex. Vanaf begin febr. tot half okt. regelmatig één of enkele ex. Trek: op 25 apr. 17³ naar N.

Kluut. Aanwezig van half mrt. tot eind mei met 1-4 ex.

Grote Mantelmeeuw. Van begin jan. tot half apr. met 1-2 ex. Eind juli weer de eerste en tot eind dec. met 1-7 ex. Op 14 nov. en 2 dec. een uitschieter met resp. 37 en 41 ex.

Kleine Mantelmeeuw. Van eind apr. tot half okt. met 1-5 ex., op 28 okt. en 2 dec. echter resp. 11 en 28 ex.

Zilvermeeuw. Het gehele jaar aanwezig. Van begin jan. tot eind okt. met 1-26 ex., hierna oplopend en tot eind dec. met 28-120 ex.

Stormmeeuw. Ook het gehele jaar hier te zien. Van begin jan. tot half sept. met 1-28 ex., daarna oplopend tot aantallen tussen 8-52 ex. Op 2 dec. nog een uitschieter met 96 ex. Op 18 jan. 1 ex. met oliesporen.

Kokmeeuw. Van begin jan. tot eind mrt. met 104-620 ex. en vanaf begin apr. tot half juli steeds rond de 50 ex. Hierna weer oplopende aantallen en tot eind dec. met 74-650 ex. Op 20 juni de eerste juv. van dit jaar en op 28 juli het eerste ex. in overgangskleed.

Visdief. Van half apr. tot half aug. met 1-4 ex. fouragerend.

Holenduif. Het gehele jaar aanwezig. Van begin jan. tot eind apr. met aantallen van 36-188 ex. en vanaf begin mei tot eind dec. blijven de aantallen lager (tussen 2-46 ex.).

Turkse Tortel. Deze soort wordt het hele jaar overvliegend waargenomen met 1-4 ex. Op 29 aug. echter 8 ex.

Koekoek. Drie waarnemingen. Op 22 mei 2 ex. overvliegend, op 5 juli 1 ex. die achtervolgd werd door 2 Kleine Karekieten en op 4 aug. nog 1 ex.



kokmeeuw

Gierzwaluw. Op 9 mei werden de eerste 2 ex. gezien, hierna tot eind juli met 4-24 ex. en op 4 aug. nog 1 ex. naar ZW. Vaak fouragerend laag over de weilanden en slootjes scherend.

Grote Bonte Specht. Op 5 juli 1 ex. in de bomen bij 't gemaaltje. Veldleeuwerik. Het gehele jaar aanwezig met 1-12 ex. In de trektijd meer ex. aanwezig en van half okt. tot begin nov. met 19-36 ex. Trek: op 16 en 17 okt. resp. 41⁺ en 13⁻ naar Z.

Boerenzwaluw. De eerste ex. werden al op 29 mrt. gezien en wel 2 ex. naar NO. Vanaf half apr. echter pas regelmatig gezien met 1-8 ex. tot half sept. Trek: 29 aug., 4 en 19 sept. resp. 9³, 3¹ en 3¹ naar Z.

Huiszwaluw. Op 12 apr. de eerste ex., maar op 12 mei pas de tweede waarneming. Tot eind aug. met 3-15 ex. en op 13 aug. een uitschieter met 24 ex.

Oeverzwaluw. Drie waarnemingen op 12 apr. 9 ex. en op 5 en 8 aug. 2 ex.

Graspieper. Het gehele jaar aanwezig, van begin jan. tot half febr. 10-36 ex. en tot eind dec. 1-18 ex. Op 16 okt. een uitschieter met 31 ex. Trek: op 10 apr. 82⁹ naar N. (+1/2 uur).

Witte Kwikstaart. Van half apr. tot eind mei 1-6 ex. en in okt. nog twee waarnemingen (1 en 2 ex.). Op 14 en 28 mrt. werd een Rouwkwikstaart gezien. Op 29 mrt. was een gemengde trekkende troep aan het fourageren, deze bestond uit: 5 Witte + 8 Gele Kwikstaarten en 12 Graspiepers. Later vloog de troep door naar N.

Gele Kwikstaart. Van eind mrt. tot half sept. met 1-5 ex., behalve 29 mrt. (zie Witte Kwik). Trek: op 25 en 26 apr. resp. 5² en 5⁴ naar N. en op 29 aug. en 19 sept. resp. 1 en 2¹ naar Z.

Winterkoninkje. Op 26 jan. zat een ex. te ratelen tussen het riet.

Grote Lijster. Op 16 mei 1 ex. langs de Nieuwe rijweg.

Kramsvogel. Tot eind apr. met 1-8 ex., behalve op 1 febr. toen er 34 ex. aanwezig waren. De eerste ex. werden weer gezien op 16 okt. en tot eind dec. met aantallen tussen de 5-112 ex. meestal samen fouragerend met Koperwieken.

Zanglijster. Drie maal 1 ex. op 15 febr., 3 apr. en 17 okt.

Koperwiek. Weinig gezien in de eerste maanden (4x), aantallen tussen de 1-4 ex. Op 4 apr. een troep van 23 ex. zingend in een populier. Op 17 okt. weer de eerste ex. waargenomen en tot eind dec. met 8-173 ex. Trek: op 7 nov. 23⁵ naar N.

Beflijster. Op 25 apr. 1⁸, eerst fouragerend, later naar N.

Merel. Het gehele jaar gezien met 1-4 ex. Op 13 juni paartje met voer.

Tapuit. Op 26 apr. en 16 mei resp. 1 en 2 ex. en op 2 aug. en 4 sept. resp. 1 en 3 ex.

Paapje. Op 26 apr. en 19 sept. met resp. 1 en 2 ex.

Grote Karekiet. Deze ongewone soort voor de Heksloot werd op 13 en 20 juni zingend aangetroffen.

Kleine Karekiet. Op 12 mei het eerste ex. en tot 19 sept. met 1-9 ex.

Bosrietzanger. Op 13 juni 1 ex. zingend, hierna niet meer gehoord. Hetzelfde gebeurde in 1980 toen op 14 juni 2 ex. zingend werden aangetroffen. Waarschijnlijk dus doortrekkende ex.

Rietzanger. Maar vier waarnemingen dit jaar. Van 31 mei tot 5 aug. met 2-4 ex.

Fitis. Op 29 aug. 1 ex. aanwezig.

Koolmees. Onregelmatige gast, het gehele jaar aanwezig met 1-4 ex. Op 22 mei een nest met jongen in een metalen paal op de ijsbaan Nova-Zembla.

Pimpelmees. In jan. en febr. bij elkaar maar drie waarnemingen met 1-2 ex. en pas weer vanaf begin aug. tot half dec. met 1-5 ex.

Rietgors. Waargenomen van 14 mrt. t/m 16 okt. met 1-5 ex.

Ijsgors. Op 10 apr. 1[♂] tussen trekkende Graspiepers, later naar N.

Groenling. Drie waarnemingen: op 26 jan., 14 mrt. en 7 juni 1 ex.

Putter. Ook dit is een onregelmatige gast met 1-4 ex., echter twee waarnemingen in dec. met resp. 9 en 11 ex. Vaak fouragerend op de distels langs het voetpad.

Sijs. Op 12 dec. 1 ex. roepend overvliegend.

Kneu. Van half apr. tot half okt. met 1-3 ex. Op 17 sept. een uitschieter met 7 ex.

Vink. Alleen overtrekkend waargenomen: op 16 en 17 okt. en op 7 nov. met resp. 5 naar Z, 1 naar Z. en 2 naar N.

Huismus. Het gehele jaar aanwezig met wisselende aantallen, meestal niet meer dan 10 ex. en dan nog meestal overvliegend of anders in de struiken langs de Spaarndamseweg of bij 't gemaaltje. Zes waarnemingen met grotere aantallen waarvan op 5 aug. een uitschieter met 32 ex.

Ringmus. Op 17 sept. 4 ex.

Spreeuw. Gehele jaar aanwezig met steeds rond de 100 ex., maar in dec. tot +350 ex. Op 22 mei de eerste juv. van dit jaar.

Zwarte Kraai. Deze soort is 't gehele jaar aanwezig met 1-7 ex. Op 5 aug. en 17 sept. echter met resp. 31 en 22 ex.

Bonte Kraai. Vanaf begin jan. tot 14 mrt. met 1-5 ex. De eerste ex. weer op 14 nov. en daarna nog maar twee waarnemingen. Deze soort wordt over het algemeen toch wel steeds minder gezien.

Roek. Op 7 nov. 1 ex. overvliegend naar ZW.

Kauw. Gehele jaar aanwezig met wisselend aantal (3-98 ex.). Op 31 dec. 559 ex. aanwezig.

Ekster. Tot half apr. met 1-5 ex. Pas begin juli werden weer ex. genoteerd en tot eind dec. weer met 1-5 ex.


Aantalsverloop van Grutto, Scholekster en Kievit.

Grutto (fig. 1)

Begin maart komen de eerste ex. aan en het aantal loopt daarna snel op, eind maart valt al de top (waarschijnlijk veel doortrek). Vanaf half april tot zowat eind mei is de broedpopulatie aanwezig. Hierna loopt het aantal snel op, vooral vanwege de groepsvorming. Dit jaar

viel op 27 juni de top (87 ex.). De aantallen nemen dan weer snel af en voor half juli zijn ze, op een mank ex. na, weer allemaal uit het broedgebied vertrokken.


Fig.1 aantalsverloop van Grutto



Scholekster (fig. 2).

Gelijk met de eerste Grutto's komen meestal ook de eerste grotere groepen Scholeksters binnenzetten; hiervoor kan nog wel eens een ex. aanwezig zijn. De Heksloot lijkt mij een gebied waar eerst de grotere groepen Scholeksters komen en vanwaar ze zich later over het gebied verspreiden. Begin april nemen de aantallen af en blijven er altijd nog zo'n 20 ex. rondhangen (en toch maar twee broedparen dit jaar!). Half juni neemt het aantal weer toe, maar na half augustus zijn de meeste ex. verdwenen. In september geen waarnemingen, maar van half oktober tot eind december 1 ex. aanwezig.


Fig.2 aantalsverloop van Scholekster



Kievit (fig.3)

Tot half februari is de winterpopulatie, van +300 ex. aanwezig. Begin maart, vanwege de vorst, zowat geen ex. aanwezig. Tot half juni is de broedpopulatie aanwezig, hierna komt er groepsvorming en is de ruitrek op gang gekomen. In augustus blijft het aantal rond de 350 ex. hangen en pas eind oktober een toename met begin november een top (7 nov. 744 ex.). Eind dec. zijn er geen ex. meer aanwezig.

Fig.3 aantalsverloop van Kievit



Fred Cottaar
Iepenstraat 10
2023 SV Haarlem.

