

## Inventarisatie Heksloot 1965.

Ook dit jaar is het fraaie, 140 h.a. weidegebied met sloten en fortgracht, zo uniek gelegen onder de rook van Haarlem, weer geïnventariseerd op broedvogels en aanwezige vogels.

Hoe lang zullen we dit onvervangbare gebied nog kunnen inventariseren voor het een watersportcentrum is geworden? Helaas schijnen de pogingen tot behoud van dit gebied geen gehoor te vinden bij de bevoegde instanties. Maar wordt daar van natuur- en vogelbescherming wel voldoende moeite voor gedaan? Het is daarom zo jammer, daar het aantal vogelsoorten ieder jaar groter wordt.

Het was weer heerlijk waarnemen hier, waarbij de 10 bestede uren onvergetelijke uren waren.

De aantallen vogelsoorten over de laatste 3 jaren zijn:

1963: 46, 1964: 46, 1965: 53.

De broedgevallen van de meeste vogels moest geschat worden, daar wij niet op de terreinen zelf mochten.

	1963	1964	1965		1963	1964	1965
Wilde eend	10	8	8	Grutto	12	3	6
Slobeend	2	2	1	Tureluur	3	1	2
Knobbelzwaan	1	1	1	Kemphaan	4	2	-
Waterhoen	1	1	2	Graspieper	2	1	1
Meerkoet	2	3	5	Gele kwikst.	3	1	-
Scholekster	2	2	2	Rietgors	1	1	1
Huismus	3	3	2	Kievit	15	4	5

Blauwe reiger: Vrijwel het gehele jaar aanwezig. Vanaf april tot midden augustus een tiental exemplaren. In de herfst en wintermaanden enkele of 1 reiger aanwezig. 's Avonds, in schemerlicht, is het een leuk gezicht om deze vogels op de wieken te zien gaan in zuidelijke richting. (A.W. duinen?)

Wilde eend: Vrijwel het gehele jaar aanwezig. Op 8 mei de eerste jongen waargenomen. Gezien het aantal jongen en de spreiding er van een achttal broedvogels geschat. In februari werden 13 ♂♂ en 10 ♀♀ als gemiddelden genoteerd. Het kleinste aantal eenden zien wij in oktober: 4 ♂♂ en 4 ♀♀ als gemiddelde.

Wintertaling: Vanaf maart aanwezig, toen in troepverband; 40 ex. op 21 maart. Daarna 1 paartje (april); in mei 2 ♂♂ wintertalingen. Pas op 28 aug. wederom 4 ex. overvliegend. Vanaf 23 okt, t/m 27 nov. een troep

max. 53 ex. op 6 nov.

Zomertaling: Alleen op 4 april gezien en wel 4 ♂♂ en 2 ♀♀.

Smient: In het voorjaar vanaf 28 feb. (200 ex.) tot 4 apr. (15 ex.)

Op 21 nov. tijdens sneeuw en vorst 15 ex. en 11 dec. 12 ex.

Slobeend: Vanaf 21 maart 1 paar. Eerste helft apr. tot 6 paar; later kennelijk verspreid. De waarnemingen in mei en juni wijzen op hoogstens 2 paar. Op 29 mei 1 paar met 2 jongen gezien. In de herfst in klein aantak aanwezig. Laatste datum 20 nov. 2 ♂♂ en 1 ♀.

Kuifeend: Tien waarnemingen, waarvan 8 tussen 13 maart en 5 juni en 2 in de laatste helft van dec.

Tafeleend: 1 waarneming op 4 april van 4 ex.

Bergeend: Twee waarnemingen op 4 en 19 apr. respt. van 3 en 2 ex.

Knobbelzwaan: Regelmatig gezien. Eerste broedpoging op 3 apr. De nesten rondom Spaardam zijn tussen 30 apr. en 5 mei, evenals in 1964, verstoord. Uit het tweede broedsel op 3 juli zijn 6 jongen geboren, waarvan 1 jong op 28 aug. is gestorven. Op 26 sept. zijn 5 zwanen door voedsel vergiftiging ziek geworden. Het Vogelrampenfonds heeft zich over de lijdende vogels ontfermd. Eén zwaan was direct dood. Hierna nog maar op 9 okt. 1 en op 16 okt. 2 juv. zwanen waargenomen, dus zijn waarschijnlijk 3 jonge vogels gestorven.

In de directe omgeving nog 2 broedsels (tweede), waaruit 2 en 4 jong. geboren zijn.

Kleine zwaan: Op 27 nov. en 4 dec. 1 juv. gezien. Dit komt niet ieder jaar voor, maar een zeldzaamheid is het ook weer niet. Op 18 nov. 1961 in deze omgeving in de "Blaak" tussen Buitenhuizen en Westzaan 6 Kl. zwanen (4 ad. en 2 juv.) waargenomen.

Visarend: Zaterdag 25 sept. 1965. Met mooi en warm weer een fijne waarneming gedaan. Boven het gebied was de Visarend aanwezig. Dit was mijn eerste treffen van deze grote vogel aan de Heksloot. Omring door wel 50 Kauwen, die de arend kennelijk wilde verjagen, bleef hij rustig staan bidden, om dan met grote snelheid het water in te duiken, zodat het water hoog opspratte. Even later ging hij op het damhek zitten, met links en recht weer de Kauwen. Nadat de vogel van 2 uur tot half 4 werd waargenomen, vertrok hij naar de Velserbrockpolder. Om kwart over 4 was hij weer terug en begon het "spel" met de Kauwen opnieuw.

Patrijs: 3 waarnemingen, 19 apr. 2 ex; 25 sept. 3 ex; 19 dec. 5 ex.

Fazant: Eenmaal waargenomen en wel op 28 feb. van één mannetje.

Waterhoen: Vanaf apr. vrijwel altijd waargenomen. Tot aug. slechts 1, 2 of 3 ex. Na het broedseizoen 4-8 ex. Broedvogel in klein aantal, geschat op 2 paar.

Meerkoet: Bijna het gehele jaar waargenomen. Eerste nest op 19 apr. In apr., mei 3 nesten; in juni 1 nest. Hoogste aantal getelde jongen 20 op 26 juni. Geschat aantal broedparen: 5. Aantal in febr. 40-70, in maart 60, in dec. 50-103.

Scholekster: De eerste vogels op 8 maart, sinds sept. 1964. Eerste jongen gezien op 5 mei, 3 stuks. Op 5 juni nog eens 4 jongen. Wisselend aantal in het vroege voorjaar, op 7 en 13 maart 2 resp. 63 ex. Begin apr. tot 43 ex., daarna min of meer constant een 20-tal vogels tot midden juli. Zeker 2 broedpaar. In begin aug. een toename tot 41 ex. op 7 aug., daarna snelle daling van het aantal. Laatste op 25 aug. van 5 ex.

Kievit: De eerste aanwezig op 28 feb., sinds 23 dec. 1964, n.l. 5 ex. Op 7 maart met lichte vorst geen Kieviten meer. Wederom op 13 maart (14°C.) 28 ex., waarvan 12 baltsend. Een 20-tal steeds aanwezig tot midden mei. Aantal broedparen geschat op 5. 3 stel jongen tegelijk waargenomen op 19 juni. Het eerste nest op 30 apr., de eerste jongen op 16 mei gezien. Vanaf 29 mei toegenomen aantal 34-38 ex. Op 26 juni daalde een troep van 400 Kieviten bij de oude forten. In juli max. tot 75 ex., in aug. en sept. tot 267 ex., in okt. tot 323 ex. aanwezig. Op 13 nov. nog 154 kieviten; na de vorsttrek van 14 t/m 17 nov. op 20 en 21 nov. slechts 1 Kievit te zien. Pas op 11 dec. weer 60 en op 19 dec. 120 stuks. Terugtrek?

Goudplevier: Op 17 nov. ong. 40 ex., 20 nov. (alles dichtgevroren) 1 exemplaar.

Watersnip: Twee perioden: Vanaf eind feb. tot midden apr. en van 6 nov. tot 4 dec. Meestal gering in aantal; echter op 4 apr. 16 ex. en 6 nov. 30 ex.

Wulp: In klein aantal, maar vaker dan in voorgaande jaren waargenomen. In apr., sept., okt., nov. 1 keer 1 wulp. In maart de eerste 4 ex. op 13 maart. In aug. 5 en 3 ex., waaronder 1 juveniel.

Grutto: Eerste waarneming na 30 aug. 1964 viel op 28 febr. 14 ex., daarna geregeld een 20 tal Grutto's tot eind mei. Hoogste aantal 24 (28 mrt. en 11 apr.) Aantal broedparen naar schatting 6. De eerste jongen gezien op 15 mei. In juni neemt het aantal toe tot 32 (5 juni) daarna weer als eerder in mei tot midden juli. 10 juli nog 25. 7 aug. geen enkele. Toch weer lichte aanvoer; 15, 22, en 28 aug. resp. 8, 1 en 7 Grutto's.

Tureluur: Geregeld aanwezig van 13 mrt. t/m 23 okt. Op 21 nov. (vorst) weer 1 ex. Aantal wisselend, gemiddeld een tiental. Hoogste aantal 18 op 18 sept. Aantal broedsels geschat op 2 (jongen gezien)

Zwarte Ruiter: Waargenomen.

Kemphaan: Eerste waarneming 3 apr. 1 ♂ (in 196 op 28 maart)

4 apr. 2 ♂, zeer donker, 1 o licht ex. met rosse poten. 5 hennen 11 apr. 3 donkere ♂♂ en 2 ♀♀. 19 apr. 5 ♂♂, 15 ♀♀. Een leuk gezicht hoe een groepje van 11 hennen vanaf de Mooie Nel over het Spaarne zich op de stoeiplaats voegde bij een haan met gele kraag, die reeds twee hennen bij zich had. Verder gezien: 1 haan met witte kraag, met hen, 1 haan met gele kraag met hen en 1 haan met witte kraag.

30 apr: 5 hanen (1 licht, 2 zwarte en 2 bruine kragen), 10 hennen, waarvan 8 in een troep.

5 mei : 4 hanen (1 l. bruine, 3 bruine kragen) vrouwtjes als 30 apr.

8 mei : 3 hanen (1 zeer donkere, 1 witte en 1 bruine kraag) 7 hennen.

15 mei: 3 hanen (1 witte, 1 zwarte en 1 bruine kraag) 5 hennen.

16 mei: als op 15 mei. Ik geloof niet, dat het dit jaar tot broeden is gekomen, heb althans niets daaromtrent waargenomen.

Kl. Mantelmeeuw: Waargenomen.

Zilvermeeuw: Weinig waargenomen, alleen van okt. tot in dec. 9, 16, en 23 okt. resp. 3 en 4 juv., 6 nov. 5 juv. en 11 en 31 dec. resp. 3 juv. en 1 ad. en 6 juv. ex.

Stormmeeuw: Deze meeuw komt in veel kleiner aantal voor dan de Kokmeeuw. Een behoorlijke dag was 16 okt. met 35 ad. en 27 juv. ex. In het algemeen vertoeven hier meer jonge dan volwassen Stormmeeuwen.

januari: 2-29 ex. mei: 1-4 ex. september: 7 ad., 9 juv.

februari: 2-12 " juni: 6-7 ex. oktober: 54 ad., 53 juv.

maart: 3-10 " juli: 3 j. ex. november: 17 ad., 45 juv.

april: 1-3 " augustus: 13 j. ex. december: 14 ad., 26 juv.

Kokmeeuw: Op een enkele dag na altijd aanwezig met aantallen, wisselend tussen 1 en 268 ex. Op 2 januari een meeuw drijfnat, kon niet meer vliegen. Na gereinigd te zijn van olie, begon de vogel veel te drinken en klaarde zienderogen op. Na een week gevangenschap koos hij welgemoed het luchtruim. Grote concentraties meeuwen op: 6 en 8 febr. resp. 240 en 118 ex., 10 juli 116 ex., 28 aug. 230 ex., 25 sept. 198 ex., 16 en 23 okt. resp. 193 en 200 ex., 6 en 13 nov. resp. 128 en 181 ex. en op 4, 11, 19, 31 dec. resp. 255, 232, 215, en 268 ex.

Visdiefje: Tussen 16 mei en 15 aug. 7 keer gezien. (1 of 2 ex.)

Holenduif: 3 maal waargenomen: 4 apr. 3 ex., 13 juni en 16 okt. 1 ex.

Houtduif: Altijd aanwezig, behalve op 14 maart, 4 en 30 apr. en 16 mei. Aantallen varieerde van 3 tot 206 ex. Grote aantallen waargenomen op: 2 jan. 86, 6 en 20 febr. resp. 165 en 150, 13 mrt. 100, 3 en 4 juli resp. 111 en 108, 13 nov. 206 en 4 dec. 83 ex.

Gierzwaluw: Vanaf 5 mei tot 10 juli steeds 2-12 stuks; 7 aug. nog 2 ex.

Veldleeuwerik: Geregeld aanwezig in enkele ex. vanaf 28 febr. tot 19 dec. Ein okt. in iets groter aantal 8 ex.

Boerenzwaluw: Vanaf eind apr. tot begin okt. geregeld gezien in klein aantal. 4 stuks in de broedtijd, in aug. 8 ex. In de nabije Velsbroek polder broedvogel. Aldaar op 28 aug. troep van 50 ex. gezien.

Huiszwaluw: Tussen 11 apr. en 10 juli 7 waarnemingen. Klein aantal maximaal 6 ex. op 15 mei en 4 juli.

Oeverzwaluw: 3 waarnemingen, 23 en 20 mei resp. 6 en 2 ex. Op 25 sept. 3 ex.

Zwarte Kraai: Het gehele jaar aanwezig in klein aantal, hoogstens 10.

Bonte Kraai: De 2 periodes, dat deze hier aanwezig was, zijn: 2 jan. tot en met 14 maart en 6 nov. tot en met 31 dec. Het grootste aantal werd op 6 feb. gezien en wel 6 ex.

Kauw: De aantallen van het gehele jaar aanwezige Kauwen lopen uiteen. De grootste aantallen zijn van febr.- maart 50 ex., apr.- aug. 38 ex. aug.- sept. 88 ex., in dec. een 30 tal.

Ekster: 1 waarneming.

Pimpelmees: Op 6 en 20 nov. 1 ex. in de rietkragen in de fortgracht.

Kramsvogel: Van jan. tot 21 maart gewoonlijk 10-20 ex., maximaal 26 ex. (21 mrt.) Vanaf 23 okt. weer aanwezig. In dec. grotere troepen max. 78 ex. (11 dec.)

Koperwiek: Op 2 jan. 2 ex., 7 maart 21 ex., daarna vanaf 6 nov. enkele ex. In dec. (vergelijk Kramsvogel) daarentegen tot 140 ex. op 4 dec.

Kleine Karekiet: Alleen in juli en aug. gezien, op 4 en 10 juli resp. 2 en 1 ex. en op 15 aug. 1 ex.

Rietzanger: 1 waarneming op 25 sept. van 1 ex.

Graspieper: Vanaf 23 jan. tot 4 dec. steeds aanwezig in enkele ex. In de broedtijd een 5 tal Graspiepers.

Gelek-wikstaart: 2 waarnemingen en wel op 4 en 30 apr. van 1 ex. Deze achteruitgang is zeer jammer. In 1963 gem. 2-7 ex- met 3 broedsels en in 1964 gem. 2-4 ex- met 1 broedsel.

Spreeuw: Bijna het gehele jaar aanwezig. Niet gezien op 14 maart, 4 april en 15 mei. Grote aantallen waargenomen op 2 jan. 71 ex., 6 febr. 78 ex., 13 maart 81 ex., 25 sept. 98 ex., 16 en 23 okt. resp. 94 en 193 ex., 6 nov. 122 ex. en 31 dec. 64 ex.

Het aantal Spreeuwen met jongen: 16, 23 en 29 mei resp. 33 ad. en 10 juv., 28 ad. en 5 en 6 juv.; 5, 13, 19 en 26 juni resp. 27 ad. en 8 juv. 25 ad. en 12 juv., 18 ad. en 6 juv. en 27 ad. en 3 juv. Op 3, 4, en 10 juli resp. 24 ad. en 7 juv., 30 ad. en 12 juv. en 39 ad. en 17 juv.

Rietgors: 14 waarnemingen van 21 maart tot 4 juli. Meestal 2 mannetjes en 1 vrouwtje. Op 5 juni 1 jong gezien. Broedsel 1 paar.

Huismus: Vanaf 28 febr. altijd aanwezig. Geschat 1 broedpaar.