

Inventarisatie H E K S L O O T 1966.

Evenals voorgaande jaren is het weidegebied met sloten en de Fortgracht weer geïnteriseerd op aanwezige- en broedvogels door de Vogelwerkgroep Haarlem. Met medewerking van ons lid Guido Nijland is 71 maal een bezoek gebracht aan dit fraaie weidegebied.

Wij kunnen spreken van een goed jaar, daar meer soorten zijn gezien en meer broedvogels zijn waargenomen dan in de laatste jaren. Helaas moest gekonstateerd worden, dat de achteruitgang van de Gele Kwikstaart zich in 1966 heeft voortgezet en dat er dit jaar veel minder Blauwe Reigers aanwezig waren dan in voorgaande jaren. Dit kan zijn oorzaak hebben in de verstoring van de broedgelegenheid te Velsen.

Hieronder volgt een overzicht van de broedvogels:

	<u>1963</u>	<u>1964</u>	<u>1965</u>	<u>1966</u>
Wilde eend	10	8	8	12
Wintertaling	-	-	-	1
Slobeend	2	2	1	2
Kuifeend	-	-	-	2
Knobbelzwaan	1	1	1	2
Waterhoen	1	1	2	3
Meerkoet	2	3	5	8
Scholekster	2	2	2	2
Kievit	15	4	5	6
Grutto	12	3	6	6
Tureluur	3	1	2	2
Kemphaan	4	2	-	2
Veldleeuwerik	-	-	-	3
Rietzanger	-	-	-	3
Graspieper	2	1	1	3
Gele Kwikstaart	3	1	-	-
Rietgors	1	1	1	3
Huismus	3	3	2	3

- Dodaars: 2 maal waargenomen en wel op 10 en 17 nov., beide keren 3 exx.
- Blauwe Reiger: Het gehele jaar aanwezig met aantallen, variërend van 1-7 exx. 12 juni een troep van 6 exx., waaronder 1 juv.
- Lepelaar: Alleen op 8 en 9 mei 1 ex. op de stoeplaats van de Kemphanen.
- Wilde eend: Altijd aanwezig. Eerste jongen op 22 april, 10 stuks. Hierna geregeld jongen gezien met topdagen als 5 en 12 juni 4^{oo} met 36 en 26 juni 12^{oo} met 58 jongen. 10 juli 5^{oo} met 33, w.o. 1^o met 12 pulli en 17 juli 6^{oo} met 36.
- Wintertaling: Het gehele jaar gezien, behalve in juli niet. Grote aantallen op 8 jan., 40 exx., 5 nov. 13 exx. en 23 nov. 20 exx. De eerste jongen gezien op 21 mei, 2 pulli.
- Zomertaling: 7 waarnemingen, in april, mei en juni, meestal 1^o + 1^o, alleen op 1 juli 1^o.
- Smient: 4 maal in maart en april, 4 maal in nov. en dec. Op 10 mrt. 6 + 1^o. 19 maart 1966 + 10^{oo} ++, 3 nov. 50 exx., 5 nov. 117 exx., meestal boven het terrein. Op 23 en 25 dec. 50 exx.
- Tafeleend: Alleen in maart aanwezig, 6 mrt. 8 exx. en 12 maart 1^o + 1^o.
- Slobeend: Aanwezig van maart tot en met juni en van oktober tot en met december. Eerste nest op 30 apr. gezien. Op 21 mei 1^o met 3 jongen en op 5 juni 2^{oo} ++ met 7 juv. Grote aantallen vogels op 2 apr. 1066 + 6^{oo} ++, 21 okt. 35 exx., 27 okt. 50 exx., 3 nov. 30 exx. en 10 dec. 10 exx.

- Kuifeend:** Alleen in aug. en okt. niet gezien, meestal aanwezig met 2-10 exx. Op 2 feb. 50 exx., 5 juni 8 $\overset{\circ}{\circ}$ + 6 $\overset{\circ}{\circ}$ ++, 31 dec. 6 $\overset{\circ}{\circ}$ + 8 ++. Op 26 juni 2 $\overset{\circ}{\circ}$ ++ met 4 juv. en op 1 juli 1 $\overset{\circ}{\circ}$ + met 2 juv.
- Grote Zaagbek:** Op 29 jan. 4 exx. overvliegend naar zuidoost.
- Nonnetje:** Op 2 april 1 paartje.
- Bergeend:** Aanwezig op 22 apr. en de gehele maand juni. Totaal 6 waarnemingen van telkens 1 $\overset{\circ}{\circ}$ + en 1 $\overset{\circ}{\circ}$.
- Gr. Gans:** 1 ex. op 2 feb.
- Brandgans:** Op 29 jan. en 2 feb. 1 ex. tussen een grote troep meerkoeten.
- Knobbelzwaan:** Het gehele jaar aanwezig. Op 15 mei 1 paar met 5 jongen en op 12 juni 2 paar met 9 jongen. Dat de Knobbelzwaan agressief kan zijn bewees op 10 juni een paartje met 4 jongen, dat niet toestond, dat een koe naar de waterkant kwam. Op zeker moment probeerden wel 15 koeien dit, maar ze kwamen niet verder dan de zwanen toestonden.
- Kl. Zwaan:** 1 juv. ex. op 10 maart, die door de Knobbelzwanen werd verdreven. Op 20 mrt. 2 exx. boven het terrein rondvliegend.
- Buizerd:** 1 ex. op 12 mrt., om 14.30 uur bevond de vogel zich boven het terrein, waar hij zich een kwartier ophield en toen door de Kokmeeuwen werd verjaagd.
- Sperwer:** Op 19 maart 1 ex.
- Boomvalk:** Op 21 juni 1 $\overset{\circ}{\circ}$.
- Torenvalk:** 1 ex. op 9 apr., 3 nov. en 10 dec.
- Patrijs:** 2 exx. op 25 apr. en 5 mei en op 30 nov. 8 exx.
- Waterhoen:** Alleen in jan. en mrt. niet gezien, meestal 1 of 2 exx. Op 5 juni 4 jongen gezien en op 21 juni, 20 en 23 aug. telkens 2 jongen.
- Meerkoet:** Het gehele jaar aanwezig, met grote aantallen in jan., feb. mrt., nov. en dec.; op 5 feb. 410 exx. in 2 troepen, op 12 mrt. 145 in 2 troepen en op 10 dec. 95 exx. Op 9 apr. waren 2 nesten verstoord. Op 30 apr. 1 $\overset{\circ}{\circ}$ + met 3 jongen, op 21 mei 2 $\overset{\circ}{\circ}$ ++ samen met 9 jongen, Op 5 juni 8 met 25 jongen, Op 2 juli 2 $\overset{\circ}{\circ}$ ++ met 8 pulli en op 20 aug. 3 jongen.
- Scholekster:** Van 5 mrt. tot 2 sept. in troepen van 2-67 exx. Tot 3 nov. geen Scholekster meer, maar dan komt er 1 ex., dat het jaar uit blijft. Van de Scholekster moet worden aangenomen, dat de meeste 's-morgens, niet te vroeg, uit de duinen komen en zoals waargenomen is, in de late namiddag daar weer heen trekken. Op 30 apr. 1 nest, op 12 juni 3 jongen. Grote aantallen vogels op 15 mrt. 1 troep van 50 exx. + 11 in 5 troepjes, op 10 mrt. 51 in 5 troepen, op 12 mrt. 63 in 6 troepen, op 27 mrt. 43, op 6 apr. 60, op 24 apr. 1 troep van 40 exx. + 27 in 10 troepen en op 17 juli 36 exx. in 8 troepjes.
- Kievit:** De eerste 2 exx. op 19 feb. in de sneeuw, daarna tot aan dec. vogels aanwezig. In jan. en feb. resp. 22 en 25 kieviten, overvliegend. Van 19 feb. tot 5 juni van 1 paar tot 52 exx. Op 9 apr. weinig kieviten, door het zoeken naar eieren de rust verstoord en de vogels uitgeweken naar elders. In juni in toenemend aantal, zoals op 21 juni 150 exx., juli en aug. 200 exx., 2 sept. 300 exx.; op 22 okt. 447 exx., in 17 troepen, op 23 nov. 850 exx. Daarna weer afnemend, maar op 10, 14 en 25 dec. weer 500 of meer. Op 16 apr. het eerste nest gezien, op 24 apr. 2 nesten en op 30 apr. 1 nest. Op 15 en 21 mei 1 paar met 2 jongen, op 5 juni 2 paar met samen 5 jongen, 12 en 26 juni 4 paar met 6 jongen. Op 26 nov. om half 5 kwamen 707 kieviten in 7 troepen uit het noorden gevlogen cirkelden lang rond en streken neer op de zeer natte weilanden.

- Goudplevier:** Tussen de Kieviten vlogen op 26 nov. 100 goudplevieren in 3 troepen mee, maar ze streken niet neer, maar vlogen door in zuidelijke richting. Voorts nog 5 waarnemingen, op 16 apr. 1 troep van 16 exx. (noordelijke vorm) Op 29 sept. 15 exx., op 27 okt en 10 nov. 2 en op 16 dec. 100 exx.
- Watersnip:** Van aug. tot en met dec. geregeld waargenomen. In mrt. 3 maal en in juni 1 maal gezien. Meestal in klein aantal 1-5 exx. Grotere aantallen op 7 okt. 20 exx., 29 okt. 98, 23 nov. 13 en op 26 nov. 11 exx. Het hoge aantal van 98 exx. werd veroorzaakt doordat in de namiddag 2 troepen van resp. 40 en 50 exx. neerstreken, dit was niet naar de zin van de Kieviten, die de snippen probeerden te verjagen.
- Bokje:** Op 5 nov. 21 exx. in 2 troepen.
- Wulp:** Vanaf 5 feb. tot 22 apr. en van 17 juni tot 16 sept. geregeld waargenomen, meestal 1-7 exx. Grotere troepen op: 19 mrt. 18 exx., 20 aug. 11 exx. in 3 troepen, 23 aug. 40 exx. en op 28 aug. 11 exx.
- Grutto:** Van 5 mrt. tot 23 aug. aanwezig, veel vogels in apr., mei, juni en juli, b.v. op 24 apr. 14 troepen samen 55 exx., op 30 apr. 42 exx. in 17 troepen, 12 juni 58 exx. en op 20 juni 47 exx. Op 7 mei de eerste jongen gezien, 3 pulli, verder op 5 juni 3 paar met 7, op 20 juni 5 paar met 7 en op 10 juli 1 paar met 2 jongen gezien.
- Witgatje:** Op 2 juli 1 ex.
- Oeverloper:** Op 8 jan. 1 ex.
- Tureluur:** Van 5 mrt. tot eind juli geregeld in wisselend aantal aanwezig. Daarna nog op 23 aug. 1 ex., 24 sept. 3 exx. Het eerste jong werd gezien op 30 apr., later op 12 juni 2 paar met 1 jong op 20 juni 2 paar samen met 2 jongen.
- Zwarte Ruiter:** 9 maal waargenomen, waarvan 4 maal in apr. en mei en 5 maal in sept. en nov. Alleen op 30 apr. 1 ex. de andere dagen 2, 3 en 4 exx.
- Kemphaan:** Van 27 maart tot en met 2 juli aanwezig. De vogels verbleven dit jaar niet alleen op de stoeplaats. De 2 broedpaartjes waren van de andere vogels verwijderd. Groot aantal gezien op 24 en 25 apr. n.l. 20 66 en 24 ⁰⁰ ⁺⁺. Veel vogels hielden er zich maar kort op, zoals op 9 en 26 apr., toen er op een zeker moment een troep van resp. 30 en 50 exx. was.
- Gr. Mantelmeeuw:** Slechts 3 waarnemingen: op 11 sept. 2 ad.exx., 22 okt. 4 ad. en 6 juv. en op 12 nov. 2 ad. en 4 juv.
- Kl. Mantelmeeuw:** In de eerste helft van het jaar weinig vogels, maar na 23 aug. de rest van het jaar altijd aanwezig. Grote aantallen op 12 nov. 18 ad. en 33 juv. en op 17 dec. 30 ad. en 60 juv.
- Zilvermeeuw:** Bijna het gehele jaar aanwezig, na aug. niet alleen méér waarnemingen, maar ook grotere aantallen. Veel vogels op 2 feb. 50 exx., op 23 aug. 40 exx. en als topdag 30 nov. 120 exx., w.o. veel juv.
- Stormmeeuw:** Het gehele jaar waargenomen in zeer wisselend aantal van 1 juv. ex. tot 100 exx.
- Dwergmeeuw:** 2 maal gezien, op 24 apr. en op 13 aug. 1 juv.ex. Op 13 aug. was, als gevolg van de grote luchtvochtigheid bij een temperatuur van 27° C., de warmte drukkend. De spreeuwen en de zwarte kraai zaten met de bek wijd open. Er waren deze middag weinig soorten vogels, daarom was het leuk een juv. dwergmeeuw op enige afstand van de kokmeeuwen te zien. Hij was erg schuchter en dook geregeld in het gras.

- Kokmeeuw:** Altijd aanwezig met grote aantallen in jan., feb. en na aug. Veel vogels op 23 aug. 500 exx., 2 sept. met 900 exx. en 17 nov. met 300 exx. Op 1 okt. 5 exx. met stookolie.
- Visdiefje:** Waargenomen van 16 apr. tot en met 17 juli met 1-4 exx.
- Holenduif:** Alleen op 20 aug. 1 ex. gezien.
- Houtduif:** Bijna altijd aanwezig met aantallen van 2 tot 176 exx.
- Koekoek:** Op 5 en 12 juni 1 overvliegend in de richting Spaarndam, naar Spaarwouderveen?
- Gierzwaluw:** Gezien van 2 mei tot 17 juli in aantallen van 3-20 exx.
- Veldleeuwerik:** Bijna altijd aanwezig, alleen in sept. geen waarnemingen. Meestal 1-4 exx., maar op 5 feb. 8 exx. in 3 troepen, op 24 apr. 6 in 4 troepen, op 27 okt. 8 exx., 17 nov. 20 en op 30 nov. en 10 dec. 10 exx. Op 6 mrt. de eerste zingende man. Op 30 april 1 jonge vogel gezien.
- Boerenzwaluw:** Van 10 apr. tot en met 28 aug. geregeld waargenomen met 1-7 exx., alleen op 3 juni 10 exx.
- Huiszwaluw:** Van 19 apr. tot 20 aug. 11 maal gezien in aantal van 1-5 exx.
- Oeverzwaluw:** Weinig waargenomen, slechts 4 maal, in mei en juni met 1-8 exx.
- Zwarte kraai:** Het gehele jaar aanwezig, meestal 2-8 exx. Veel vogels, op 2 apr. 20 exx., 8 okt. 17 exx. in 4 troepen w.o. 1 troep van 12 exx. Op 5 nov. 40 exx., w.o. 1 troep van 30.
- Bonte kraai:** Tot 16 apr. waarnemingen van 1-3 exx. Na 3 nov. 10 maal waargenomen met 1-5 exx.
- Kauw:** Het hele jaar aanwezig met 2-80 exx. Dit laatste aantal was op 30 nov. Op 9 apr. 28 exx. in 7 troepen, w.o. 1 kauw met witte vleugels.
- Ekster:** Van 20 mrt. tot 20 juni 8 maal en na 10 nov. nog 2 maal. Meestal 1 of 2 vogels, maar op 10 nov 3 exx. Heeft waarschijnlijk bij de speeltuin in Spaarndam gebroed.
- Pimpelmees:** Alleen 14 en 31 dec. 1 ex. in de rietkragen.
- Kramsvogel:** Tot 24 apr. en na 27 okt. veel vogels aanwezig. Meestal tot ong. 100 exx. maar op 17 nov. 300, op 10 dec. 400 en op 25 dec. 300 exx.
- Koperwiek:** In jan. 2 maal gezien, maar na 22 okt. geregeld gezien. Waren er in jan. max 25 exx., in de laatste 3 maanden werden er 10-100 exx. genoteerd.
- Merel:** Na 10 nov. 4 waarnemingen van 2-5 exx.
- Tapuit:** In apr., aug. en sept. 4 maal 1 ex.
- Roodborst:** 1 ex. op 14 dec.
- Rietzanger:** Van 25 apr. tot 17 juli geregeld waargenomen. Op 30 apr. 2 exx. w.o. 1 zingend δ . Op 26 juni de laatste zingende δ gehoord. Meestal 2 paar, maar op 26 juni 9 exx. in 5 troepen aanwezig.
- Graspieper:** Vanaf 2 feb. geregeld aanwezig. Op 10 mrt. 2 zingende $\delta\delta$. Aantallen meestal van 1-8 exx., maar op 26 juni 17 in 6 troepen, op 11 sept. 12 exx., 29 sept. 15 en 7 okt. 20 exx.
- Witte Kwikstaart:** Op 16 apr. en op 15 mei 1 ex.
- Gele Kwikstaart:** Tussen 9 apr. en 17 sept. slechts 7 maal gezien van 1-2 exx. Op 11 sept. 8 exx. in Velserbroekpolder.
- Spreeuw:** Altijd aanwezig in wisselend aantal van 20-300 exx. Na 5 juni veel jonge vogels. De verhouding van andere jaren van ouden en jongen van 4 : 1 gaat ook dit jaar op, zoals op 5 juni, toen er van de 93 exx. 25 jongen werden gezien.
- Kneu:** 2 maal gezien, op 22 apr. 4 en 5 mei 2 exx.
- Rietgors:** Vanaf 10 mrt. tot 17 juli steeds 1-4 exx. en op 14 okt. 1 ex. Op 20 mrt. 1 zingende δ , op 30 mrt. 2.
- Huismus:** Vanaf 29 jan. bijna het hele jaar aanwezig, alleen in aug. niet. Meestal niet meer dan 10 exx. Op 15 mei echter 14 $\delta\delta$ " 18 $\delta\delta$, op 26 juni 40, 21 okt. 50 en 10 nov. 20 exx.