

Inventarisatieverslag

HEKSLOOT

1970

Na de koude winter en zeer natte februarimaand bleef de temperatuur tot en met april aan de lage kant met dikwijls harde noordwestelijke wind en hagel. Ondanks dit slechte voorjaar mag gesteld worden dat het broedseizoen zeer goed is geworden.

Vooraf grutto en kievit hebben meer broedsels met sukses groot gebracht dan andere jaren.

Hierbij een overzicht van de aanwezige vogels:

- FUUT:** Komt hier niet vaak voor, alleen als het op de Mooie Nel te druk met zeilers wordt. 23 aug. 2 ad.w.o.1 eks.met 2 jongen op de rug, 6 sept.1 ad.met 2 jongen, 20 sept.1 ad. met 2 jongen.
- DODAARS:** Alleen 13 dec. 2 eks.tussen de meerkoeten.
- BLAUWE REIGER:** Gehele jaar aanwezig met veelal 2-4 eks.maar 10 mei 6³ *)
7 jun.7 en 16 aug.en 20 sept.6 eks.
- WILDE EEND:** Gehele jaar aanwezig met meestal 34-48 ♂♂ en 31-42 ♀♀.
Eerste jongen 10 mei: 17² . 17 mei 16³ pulli, 14 jun.49¹²
jongen, 12 jul.41¹⁰ jongen en 7¹ dons jongen, 16 aug.♀ met
6 dons jongen, 23 aug.♀ met 7 jongen, 26 dec.nog maar 4 ♂♂
en 4 ♀♀ aanwezig door ijs in sloten.
- WINTERTALING:** Van half maart tot en met 13 dec.aanwezig,meestal 4-5 eks.
Uitzondering 22 mrt. 5♂♂ en 5♀♀, 18 okt.12 en 29 nov. 18
eks. 28 jun. een nest gezien.
- ZOMERTALING:** Tweemaal waargenomen op dezelfde plaats als in 1969.12 apr.
♂ en ♀, 30 apr.♂. Of hier werkelijk van een broedgeval
sprake is, kan evenals in 1969 geen bevestiging van gege-
ven worden, daar de waarnemingsplaats niet te bereiken is.
- SMIENT:** Tot eind april aanwezig, met 70-93 eks.,30 apr.nog 2♂♂ en
2 ♀♀,18 okt.weer de eerste eks.terug en wel 38 stuks.Wordt
meestel rondvliegend waargenomen,weinig op de grond of in
het water, maar op 29 nov. 84² eks.aanwezig w.o.70¹ eks.
Toen wel op weiland bij meerkoeten. In de namiddag van 24
dec.vlogen ± 500 eks.over en streken neer in het Noorder
Spaarne dat nog open was.

*) De aanduiding 6³ betekent 6 vogels in 3 groepjes.

- SLOBEEND:** Waargenomen vanaf half maart tot eind dec. Tot begin mei veelal 7♂♂ en 5 ♀♀, in juni alleen ♂♂. Weinig vogels tot half nov., hierna weer meer en wel: 15 nov. 6 ♂♂ en 5 ♀♀, 20 nov. 3♂♂ en 3 ♀♀. Eind apr. een nest jongen gezien op 12 jul. 4¹ en 19 jul. 2¹.
- TOPPEREEND:** Alleen 5 apr. ♂ en ♀ in fortgracht.
- KUIFEEND:** Aanwezig van begin maart tot eind dec. Meestal zo'n 6-8 ♂♂ en ♀♀. In nov. meer en wel: 15 nov. 10♂♂ en 10♀♀, 29 nov. 11 ♂♂ en 10 ♀♀, 12 jul. 8² jongen. Gaan bij vorst naar Moeie Nel.
- TAFELEEND:** Slechts één waarneming, 5 apr. ♂ en ♀.
- MIDD.ZAAGBEK:** Tweemaal in fortgracht, 22 mrt. en 5 apr. een ♂ en ♀.
- BERGEEND:** Van begin maart tot eind juli aanwezig met 2-6 eks. Heeft hier niet gebroed, wel aan het B-kanaal.
- ROTGANS:** B.B. hrota (lichte vorm). Tweemaal waargenomen op 1 en 8 maart. Heeft zich hier ong. een veertien dagen opgehouden. Verbleef niet alleen in de weilanden maar ook in het Noorder Spaarne, bij 2-3⁰ C. en een laagje ijs op de sloten na de nachtvorsten en grote stukken weiland onder water.
- KNOBBELZWAAN:** Van de twee nesten is op 17 mei een nest verstoord waargenomen. Het andere nest heeft 3 jongen opgeleverd. Eind juli en aug. ook nog 3 paren met 12 jongen aanwezig, deze hebben echter niet direkt hier gebroed.
- SMELLEKEN:** Een ♂ op 30 apr. gehele tijd aanwezig zittend op hek in weiland of op de grond en korte stukjes rondvliegend, aangevallen door kievit en scholekster.
- TORENVALK:** Zes waarnemingen en wel 1 eks. op 8 feb. 25 jul. 23 aug. en 18 okt. 6 sept. ♂ en ♀ langdurig kunnen waarnemen: ♂ op hek langs de Slaperdijk en daarboven op lichtmast het ♀. 20 sept. langs de Nieuwe Rijweg werd het volgende genoteerd: "gedrag van valk anders dan we gewend zijn. Verbleef op hekken en bunkers, werd door kievit aangevallen. Sloeg huismus op de grond, van opzij, zoals de sperwer dit pleegt te doen. Prooi werd op een bunker geplukt, veren bleven over. Eind band staart zwart-wit, zwart horizontaal. Stuit bruin, wat wijst op jonge valk in eerste najaar. Poten en oogring geel.

- PATRIJS:** Komt hier nog maar weinig voor, wordt in de Velsbroekpolder meer gezien. Waargenomen op 15 nov. 7¹ eks.
- KWARTEL:** 20 sept. zaten Weber en ik in het gras te kijken naar de torenvalk, toen opeens een zandkleurig kopje uit een greppel omhoog stak. De eerste reactie was "dit is geen patrijs, veel kleiner". De effen witgele keel van het vrouwtje zagen we het eerst. Na lange tijd kwamen 7 eks. uit de greppel, waarbij bleek dat hier 4 ♂ en 3 ♀ waren. Van de ♂ was de keel donker gevlekt. Duidelijk verschil tussen ♂ en ♀ de donkere strepen van keel tot oorvlek. Bij het op de buik besluipen van de vogels tot op 25 meter, gaven ze als geluid kwiek-ek-iek voor ze opvlogen.
- FAZANT:** Slechts eenmaal een ♂ aanwezig op de dagen dat is waargenomen. 30 apr. meerdere verblijven op het militair gebied tussen Slaperdijk en B-kanal.
- WATERHOEN:** Gehele jaar aanwezig met 10 tot 22 eks. 30 apr. een nest. Eerste jongen 7 juni en wel 3¹. In jun. jul. en aug. geregeld jongen gezien. 23 aug. 2¹ jongen en 2¹ donsjongen.
- MEERKOET:** Behalve de laatste week van het jaar, door ijs, altijd aanwezig. Tot eind maart 287-690 eks. en de laatste maanden 108-247 eks. Van half apr. tot begin aug. 18-46 eks. 12 apr. 1e nest, 10 mei 1 nest met jongen, 17 mei 1 nest met 9 eieren, 7 jun. 21⁷ jongen, 19 jul. 11² jongen en 2¹ donsjongen, 16 aug. 2¹ jongen. Toen 29 nov. de ijsbaan Nova Zembla onder water was gezet, gingen ± 50 koeten daarheen.
- SCHOLEKSTER:** Tot 16 aug. aanwezig met een zeer wisselend aantal. Eerste vogels op 25 feb. 42 eks. 8 maart de eerste baltsende, 30 apr. een nest waargenomen. 2² jongen gezien op 14 juni. Grote aantallen vogels op 22 maart 22⁹ eks. en 2¹ baltsend. 28 jun. 20 eks. 12 jul. 26 eks. 16 aug. de laatste 2 eks.
- KIEVIT:** Aanwezig vanaf 25 feb. 1 mrt. 28 eks., 30¹ eks. rondvliegend en 2¹ eks. baltsend. Eind apr. eerste alarmroep, 7 jun. eerste 2¹ jongen gezien. Laatste jongen op 19 jul. Eind jul. nog veel alarm, toen reeds vier weken werd verzameld. Tot eind mei 28-46 eks. Van half juni tot 18 okt. 93-139

- eks. Grote aantallen op 15 nov. 207 eks. en 150¹ rondvliegend. 29 nov. 319 eks. 13 dec. 244 eks. 20 dec. ± 1000 eks. boven het gebied. 26 dec. bij vorst nog 40¹ eks. rondvliegend.
- GOUDPLEVIER:** Tussen half aug. en okt. viermaal gezien, meestal tussen de kieften. 16 aug. 3 eks. 23 aug. 1 eks. 6 sept. 38 eks. 18 okt. 2 eks. Ook deze plevier meer en in groter aantal aanwezig aan de andere kant van de Slaperdijk.
- WATERSNIP:** Van half maart tot en met eind juni achtmaal waargenomen met 2 tot 6 eks. 17 aug. 17² eks. Van 18 okt. tot 13 dec. soms meer eks. dan in eerste halfjaar, resp. 3, 18, 54 en 3 eks. Van de 54 eks. op 29 nov. waren 30¹ eks. aanwezig.
- BOKJE:** Slechts driemaal gezien met telkens 1 eks. en wel op 12 apr., 15 nov. en 29 nov.
- WULP:** Tweemaal hier waargenomen en wel 8 mrt. 11⁵ eks. en 5 apr. 4 eks. Aan de andere kant van de Slaperdijk, in de Velserbroekpolder komt de wulp meer voor vooral in de herfst.
- GRUTTO:** Nadat op 8 maart de eerste vogels hier weer waren, zijn ze gebleven tot eind juli. Aanwezig 4 tot 44 eks. Een week na aankomst waren 6³ eks. baltsend en vlogen 25² eks. over naar N.O. Alarm vanaf eind apr. Eerste jongen 17 mei 2 eks. 7 jun. groot alarm van een troep met kieften, werd veroorzaakt door een wezeltje dat achtervolgd werd tot over de weg van de Slaperdijk.
- WITGATJE:** Twee waarnemingen van telkens één eks. 10 mei en 16 aug.
- OEVERLOPER:** Viermaal aanwezig, tussen half mei en begin okt. 17 mei 1 eks. 14 juni 2¹ eks. 16 aug. 1 eks. en 6 sept. 2 eks.
- TURELUUR:** Eerste waarneming van 4 eks. op 15 mrt. Tot eind juli 2-7 eks., maar als uitzondering 7 juni met 13 eks. Ook op 7 en 14 juni 6³ jongen gezien. Na 25 juli nog op 23 aug. en 20 sept. 1 eks.
- ZWARTE RUITER:** In tegenstelling tot voorgaande jaren slechts eenmaal gesignaleerd met 1 eks. op 7 juni.
- KEMPHAAN:** Aanwezig op de vaste stoeiplaats van 15 mrt. tot 12 jul. Heeft evenals in 1969 hier niet gebroed. Veelal 4 ♂♂ en 6 ♀♀. Bij hoog gras op de stoeiplaats niets te merken van de aanwezigheid zoals eind mei en begin juni.

- GROTE MANTELMEEUW:** Weinig aanwezig. 8 feb. 2 ad., 6 sept. 4 ad., 15 nov. 8 ad. en 12 juv., 29 nov. 6 ad. en 8 juv.
- KLEINE MANTELMEEUW:** In de eerste maand van het jaar 8-12 eks. Na half aug. meer, grote aantallen op: 16 aug. 32 eks. 15 nov. 19 ad. en 24 juv. 29 nov. 17 ad. en 23 juv.
- ZILVERMEEUW:** Alleen in juni niet aanwezig. Hoewel andere maanden wel hier, zijn de aantallen zeer teruglopend. Veelal 4 tot 12 eks. Meerdere vogels op 8 feb. 14 eks. 12 apr. 19 eks. 30 apr. 16 ad. en 10 juv. 20 sept. 6 ad. en 12 juv. 29 nov. 23 eks.
- STORMMEEUW:** Bijna het gehele jaar aanwezig met veelal 8-19 eks. Alleen 29 nov. meer en wel 34 eks.
- KOKMEEUW:** Het gehele jaar aanwezig met aantal eks. dat sterk schommelt. Doorgaans 23 tot 89 eks. Uitzondering 18 okt. 109 en 29 nov. 108 eks. 12 jul. veel jonge vogels hier aanwezig uit de duinstreek.
- ZWARTE STERN:** Op 16 mei vlogen 52³ eks. over in richting oost.
- VISDIEFJE:** Vanaf 10 mei tot half aug. aanwezig met 2-4 eks.
- HOUDUIF:** Veelal aanwezig maar niet altijd. De grote aantallen van jaren geleden, die constant hier waren, ziet men niet meer. Alleen 30 apr. met 93 eks. maakt een zeer grote uitzondering. Indien aanwezig varieert het aantal duiven van 3 tot 23 eks.
- KOEKOEK:** In mei en juni geregeld over het gebied vliegend naar noordoost of oost, veelal tussen 07.00 en 08.00 uur.
- GIERZWALUW:** Tussen eind apr. en aug. aanwezig. Tot 7 jun. 5-7 eks. Hierna tot 25 jul. 9-17 eks. Het laatste eks. gezien op 23 aug.
- BOOMLEEUWERIK:** 26 en 27 dec. op de grond 23¹ eks. bij een weinig sneeuw en lichte vorst.
- VELDLEEUWERIK:** Veelal aanwezig maar niet altijd. Niet in feb. aug. en sept. waargenomen. Twee zingende ♂♂ bij 6³ eks. op 22 mrt. 10 mei nog een zingend ♂. Meestal 2-3 eks. aanwezig met als uitzondering 22 mrt. en 12 apr. met elk 6 eks. 27 dec. in een weinig sneeuw 17¹ eks. w.o. 1 eks. met bijna witte halsband.

- BOERENZWALUW:** Aanwezig tussen 10 mei en 6 sept. met 3-8 eks.
- HUISZWALUW:** Van begin jun. aanwezig tot sept. In jun. 2-19 eks.
in juli de meeste: 26-32 eks. 16 en 23 aug. resp. 15 en
12 eks. 6 sept. 17 eks. dit bleken de laatste te zijn.
Meestal in het gebied aan de Nieuwe Rijweg.
- OEVERZWALUW:** Veel minder dan voorgaande jaren waargenomen n.l.
slechts eenmaal en wel op 28 jun. 3 eks.
- BONTE KRAAI:** Tot half mrt. geregeld aanwezig met 2-4 eks., alleen
25 jan. 6² eks. Vanaf half nov. tot eind dec. aanwezig
met 2-8 eks. 27 dec. 9 eks. bij vorst.
- ZWARTE KRAAI:** Gehele jaar aanwezig met meestal 2-4 eks. Uitzondering
op 14 feb. 5³ eks. 15 mrt. 9¹ eks. 22 mrt. 7² eks. en 29
nov. 6 eks.
- KAUW:** Het gehele jaar waargenomen. Meestal met 2 tot 7 eks.
Soms meer, zoals 12 apr. en 17 mei 12 eks. en 6 sept.
10 eks. Veel vogels op 10 mei, 21 eks. doordat de boer
de koeien met schillen en afval van etensresten bij-
voerde.
- KOOLMEES:** Van jan. tot half mrt. 1 - 2 eks. 10 mei 1 eks. 20 sept.
3 eks. 15 en 29 sept. 1 eks. en 13 dec. 1 eks. Bevin-
den zich meestal in knotwilg aan Nieuwe Rijweg. 13 dec.
2¹ eks. overtrekkend.
- PIMPELMEES:** Komt alleen in jan. en feb. en in de laatste maand van
het jaar voor met 1-3 eks. evenals de koolmees langs
Nieuwe Rijweg.
- KRAMSVOGEL:** Tot 5 apr. met kleine aantallen voorkomend en wel 2-5
eks. Alleen 11 jan. 16 eks. Van half nov. tot eind dec.
meer vogels: 15 nov. 65, 29 nov. 53 en 13 dec. 13 eks.
- KOPERWIEK:** In het begin van het jaar alleen op 11 jan. 14 eks. Van-
af half nov. meer aanwezig en wel: 15 nov. 83, 29 nov. 102
en 13 dec. 29 eks.
- MEREL:** Wordt van jan. tot en met juni en in nov. en dec. waarge-
nomen met enkele eks. vlakbij de bebouwing van hoek
Nieuwe Rijweg-Slaperdijk.
- ROODBORST:** Alleen op 25 jan. 1 eks. in rietkraag langs Nieuwe
Rijweg.
- RIETZANGER:** Het eerste ♂ eks. op 12 apr. gezien. Tot half aug. aanwezig
met 3 paren.

- GRASPIEPER:** Komt in wisselend aantal voor, meestal 3-6 eks. Uitzonderlijk veel op: 4 jan. 12², 16 aug. 14, 6 en 20 sept. 12 eks. Eerste jong op 7 jun. Later nog jongen waargenomen op 12 jul.1 en 19 jul.2 eks.
- GELE KWIKSTAART:** Driemaal waargenomen, op 10 mei 1 eks. 6 en 20 sept. 3 eks. Helaas weer geen broedgeval, geeft voorkeur aan Velsbroek- en Spaarndammerpolder.
- SPREEUW:** Het gehele jaar aanwezig met aantallen die zeer uiteen lopen en wel van 14 tot 525 eks. 11 jan. na de regen van afgelopen dagen, nu op de sneeuwvrije weilanden, 525 eks. 12 apr. 249 eks. w.o. 200 in één troep. 15 nov. 98 eks. w.o. veel die even neerstreken, op weg van slaappleats naar voedselgebied. Eerste jonge vogels, 22 eks., kwamen op 7 juni met 59 ad. eks. foerageren. 26 dec. tussen 9.00u en 9.30u. vlogen 412⁶ eks. over naar de voedselgebieden. Slaapvluchten zowel van noord naar zuid als van zuid naar noord.
- PUTTER:** Drie waarnemingen: 15 mrt. 7 eks. 20 sept. 2 eks., beide malen langs Nieuwe Rijkweg en 18 okt. 3 eks. op "vuilstortplaats".
- VINK:** Op 4 jan. en 15 mrt. een ♂-♀ aanwezig. 13 dec. 3¹ eks. overtrekkend naar zuid. 26 dec. nog een ♂.
- RIETGORS:** Twee paar aanwezig van 22 mrt. tot eind aug., die hun nesten weer op de vertrouwde plaatsen innamen.
- HUISMUS:** Het gehele jaar aanwezig. Buiten de broedparen, onder de dakpannen van het gemaal bij de Slaperdijk, veel zwervende mussen aanwezig waarvan de aantallen zeer verschillen. Tot half apr. 3-8 eks., van 30 apr. tot 20 sept. 12-30 eks. In sept. 3-4 eks. Dec. geeft weer meer mussen en wel 13 eks.

" WAT WIJ DE NATUUR AANDOEN DOEN WE ONS ZELF AAN"

	<u>Broedvogels Heksloot</u>							
	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Wilde eend	10	8	8	12	13	12	13	14
Wintertaling				1	1	1	1	1
Zomertaling							1?	1?
Sloboend	2	2	1	2	2	2	2	2-3

	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Kuifeend				2	2	2	2	2
Knobbelzwaan	1	1	1	2	3	3	2	2
Waterhoen	1	1	2	3	3	5	3	3
Meerkoet	2	3	5	8	8	14	9	11
Scholekster	2	2	2	2	1	2	-	2
Kievit	15	4	5	6	8	10	6	12
Grutto	12	3	6	6	8	10	8	12
Tureluur	3	1	2	2	2	2	2	4
Kemphaan	4	2	-	2	2	2	-	-
Veldleeuwerik	-	-	-	3	2	3	2	2
Rietzanger	-	-	-	3	2	2	3	3
Graspieper	2	1	1	3	2	2	2	2
Gele Kwikstaart	3	1	-	-	-	2	-	-
Rietgors	1	1	1	3	2	2	2	2
Huismanis	3	3	2	3	3	2	2	3

E.Dijkstra

L.A.Weber