

J A C H T D U I N e.o. 1973

	'73	'72		'73	'72
Torenavalk	-	-	Zwartkop	5	8
Scholekster	1	1	Tuinfluitter	3	5
Kievit	-	-	Grasmus	2	5
Houtsnip	2	2	Braamsluiper	2	1
Holenduif	-	-	Fitis	17	18
Houtduif	8	10	Tjiftjaf	5	2
Tortelduif	10	6	Fluitter	-	-
Turkse Tortel	-	-	Gr.Vliegenvanger	4	1
Koekoek	3	3	Koolmees	14	17
Bosuil	1	1	Pimpelmees	15	13
Ransuil	-	-	Zwarte Mees	1	2
Groene Specht	1	3	Kuifmees	1	1
Gr.Bonte Specht	3	5	Glanskopmees	5	10
Kl.Bonte Specht	1	1	Staartmees	2	1
Boomleeuwerik	1	1	Boomklever	3	3
Boompieper	5	4	Boomkruiper	3	6
Winterkoning	8	7	Vink	11	10
Heggenus	13	15	Groenling	2	-
Grote Lijster	-	-	Kneu	1	-
Zanglijster	8	5	Ruismus	n.g.	n.g.
Merel	14	15	Ringmus	5	6
Tapuit	1	-	Spreeuw	12	20
Gekr.Roodstaart	7	8	Wielewaal	-	-
Nachtegaal	6	8	Vlaamse Gaai	3	4
Roodborst	19	13	Kauw	1	1
Sprinkhaanrietzanger	1	1	Zwarte Kraai	1	1
			Waterhoen	-	-
			Wilde Eeend	-	-
			Grauwe Klauwier	-	-
			Fazant	n.g.	n.g.

Voor dit gebied en vermoedelijk voor het gehele duingebied is de achteruitgang van Gekraagde Roodstaart en Grasmus opvallend. Aanvankelijk werd gedacht aan tijdelijke terugval. Van iedere vogelsoort worden van jaar tot jaar wel eens vrij grote verschillen in aantal gekonstateerd. Verschillende publikaties tonen echter aan dat deze achteruitgang over geheel Europa een feit is. De oorzaak zou n.l. te vinden zijn in de overwinteringsgebieden in Afrika door de grote droogte aldaar en waarschijnlijk ook het gebruik van insecticiden. Deze toestand zou al in 1969 zijn aangevangen. Bij een vergelijking over tien jaar vond ik voor deze soorten in Jachtduin:

	'64	'65	'66	'67	'68	'69	'70	'71	'72	'73
Aant.Gekr.Roodstaart	12	12	15	18	14	8	11	9	8	7
Grasmus	9	2	8	10	5	2	4	3	4	2

Deze aantallen zijn te gering om in % uit te drukken maar afgezien van de fluktuaties is de dalende lijn wel te zien. Meerdere vogelsoorten zijn bij deze achteruitgang betrokken die echter voor het duingebied niet belangrijk zijn.

Men kan zich echter wel afvragen of de oorzaak van het verdwijnen van vogelsoorten die minder algemeen waren zoals Nachtzwaluw, Wielewaal, Grauwe Klauwier

ook gezocht moet worden in het overwinteringsgebied. Prettiger is het bericht het voor het derde jaar waarnemen van een paar Goudvinken op 25 april en 5 mei. Het konstateren van een broedgeval ergens in de Kennemerduinen bevestigt de vestiging van de soort. Toch ook dit jaar weer waarnemingen van Kruisbek: 25 april, 5 mei overvliegend en roepend, 11 mei. Verder waargenomen: Bonte Vliegenvanger 5 mei, Wielewaal 19 mei, Spotvogel 19 mei, Buizerd 19 mei. Totaal aantal soorten (volgens lijst) 45 in 231 territoria.

J. Bijster

A. Kooy

J. Gijzenkade 275

Haarlem.