

## Ontwikkeling van de Blauwe Reigerkolonie op landgoed Waterland

Fred Hopman

De Blauwe Reigerkolonie op het landgoed Waterland is alweer een aantal jaren de grootste van de regio. Ondanks de fluctuaties in het aantal broedparen kan de kolonie in Waterland, vergeleken met de andere kolonies in Zuid-Kennemerland, als "stabiel" worden beschouwd. Voor de kolonie op Waterland was 1992 een topjaar.

Een leuke ontdekking tijdens de inventarisatie op Waterland was dat de kolonie zich had uitgebreid naar het aangrenzende landgoed Beeckesteijn. Tot voor 1938 was er in Beeckesteijn een grote kolonie van meer dan 500 nesten te vinden, die verdween toen de nestbomen gekapt werden. In 1992, ruim een halve eeuw later, konden voor het eerst weer nesten worden waargenomen. Van de zes nesten waren er vier gezien het formaat al een aantal jaren in gebruik, terwijl twee nesten zich in het stadium van "duiveplatje" bevonden. Als nestboom worden op Beeckesteijn oude Beuken gebruikt, een boomsoort die in de kolonies van Berkenrode en Kennemerduin ook gebruikt wordt.

Het totaal aantal broedparen van de kolonie Waterland kwam voor 1992 uit op 80 waarvan 74 paar op te Waterland en zes paar te Beeckesteijn. In 1993 was het aantal broedgevallen, ondanks de hooggespannen verwachtingen van de inventariserenden, beduidend lager dan in 1992. Op Waterland werden 66 broedgevallen geregistreerd en op Beeckesteijn kwam maar één paar tot broeden.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal broedparen in de afgelopen jaren.

Tabel 1. Aantal broedparen van Blauwe Reiger per jaar te Waterland (1983 t/m 1993) en Beeckesteijn (alleen 1992 en 1993).

jaar	83	84	85	86	87	88	89	92	93
broedparen	62	70	65	56	59	51	68	80	67

Waarschijnlijk is het aantal broedparen voor 1988 en 1989 zoals vermeld in tabel 1 te laag, als rekening wordt gehouden met de geconstateerde broedgevallen op Beeckesteijn in 1992 en

1993. De aangrenzende gebieden Hoogergeest, Velserbeek en Schoonenberg zijn in 1992 -gezien de genoemde uitbreiding naar Beeckesteijn- ook onderzocht op de aanwezigheid van broedende Blaauwe Reigers, maar hier zijn geen nesten aangetroffen. Gemiddeld waren er in de jaren tachtig zo'n 61 nesten jaarlijks bezet, waarbij fluctuaties van 8 broedparen meer of minder niet ongewoon waren. Voor betrokken inventarisanten en andere natuurliefhebbers blijft het elk jaar weer boeiend de gedragingen van de Blaauwe Reigerkolonie te volgen.

### Literatuur

- Huijssteeden, E.J. van, 1990. Blaauwe Reigers in Zuid-Kennemerland, aantalsontwikkelingen 1983-1989. Fitis 26: 34-42.
- Jong, P. de, 1990. De Blaauwe Reiger: bewoner van stadsparken en moerasbossen. Fitis 26: 110-114.

Fred Hopman, Stephensonplein 7, 1972 RP IJmuiden