

PIEREWAAIEN

In navolging van enkele leden van onze werkgroep die regelmatig een vast terrein bezocht hebben om de eventuele wijziging in de vogelpopulatie van dat terrein te bepalen heb ik een aantal tellingen gedaan op de zuidpier in IJmuiden en het aangrenzende strand.

Een gelukkige omstandigheid, zowel voor de hengelsport als voor vogelaars, was dat het hek gedurende een aantal maanden in reparatie was zodat de pier tot het einde bewandeld kon worden.

Het resultaat van deze bezoeken is in onderstaande tabel weergegeven. De meeuwen en Scholeksters zijn niet geteld. Kokmeeuwen, Zilvermeeuwen, Grote Mantelmeeuwen en Stormmeeuwen waren steeds in flinke aantallen aanwezig. Drieteenmeeuwen werden echter nooit gezien.

Bij de tabel kan nog het volgende toegelicht worden:

OEVERPIEPER: Op 18 maart was het fraai zomerweer. Toen werden 5 Oeverpiepers verspreid langs de pier gezien. Eén daarvan was mogelijk een Waterpieper. Tijdens zijnvucht werden zeer duidelijk de witte buitenste staartpennen waargenomen.

ROODHALSFUUT: Van de 3 op 18 maart waargenomen exemplaren was er één al in prachtkleed met geheel rode hals en fraaie witte wangen. De gele snavelbasis was steeds bij alle exemplaren goed te zien.

KUIFDUIKER: De op 31 maart aangetroffen Kuifduiker had reeds de kuif maar de borst was nog helder wit. Hier was dus van een overgangskleed sprake.

PAARSE STRANDLOPER: Geleidelijk werden deze strandlopers steeds lichter van kleur. Op 19 februari werden 2 Tureluurs bij deze strandlopers gezien. Beide soorten hebben oranje poten. De snavels zijn tevens oranje, maar alleen bij de strandloper ten dele bruin. De Tureluur is echter veel groter.

EIDEREEND: Bij de steeds aanwezige Eidereenden bevond zich meestal slechts 1 mannetje.

FUUT: Op 15 januari werd enkele honderden meters uit de kust een 15-tal Futen waargenomen die ten zuiden van de zuidpier voedsel zochten.

ZEEKOET: De op 25 december '71 waargenomen Zeekoet bevond zich op

het strand en was met olie besmeurd.

GRAUWE FRANJEPOOT: De meest bijzondere waarneming was wel de op eerste kerstdag waargenomen Grauwe Franjepoot die slechts enkele m. van de pier rondzwom, ongeveer 300 meter uit de kust. Op deze korte afstand waren de fijne zwarte snavel en de gestrepte rug zo duidelijk zichtbaar dat verwarring met de Rosse Franjepoot uitgesloten lijkt. Decemberwaarnemingen van de Grauwe Franjepoot zijn uiterst zeldzaam.

SOORT	DATA							
	25/12	8/115/1	5/219/2	4/318/3	31/3			
Eideraend	25	20	1	2	15	19	1	30
Drieteenstrandloper	100	10	10	25	10	5	25	1
Paarse Strandloper	10	25	25	35	30	3	35	-
Steenloper	30	35	25	40	30	15	1	-
Zwarte Zeeëend	5	2	1	2	-	-	10	1
Oeverpieper	-	-	1	-	1	1	5	1
Fuut	-	15	-	5	5	2	1	-
Roodhalsfuut	-	-	-	1	3	3	3	-
Brilduiker	-	-	-	1	4	1	1	-
Grote Zaagbek	-	-	2	2	-	-	-	1
Middelste Zaagbek	-	-	-	15	2	-	-	-
Toppereend	-	-	-	5	200	150	1	-
Kuifleeuwerik	-	1	2	-	3	3	4	12
Grote Zeeëend	-	-	-	-	-	1	-	-
Zeekoet	1	-	-	-	-	-	-	-
Parelduiker	1	-	-	-	-	-	-	-
Grauwe Franjepoot	1	-	-	-	-	-	-	-
Bonte Kraai	-	5	3	1	5	3	8	-
Kanoetstrandloper	-	-	1	-	-	-	-	-
Meerkoet	-	-	-	20	-	-	-	-
Kuifeend	-	-	1	-	-	-	-	-
Tureluur	-	-	-	-	2	-	-	-
Grutto	-	-	-	-	-	-	7	-
Kuifduiker	-	-	-	-	-	-	-	1

A. Mulder

Pieter Wantelaan 14, Overveen.