

Variabel voorkomen van de  
ROSSE FRANJEPOOT  
in onze contreien.

Getroffen door de aantalsvariabiliteit van mijn persoonlijke waarnemingen van de Rosse Franjepoot in onze regio, heb ik deze op een rij gezet

ter vergelijking van de afgelopen drie herfstten.

Najaar 1971: 1 eks. Zuidpier 24-10

1 eks. ,, 17-11

najaar 1972: 1 eks. strand t.h.v. Kenn.duinen 21-10

3 eks. Zuidpier 23-10

7 eks. ,, 25-10

2 eks. ,, 29-10

2 eks. Branding t.h.v. Kenn.duinen 15-11

2 eks. Zuidpier 18-11

4 eks. ,, 22-11

2 eks. Spartelmeer Kenn.duinen 2-12

najaar 1973: geen persoonlijke waarnemingen, wel 1 eks. Zuidpier 1-11  
gezien door K.Eigenhuis.

Opgemerkt dient te worden dat ik de betreffende gebieden (speciaal de Zuidpier) in elk van deze drie jaren vrijwel evenveel bezocht heb.

Het zoeken van verklaringen voor deze fluktuaties in het voorkomen van deze interessante broedvogel van Noordpoolgebieden, die zo bekoorlijk is door fourageergedrag, vertrouwen en uiterlijke vormgeving, brengt ongetwijfeld meerdere suggesties te berde die echter willekeurig en onzeker zijn en daarom alleen als ornamenten van ornithologie belangwekkend. Dergelijke suggesties zijn bijv. dat 1972 simpel een goed broedjaar was, wat m.i. een te snelle konklusie is omdat de gevonden waarnemingen op een te kleine schaal zijn gedaan; dat een bepaalde combinatie van windrichtingen meerdere Rosse Franjepoten aan onze kusten bracht (er zijn zelfs waarnemingen van ver in het binnenland) wat mij zou verbazen omdat ik geen verschil met andere jaren heb gekonstateerd; en dat de fluktuatie grotendeels op toeval berust terwijl een langsttrekkende Rosse Franjepoot kan zijn aangetrokken door reeds aanwezige eksemplaren.

A.v.d.Berg

Uilenstede 100

Eenheid 40 kamer 243

Amstelveen.