

## VELDWERK

## PROGRAMMA VELDWERK VOORJAAR/ZOMER 1990

Onderzoek	Periode	Plaats	Coördinator	
<u>Niet-broedvogeltellingen</u>				
Voorjaartrek-land	feb-mei	Parnassia - Kennemerduinen	Hans Groot	376735
Voorjaartrek-zee	feb-mei	Reddingsbrigade Bl.daal	Steve Geelhoed	333045
Eerste aankomstdata zomervogels	voor- jaar	In hele regio eerste waar- neming zomergasten noteren	H Assendelft	02502-7938
<u>Broedvogeltellingen</u>				
Broedvogel Moni- toring Project BMP	mrt-jun	AW-duinen 6-7 telgebieden	H. Vader	02520-20444
		Kenn.duinen 4-5 telgebieden	P. Dhont	242599
		polders Spaarndam 3-4 telgeb.	C. Looy	02503-17045
		Haarlemmerhout 1 telgebied	M. Willems	270036
		Gebied naar eigen keuze	H. Groot	376735
Bijzondere Soorten Project BSP	mrt-jun	AW-duinen: kwartblok 24.48-1 Kenn.duinen kwartblok 24.28-4 wisselblok: kwartblok 25.23-3	zie BMP	
Fruut	apr-jun	tellen van gebied naar keuze in overleg met coördinator	J. Stuart/ F. Cottaar	270036
Blaauwe Reiger - kolonies	apr-mei	hele regio (5 kolonies); tweemaal tellen van nesten	E. v. Huijssteeden	270036
Gierzwaluw	jun-jul	doorgeven van nestlocaties of kolonies, eventueel tellen	J. Stuart/ F. Cottaar	270036
Huiszwaluwkolonies	jun-jul	hele regio - tellen van nesten	J. v. Velsen	02520-18155

Beknopte toelichting op het bovenstaande

## 4. B.M.P.

De volgende gebieden worden in 1990 in principe geïnventariseerd op broedvogels. In de A.W. Duinen: Mussenveld, 2e infiltratiegebied Noord, 2e infiltratiegebied Zuid, Eiland van Rolvers, Beukenlaan, Panneland en Rozenwaterveld. In de Kennemerduinen: Jachtduin, Lage Zeeveld, Klein Olmen, Spinnepoppenvlak en de Pan/Peperedel. In het poldergebied: Hekslootpolder, Veerpolder en de Liede.

Nieuw is de inventarisatie van de Haarlemmerhout: hiervoor zouden we graag ca 4 à 5 mensen bereid vinden te inventariseren. De meeste van de overige gebieden worden reeds geïnventariseerd door geoefende tellers, maar zowel ervaren tellers als beginners zijn zeer welkom en kunnen zich dus opgeven bij de betreffende coördinator.

## 5. B.S.P.

Voor de kwartblokken in de AW-duinen (blok 24-48-1) en de Kennemerduinen (blok 24-28-4) zijn ervaren tellers zeer welkom. Voor het wisselblok wordt aan de leden voorgesteld in 1990 te kiezen uit één van de volgende mogelijkheden:

blok 25-32-4 Haarlemmermeer-Noord;

blok 25-41-4 Haarlemmermeer omgeving Cruquius;

blok 25-22-4 Vereenigde Binnenpolder (deels).

Voor Ruigoord (blokken 25-23-1/3) is de telploeg reeds compleet.

Het gaat om het opsporen van zeldzame en schaarse vogelsoorten in een blok van 625 ha. In 1989 bleek al dat dit tot verassende resultaten kan leiden. Van de Haarlemmermeer weten we bijvoorbeeld nog weinig, maar soorten als Kluut, Kleine Plevier, Steenuil en Kwartel behoren er zeker tot de mogelijkheden!

## 6. Fuut

Reeds enige jaren worden enkele gebieden in onze regio geteld op Futen. Het zou leuk zijn als U ook een (in overleg met de coördinator te bepalen) gebied wilt tellen op het aantal broedende Futen. Met name aantrekkelijk voor beginnende vogelaars.

## 8. Gierzwaluw

Wij zouden graag een beeld willen krijgen van de ligging van Gierzwaluwkolonies. Het zou daarom al heel waardevol zijn wanneer bij U bekende nestlokaties doorgegeven worden. Als U er echt zin in heeft kunt U natuurlijk ook een kolonie gaan tellen!

## OPROEP

### Waarnemingen van Lepelaars gevraagd

Om de aantallen en het voorkomen van de Lepelaar te kunnen volgen in Nederland, vooral na de verhuizing van de kolonies in het Naardermeer en het Zwanenwater, is het belangrijk dat gegevens van in Zuid-Kennemerland waargenomen Lepelaars verzameld worden in het waarnemingenarchief. Dit kan door ingevulde waar-

nemingskaartjes op te sturen naar de contactpersoon (adres: zie waarnemingenrubriek).

Als er echter Lepelaars met kleurringen worden waargenomen, zou ik dat gaarne zo snel mogelijk willen weten.

Fred Cottaar, Marsstraat 1, 2024 GA Haarlem (023 - 276746)

## MEDEDELING

Zoals velen van u onderhand zullen weten, kan een tekebeet de oorzaak zijn van besmetting met een bepaalde bacterie (een spirocheet), die leidt tot de zogeheten tekebeetziekte (ook wel de ziekte van Lyme genoemd). Deze besmetting kan na enkele weken tot maanden gewrichtsontsteking, hersenvliesontsteking en verlammingen tot gevolg hebben.

Door goed sluitende kleding en schoeisel in het veld te dragen (een regenpak bijvoorbeeld is zeer doeltreffend) kan men tekebeten voorkomen. Mocht u onverhoopt toch een tekebeet oplopen, dan is het zaak de plaats van de beet goed in de gaten te houden. Ontstaat er na drie dagen tot drie weken een roodachtige, ringvormige, jeukende huiduitslag rond de beet, dan dient u een arts te raadplegen. Door een eenvoudige penicillinekuur kunnen de anders later optredende gewrichtsklachten, hersenvliesontsteking en verlamming gemakkelijk worden voorkomen.