

VERSLAG WAARNEMINGEN GROTE VOGELMEER DOOR  
VOGELWERK GROEP HAARLEM (KENNEMERDUINEN in 1965).

<u>Fuut</u> <u>Geoorde fuut</u> }	Helaas werden in 1965 geen broedgevallen geconstateerd; beide soorten werden zelfs niet waargenomen.
<u>Dodaars</u>	De eerste ex. werden waargenomen vanaf 3e decade maart; er waren 2 broedparen aanwezig, waarschijnlijk geen broedsels groot gekomen. Aantal blijft steeds 4, tot in 2e helft oktober vogels zijn vertrokken.
<u>Wilde eend</u>	Evenals in vorige jaren in jan-febr. slechts kleine aantallen; maart, mei slechts enkele tientallen; juni aug. max 10 ex. begin sept. 80, daarna max 15.
<u>Wintertaling</u>	Eerste ex (8) op 20 maart; 1 paartje bleef en kwam tot broeden (4 jongen gezien); aantal sept-okt. ca 30, in dec. oplopend tot 75.
<u>Smient</u>	Eén waarneming van 1 ♂ op 4 sept.
<u>Slobeend</u>	In kleine aantal sedert 2e helft maart aanwezig; 1 broedpaar; gehele voorjaar en zomer; slechts kleine aantallen max 10/15 eerst begin sept. stijging tot ca 60, okt ca 125, daarna geen waarnemingen meer gedaan.
<u>Kuifeend</u>	Vrijwel constant aanwezig in enkele tientallen; 15-20 broedparen (eind juni 100-150 jongen waargenomen).
<u>Tafeleend</u>	Van febr.-april 10-25 ex. in het meer; daarna 1 ex. 29 juni; vanaf 2e helft okt.-dec. enkele 10-tallen, met als max. 40-50 ex.
<u>Bergeend</u>	Eerste (2) ex. al op 8 febr.; daarna tot in sept. steeds aanwezig (normaal max. 10, begin juni echter 20); daarna nog 3 ex. in 3 decade okt en 1 op 5 dec. Dit jaar werden vrij veel jongen in het meer waargenomen.
<u>Buizerd</u>	1 ex. waargenomen op 5 sept.
<u>Boomvalk</u>	1 ex. op 15 juli.
<u>Slechtvalk</u>	1 ex. op 5 sept. (ook boven Spartelmeer).
<u>Torenvalk</u>	1 ex op 4 juli.

<u>Waterhoen</u>	Was terug in 2e helft mrt.; steeds 5-6 broedparen aanwezig; eerste pulli op 23 mei; een aantal van 8 blijft in het meer tot dec.
<u>Meerkoet</u>	Gehele jaar door aanwezig; in de broedtijd 6-8 broedparen; jan. mrt. max 25, aug.-okt. max 50, nov. dec. minder in aantal (dec. 10)
<u>Scholekster</u>	Eerste ex. (18) terug op 29 mrt; 3-4 broedparen aanwezig tot begin sept. Daarna verdwenen.
<u>Kievit</u>	Eerste (2) ex. op 20 mrt.; aantal broedparen geschat op ca 12; aanwezig tot eind juli-begin aug; 7 ex. op 2 okt.
<u>Bontbekplevier</u>	1 ex. 3 april, 1 op 3 aug en 2 op 4,5 sept.
<u>Kleine plevier</u>	Vanaf 25 april tot eind juli 2 broedpaartjes aanwezig; op 23 mei waren er 6 ex.
<u>Steenloper</u>	Op 30 april 2 ex. in zomerkleed.
<u>Wulp</u>	Slechts enkele waarnemingen van 1 ex. in april en mei
<u>Grutto</u>	1 ex. op 30 april
<u>Witgatje</u>	2 ex. op 31 juli en 4 op 4 sept.
<u>Bosruiter</u>	1 ex. op 29 juni.
<u>Oeverloper</u>	Enige waarnemingen van 2e helft mei en van eind juli tot begin sept.; max. 11 (r aug).
<u>Tureluur</u>	Van 2e helft mrt. tot begin aug. geregeld een of meerdere ex. aangetroffen; daarna 1 waarneming van een ex. op 5 sept.
<u>Zwarte ruiter</u>	1 ex. op 30 april, 2 op 15 juni.
<u>Groenpootruiter</u>	Slechts enkele waarnemingen 1-2 ex. van eind mei en eind juli - begin aug.
<u>Kleine strandloper</u>	1 ex op 30 aug.
<u>Krombekstrandloper</u>	1 ex. op 3 aug.
<u>Steltkluit</u>	zeer verrassend; 2 ex. op 23 mei !
<u>Mantelmeeuw</u>	Is steeds aanwezig, maar in klein aantal; meestal max. 10 ex. eind mei enkele tientallen.
<u>Kleine mantelmeeuw</u>	In klein aantal van eind mrt. tot in aug; max. ca 10 ex.; begin sept. 40-45 ex. begin dec. ca. 30; sept. max 10
<u>Zilvermeeuw</u>	Vrijwel gehele jaar aanwezig, in wisselend aantal; max. ca 200 in juli-aug; enkele broedparen.
<u>Stormmeeuw</u>	Als voren, in tientallen ex. maxima in mrt. juni juli (van 100-150 ex.) ca 20 broedparen.

<u>Zwartkopmeeuw</u>	1-2 ex. op 23 mrt, 3 april; dan 1 ex. op 22 mei; kwam helaas dit jaar niet tot broeden.
<u>Kokmeeuw</u>	Van half mrt.-half aug. ca. 200 broedparen in het meer; daarvoor en daarna meestal max. enkele tientallen.
<u>Visdiefje</u>	Slechts 2 waarnemingen van 1 ex. op 31 juli en 3 aug.
<u>Houtduif</u>	Af en toe 1 of meer ex. op de oevers.
<u>Tortelduif</u>	mei tot aug. geregeld 1-2 ex.
<u>Turkse tortel</u>	1 ex. op 31 juli
<u>Koekoek</u>	1-2 ex. in mei waargenomen.
<u>Gierzwaluw</u>	Eerste ex. dateren van 22 mei; tot begin aug. veelal 10-30 ex. boven het meer aan te treffen.
<u>Veldleeuwerik</u>	1 ex. op 30 april.
<u>Boerenzwaluw</u>	Af en toe enkele ex. boven het meer van eind april tot begin juli
<u>Huiszwaluw</u>	Slechts enkele malen gezien in de 2e helft mei
<u>Oeverzwaluw</u>	1 waarneming van 1 ex. op 17 juni.
<u>Zwarte kraai</u>	Vrijwel gehele jaar door af en toe 1-3 ex. aan de oevers waargenomen
<u>Bonte kraai</u>	Van eind okt. tot febr. mrt. in klein aantal.
<u>Kauw</u>	In grotere aantallen, dan vorige soorten gehele jaar door.
<u>Ekster</u>	Slechts enkele waarnemingen; 1-2 ex. van sept. en okt.
<u>Koolmees</u>	Slechts sporadisch waargenomen.
<u>Kraanvogel</u>	45 ex. op 21 okt.
<u>Merel</u>	1 ex. op 5 dec.
<u>Tapuit</u>	1 en 4 ex. van 5 en 4 sept.
<u>Roodborsttapuit</u>	1 ex. op 4 sept.
<u>Paapje</u>	2 ex. op 3 juli, 4 op 4 sept.
<u>Gekraagde roodstaart</u>	1 op 15 mei, 1 op 4 sept.
<u>Rietzanger</u>	1 ex. op 15 mei
<u>Grasmus</u>	van mei - eind juli in klein aantal in de begroeiing rond het meer.
<u>Fitis</u>	van eind april - tot in juni idem.

<u>Bonte Vliegenvanger</u>	2 ex. op 5 sept.
<u>Kleine Vliegenvanger</u>	1 ex op 4 sept. (E. Dijkstra)
<u>Heggemus</u>	Van mrt. tot in okt. in klein aantal
<u>Graspieper</u>	In voor en najaar tijdens trek diverse malen kleine troepjes aangetrokken.
<u>Witte Kuikst a t</u>	In klein aantal (max. 10) van juni - tot in sept.
<u>Spreeuw</u>	Vrijwel gehele jaar wel aan te treffen; juni - juli grootste aantallen.
<u>Groenling</u>	Slechts 1 ex. op 5 sept.
<u>Kneu</u>	Van april tot eind juli ca 4 ex. geregeld aangetroffen.
<u>Vink</u>	3 ex. op 5 sept.
<u>Rietgors</u>	Eén paartje zeker gebroed; aanwezig van 2e helft april tot in sept. eind mei 2 paartjes aanwezig.
<u>Ringmus</u>	3 ex. op 21 okt.

Maart 1966

w.g. Akkerman,  
Vogelwerkgroep Haarlem.