

8. KENMERKEN VOOR LEEFTIJD EN GESLACHT (3).

In dit nummer vervolgen we de serie met de kenmerken van groenling, roodborst, merel en rietgors.

Van deze en alle reeds verschenen tabellen zijn losse overdrukken verkrijgbaar voor gebruik in het veld. Ze worden op verzoek gratis toegezonden.

We hopen, dat zeer veel ringers deze tabellen zullen willen testen en houden ons aanbevolen voor opmerkingen.

A.C.Perdeck.



GROENLING

KENMERK	periode waarin bruikbaar	geslacht	
		♂ : reikt prae- tisch tot aan de schacht	♀ : reikt lang niet tot aan de schacht
		leeftijd	
		le jaars	overjarig
top staartpennen	herfst	spits en gesle- ten	afgerond en gaafrandig
buitenzoom buitenste grote slagpendekveren	herfst *)	geel/groen, aan de top grijs; de grens tussen geel/groen en grijs is niet scherp.	geel/groen, aan de top grijs; de grens tussen geel/groen en grijs is scherp. -99-
schedelverbening	herfst	kenmerk is goed bruikbaar, zie inlei- ding.	

*) soms nog wel bruikbaar tot in het voorjaar.

R O O D B O R S T

KENMERK	periode waarin bruikbaar	1e jaars	overjarig
binnenkant van de bovensnavel	herfst	geheel licht-geel- achtig, geen don- kere punt	geelachtig met donkere punt.
-100-			
schedelkenmerk	herfst	kenmerk is goed bruikbaar, zie inleiding.	

M E R R E L

KENMERK	periode waarin bruikbaar	geslachten
kleur van staart	gehele jaar	♂ : zuiver zwart ♀ : donkerbruin
		leeftijd
		le jaars
kleur van buitenste kleine slagpendekveren	herfst winter	bruiner dan bin- nenste kleine slagpendekveren *)
		overjarig niet bruiner dan binnenste kleine slagpendekveren *)
kleur van de snavel		♂ le j. snavel niet geheel geel ♂ overj.: snavel geheel geel.
schedelkenmerk	herfst	kenmerk is goed bruikbaar, zie inleiding.

*) bij ♀♀ soms moeilijk vast te stellen.

R I E T G O R S

KENMERK	periode waarin bruikbaar	geslachten	
Kleur keelveren	gehele jaar	♂ zwart, aan de top stomp afgerond (schubben) *)	♀ niet of met weinig zwart, dat dan in een spits uitloopt.
nekvlek	gehele jaar	zuiver wit *)	niet zuiver wit
schedelkenmerk	herfst	leeftijd	
		kenmerk is goed bruikbaar, zie inleiding.	

*) In de herfst ook aanwezig waar dan bedekt door lichtbruine verranden