

4. KENMERKEN VOOR LEEFTIJD EN GESLACHT (4)

In dit nummer vervolgen we de serie met de kenmerken van sijs en kneu.

Van deze en alle reeds verschenen tabellen zijn losse overdrukken verkrijgbaar voor gebruik in het veld.

Ze worden op verzoek gratis toegezonden.



A.C.Perdeck

## S I J S

KENMERK	periode waarin bruikbaar	geslachten
Kleur bovenkop	gehele jaar	♂: zwarte veren met grijze toppen (zelden geheel donkergrijs) ♀: groen-grijs met bruine streepjes
uiterste top van de staartpennen		leeftijd le jaars spits en afgesletten
kleur van één of meer buitenste kleine slagpendekveren	herfst*)	overjarig afgerond en gaaf-randig niet anders gekleurd dan de binnenste: zoom smaller en vuilwit of fletsgeel, vlag zelf lichter bruin niet anders gekleurd dan de binnenste: alle zomen breed en helder geelgroen; vlaggen bijna zwart.
schedelverbening	herfst	kenmerk is goed bruikbaar, vgl. Inleiding

\*) Omdat de rui, waarop dit kenmerk berust, in de herfst voortschrijdt kan men soms le jaars aantreffen, die de kenmerken van een overjarige vertonen; de schedelverbening is dan het enige houvast. Wanneer U dus op grond van het verenkleed besluit dat de vogel overjarig is, moet U dit met het schedelkenmerk trachten te bevestigen.

K N E U

KENMERK	periode waarin bruikbaar	geslachten	
borstveren	gehele jaar	<p>♂: rood (zelden bruin); kleurvlak stomp af- gerond ("schubben")</p> 	<p>♀: niet of nauwe- lijks rood, met donkere midden- vlak die pun- tig uittloopt.</p> 

Leeftijdsbepaling is moeilijk. De kneu ruit vroeg, zodat het staartslif-  
tage kenmerk en kleurverschillen in de kleine slagpendekveren spoedig ver-  
dwijnen. Het schedelkenmerk levert moeilijkheden op, omdat de huid meestal  
niet doorzichtig genoeg is.  
(vgl. Inleiding)