

4. JAAROVERZICHT 1971 Landgoed "DE HOORT" Budel.

De maanden januari-februari kenmerken zich gewoonlijk door weinig activiteit. Uitgezonderd enkele wintergasten: 5 zwanen, visarend en een ♂ blauwe kiekendief was er weinig te beleven. Half februari waren de eerste wulpen weer op ons terrein voor het nieuwe broedseizoen.

14 Maart begroetten ons 2 grutto's hoog in de lucht met hun bekende roep. Op 28 maart was er activiteit van kemphaantjes 66 ♀♀ en 11 ♂♂ waar te nemen, wat na enkele dagen tot ± 200 opliep. Die dag observeerden wij ook de eerste tureluurs, 4 scholeksters, 2 stormmeeuwen, 4 koppels futen en de bij ons zeldzame rosse franjepoot. Op 2 april scheerden de eerste boerenzwaluwen over de peel om de nog schaarse insecten te bemachtigen.

2 Blauwe kiekendieven (♂+♀) zweefden boven ons gebied als doortrekkers want die hebben bij ons niet gebroed. Wel het koppel blauwe kiekendieven dat laag over het rietveld zweefde op zoek naar voedsel. Eind april was er aardig wat gezang te horen van rietzanger, snor, kleine karekiet, blauwborst, grasmus, de eerste gierzwaluwen, koekoek, zwarte stern en 1 koppel grauwe kiekendieven.

Op 2 mei ringden wij de eerste jonge kieviten, op 3 mei de eerste wulpen en op 5 mei werden de eerste jonge grutto's geringd. We vonden ook 2 nesten van torenvalken, waarvan het eerste jong uitkwam op 22 mei.

Onze kokmeeuwen-kolonie is indrukwekkend, ca 7000 paren, waarvan wij de eerste jongen ringden op 10 mei. In die kolonie broedden ook 3 koppels stormmeeuwen, waarvan wij op 3 juni het eerste jong ringden. 3 Koppels kleine plevieren en 4 koppels visdiefjes broedden eveneens bij ons. De 2 koppels kiekendieven die bij ons broedden hebben wij steeds goed geobserveerd en hun nesten voorzichtig gezocht.

Op 4 juni kwam het eerste bruine kiekendiefje uit het ei en met tussenpozen van enkele dagen waren ze alle vier uit en zo verging het eveneens met de grauwe kiekendief.

Na dagen van aanhoudende regen waren wij genoodzaakt konijntjes te schieten en die goed zichtbaar voor de oude vogels in de nabijheid van het nest te leggen. Die werden door de ♀♀ gretig geaccepteerd en onmiddellijk aan de jonge vogels gevoederd. Zodoende werden deze door ons toedoen waarschijnlijk van de dood gered. Het is wel ten eerste aan te raden dit zo voorzichtig mogelijk te doen en alle roofvogels zoveel mogelijk met rust te laten.

Op 29 juli gingen wij met ons roeiboortje naar het eilandje in de peel, waar wij al enkele dagen een paartje wouwaapjes bedrijvig heen en weer zagen vliegen en vonden hun nest met 8 jongen. 1 Augustus vonden wij nog 2 jonge nachtzwaluwen daar de oude vogel vlak voor ons weg vloog.

Hier volgen de voornaamste geringde vogels.

Klapekster	2 volgr.	Kokmeeuw	1298 pulli
Grutto	95 pulli	Tureluur	7 pulli
Wulp	50 pulli	Zwarte Stern	7 pulli
Stormmeeuw	7 pulli	Kleine Plevier	7 pulli
Wouwaapje	8 pulli	Fuut	2 pulli
Bruine Kiekendief	4 pulli	Nachtzwaluw	2 pulli
Grauwe Kiekendief	4 pulli	Groene Specht	1 volgr.
Grote Bonte Specht	1 volgr.	Kleine Bonte Specht	1 volgr.
Scholekster	1 pull.	Visdiefje	7 pulli
Ransuil	11 pulli	Torenvalk	9 pulli

L.Theuwis en G.A.Beyk