

8. KOKMEEUW EXPERIMENT 1968.

In 1968 werden er 4095 kokmeeuw pulli aan het loopbeen geringd en 4107 boven het loopbeen. Het doel hiervan was om na te gaan of de manier van ringen invloed heeft op de terugmeldingskansen.

De resultaten zijn:

teruggemeld t/m 31 dec.1971 : geringd boven het loopbeen 68 = 1,7%
 geringd aan het loopbeen 89 = 2,2%

Gegroepeerd in jaarklassen zijn de terugmeldingen als volgt verdeeld:

(jaarklasse 0 = ouderdom : 0 - 1 jaar)
 (" 1 = " : 1 - 2 jaar)

jaarklasse	aantal terugmeldingen op 31-12-1971					
0	Boven loopbeen	45	Aan loopbeen	65		
1	" "	13	" "	11		
2	" "	8	" "	7		
3	" "	2	" "	5		

Het is merkwaardig, dat er vooral in het eerste jaar veel meer meldingen zijn van vogels, die AAN het loopbeen zijn geringd. Dit zou kunnen wijzen op een vrij groot verlies aan ringen, die aan het loopbeen zaten. Dit verlies zou dan vooral in het eerste jaar optreden.

Misschien kunnen we in 1973 starten met een onderzoek hiernaar.

B.J.Speek.