

5. HET VANGEN MET GELUID

Hier laten we weer de reacties volgen van enkele ringers die met geluid geëxperimenteerd hebben.

A. Smit schrijft ons:

- Groenling: Alhoewel ik in een "groenlingenbuurt" woon had ik slechts éénmaal succes, d.w.z. dat een nieuwsgierige groenling tot bij de recorder kwam.
- Goudvink: Bij de legerplaats Nunspeet meerdere malen geprobeerd (daar zitten vrij veel Goudvinken), met negatief resultaat.
- Goudhaantje: Dit bandje gaf meer resultaat. Hierop leken ook Zwarte Mezen en Pimpels af te komen (er zitten Zwarte Mezen tussen door te zingen).
- Vuurgoudhaantje: Bij mijn bandje is dit het tweede gedeelte, d.w.z. één bandje van 45 minuten geeft in het eerste gedeelte Goudhaan (ca. 20 min.) en het tweede Vuurgoudhaan. Ik bleek er een Vuurgoudhaantje mee aangetrokken te hebben en ook gevangen. Het lijkt meer pogingen waard te zijn.
- Sijs: In mijn tuin zat een sijs die niet reageerde. Op Hoophuizen zat een troep die ook niet reageerde.

Is het niet mogelijk bij de vinkenbanen de bandjes gevuld te krijgen? Een voorbeeld: Vinken die op de grond zitten "pinken" met een hard, scherp geluid waarop overvliegende Vinken onmiddellijk reageren en naar beneden duiken. Het lijkt mij dat

dit soort geluiden (roeper.) beter is dan zang.
 Er kan nog een tweede element in de bestaande bandjes voorkomen. Het kan n.l. best zijn dat er tussen de zanggeluiden, vooral bij die waarop meerdere vogels te horen zijn, "verjaag", "angst" of "schrik"-geluidjes zitten. Zoals gezegd, het bevindt zich allemaal nog in een experimenteel stadium.

J. v.d. Straaten meldt:

In het algemeen kan men stellen dat succes waarschijnlijk is, als het een goede trek morgen is, als de desbetreffende soort goed op trek is en als het vroeg op de dag is. De beste methode is de speaker onder het net te zetten en steeds achter elkaar de in die periode doortrekkende vogels te laten horen. Per soort minstens 5 - 10 min. geluid.

In ieder geval reageren in de trektijd hierop:

alle Mezen;	Gekraagde Roodstaart;
Goudhaantje;	Braamsluiper;
Vuurgoudhaantje;	Zwartkop;
Merel;	Fitis (zeer goed) en
Zanglijster;	Tjiftjaf.

Bij deze soorten kon worden vastgesteld, dat ze op het geluid van de band afkwamen. Het verzetten van de speaker gaf relatief hogere vangsten in de netten waarheen de speaker werd getransporteerd.

Mijns inziens kan men niet stellen, dat bepaalde minder algemene soorten niet of nauwelijks reageren. Dit is nauwelijks vast te stellen, juist omdat deze soorten niet zo veel voorkomen.

Een Belgische ringer, de heer M. Steensels, vindt dat hij vooral succes heeft met zelf opgenomen natuuroopnamen.

Met overname van grammofoonplaten boekte hij géén succes bij: Koekoek - Wielewaal - Porseleinhoen - Waterral - Bosuil - Kerkuil - Watersnip - Draaihals - Grote Bonte Specht en Groene Specht.

Hij merkt verder op, dat de ♂♂ van zeer veel soorten in hun broedterritorium gevangen kunnen worden, maar dat deze vogels buiten de broedtijd niet reageren. In drie jaar tijd ving hij 150 Kleine Karekieten en 250 Bosrietzangers. De meeste eigen opnamen maakt hij 's nachts of in de heel vroege ochtenduren. Ook hij komt tot de conclusie, dat men voor de vangst van 1 exemplaar in een territorium geen versterker nodig heeft.