

5. GEVERFDE WADVOGELS UIT AFRIKA

De heer R.W. Summer van het Percy Fitzpatrick Institute of African Ornithology van de Universiteit van Kaapstad schrijft ons:

Vergeleken met noord-west Europa staat in Afrika de studie van wadvogels nog in de kinderschoenen.

Dit komt gedeeltelijk doordat er weinig wadvogel-liefhebbers zijn en ze bovendien nog ver van elkaar wonen. De meesten wonen in Kenia en in zuid Afrika.

Wadvogels zijn bovendien kleine vogels, die geen hoog percentage terugmeldingen opleveren. Het is tekenend, dat de meeste terugmeldingen komen van andere ringers. Al met al, het aantal terugmeldingen van wadvogels, die in Afrika zijn geringd, is heel klein.

We weten daarom weinig van de trekwegen door Afrika en tussen de Afrikaanse en de palaearctische gebieden.

In een poging om onze kennis van de trek van wadvogels te vermeerderen zijn er grote aantallen KANOETSTRANDLOPERS, DRIETEENSTRANDLOPERS en KROMBEK-STRANDLOPERS geveerd in de Kaapprovincie vóór ze vertrekken naar hun noordelijke broedgebieden.

We roepen alle vogelaars op om gedurende de voorjaars- en de najaars-trek in 1976 naar deze geveerde vogels uit te kijken.

Als u zo'n geveerde vogel ziet, vooral in de vlucht is de verfkleur goed te zien, meldt dan zoveel mogelijk gegevens aan:

A.J. Prater
B.T.O.
Beech Grove
Tring
Engeland

of

Dr. R.W. Summers
Percy Fitzpatrick Institute
University
Cape Town
Zuid Afrika

Let er vooral goed op welke kleur de verf heeft en waar die kleur op de vogel is aangebracht.

De schaarse terugmeldingen doen veronderstellen dat de trekwegen van deze drie soorten ergens tussen west Europa en centraal Azië doorlopen.

Indien u dus in april-mei of in juli-oktober een plaats weet waar deze soorten op de trek pleisteren wees dan waakzaam.