

7. INTERESSANTE TERUGMELDINGEN

Correctie:

De in O.H.V. 27 van juli 1976 vermelde

ROEK

Moskwa E 825.104

is ons later opnieuw doorgegeven als

KOKMEEUW

Moskwa E 825.104 30-05-1975 geringd als nestj bij RESEKNE, Letland, USSR,
56.31 N 27.19 E

00-9/10-75 gevonden als jonge kapmeeuw ergens in Noord Brabant. Gemeld via preparateur.

Z6 is deze terugmelding veel beter "In te passen" in het beeld van de verspreiding van de Kokmeeuw en de Roek.

KEMPHAAN

Oslo JA 01.373 12-08-1977 ♀ volgr, geringd in NESSEBY, Finnmark, Noorwegen
70.09 N 28.52 E.

05-08-1978 dood, gevonden op strand tussen EGMOND en BERGEN, N.H., 52.38 N 04.37 E. Melding:"steltloper".

Dit is de noordelijkst geringde Kemphaan van de buiten Nederland geringde exemplaren. Dit dier werd geringd aan de kust van N.O.-Noorwegen, waarschijnlijk al op de najaars-trek.

Arnhem 2.039.007 14-08-1970 als ♂ volgr geringd in het OOSTZANERVELD, N.H.,
52.26 N 04.53 E, door C.Eijerman.

03-06-1972 geschoten bij CHERSKIY, in het Oosten van de Yakoetische deelrepubliek, USSR, 68.51 N 161.22E

Dit is de meest noordelijk gevonden, in Nederland geringde Kemphaan. (Veel noordelijker wonen trouwens amper meer melders van geringde vogels!).

Maar veel boeiender is de enorme afstand tussen ring- en vindplaats, die deze vogel op zijn minst moet hebben afgelegd. Dat moet 8500 kilometer geweest zijn.

(Tot en met 4-4-1973 zijn 3 "Helgoland"-Kemphanen uit hetzelfde Yakoetië gemeld, waarvan één op, 154.05 E).

Er zijn verschillende andere vondsten van in Nederland geringde Kemphanen langs de kust van Europees Rusland en van Fenno-Scandinavië.

Deze vogel werd wel erg ver oostelijk in Centraal Siberië bemachtigd, er ligt nog slechts één deel-republiek tussen de Yakoetische ASSR en de Beringstraat!

- Arnhem 1.141.188 28-08-1978 als ♂ 1kj op SL(aapplaats) geringd door J.van der Geld in het WORMER- en JISPERVELD, N.H., 52.31 N 04.51 E.
- 12-09-1978 geschoten door een melder, die 'meestal Amerikaanse trekvogels schiet', bij LE LAMENTIN, Martinique Kleine Antillen, 14.37 N 61.01 W.

Het belangrijkste overwinteringsgebied van de Kempphaan ligt in Afrika, het stroomgebied van de Senegal en de Niger. Ook in de Republiek van Zuid-Afrika zijn overwinterende Kempphanen gesignaleerd. Volgens Voous (Atlas der Europese Vogels) beslaat het broedgebied van de Kempphaan geheel noordelijk Eurazië in een strook van de kust tot diep in het binnenland. Veel van de vogels uit dat enorme areaal trekken in nazomer en herfst door ons land, zoals blijkt uit de terugmeldingen. Glutz von Blotzheim vermeldt in het Handbuch der Vögel Mittel-Europas, dat de Kempphaan als dwaalgast of spaarzame gast ook op de Kleine Antillen is aangetroffen, evenals trouwens op de Canarische Eilanden en op de Azoren. Ook deze vogel zal van westelijk Afrika naar oostelijk Amerika afgedreven zijn. Het is de eerste hier geringde Kempphaan, die van het Westelijk Halfrond is teruggemeld! Bovendien heeft deze vogel in maximaal 16 etmalen een 7.000 km (440 km per etmaal) gevlogen.

Ondanks al deze spectaculaire bijzonderheden, dienen we niet uit het oog te verliezen, dat in Nederland geringde Kempphanen gewoonlijk op voor- of najaarstrek in Frankrijk en Italië de mens in handen vallen en dat bovengenoemde vindplaatsen een uitzondering zijn, tenminste tot zover onze gegevens reiken.

ZWARTKOP

- Arnhem S 877.870 08-10-1977 geringd door D.A.Jonkers bij de JAN-WILLEMSKOOI, Terschelling, 53.24 N 05.25 E, als ♂ 1 kj.
- 07-11-1977 gekontroleerd bij TARIFA, Cadiz, Spanje, 36.01 N 05.36 W als ♂ volgr.

Dit is de 13e Zwartkop van het Iberisch Schiereiland.

REGENWULP

- Arnhem 3.218.350 25-04-1977 geringd als - na 1 kj bij HILVARENBEEK, N.B., 51.29 N 05.08 E, door B.v.Dooren (en Zn verm.)
- 31-07-1977 geschoten bij MARAIS du FORT VERT, Pas de Calais, Frankrijk, 50.58 N 01.56 E, als Courlis corlieu.

Dit is de 5e terugmelding ;tot en met 1977 zijn 142 geringd.