

## 5. NA 11 JAAR TERUGGEVANGEN

In de nacht van 24 op 25 september j.l. vingen wij op Schiermonnikoog een Bonte Strandloper met een erg versleten ring aan het loopbeen. Met enige moeite kon worden vastgesteld dat het een Nederlandse ring was, nr. B 115.151. De oude ring werd verwijderd en een nieuwe aangelegd boven het loopbeen: H 155.628. Van de gevangen vogel werden gewicht en snavellengte bepaald. De langste pennen van de vleugel waren zo erg gesleten, dat het nemen van de vleugelmaat geen zin had. De Bonte Strandloper had rui in hand, arm en staartpennen en de overgang van het adulte zomerkleed naar het winterkleed was halverwege gevorderd. Deze vogel bleek 11 jaar geleden ook door ons op Schiermonnikoog te zijn gevangen in de nacht van 31 augustus op 1 september 1968. Hij is toen geringd met 89 andere Bonte Strandlopers en hij is de eerste die ooit van deze groep is teruggevangen door ons.

Enkele jaren later zijn wij er toe overgegaan om Steltlopers boven het loopbeen te ringen, want dan slijten de ringen veel minder. Deze terugvangst demonstreert dat slijtage van aluminium ringen, wanneer aangebracht aan het loopbeen, aanzienlijk is. Dat komt omdat de ring voortdurend in contact is met zand etc. Het kan best zijn dat wij, zeker over enkele jaren, grote kans lopen om vogels, die in 1968 en 1969 door ons geringd waren, bij terugvangst niet meer als terugvangst te herkennen, omdat de ring van hun poten is afgesleten.

Bonte Strandlopers hebben een erg vaste reisroute tijdens de najaarstrek. Wij vangen er veel terug, die in vorige jaren ook op Schier zijn aangetroffen. De Bonte Strandloper, waar het hier om gaat heeft het eiland misschien wel 12 jaar of vaker bezocht. In 1968 was hij reeds overjarig. Ook toen was hij in handpenrui. De snavellengte werd toen bepaald op 34 mm en het gewicht in 1968 op 49 g. en in 1979 op 54 g. Dit verschil kan te danken zijn aan het feit dat in dit jaar de vogel later in het seizoen is gevangen.

De vogel kan afkomstig zijn uit Scandinavië, Noord Rusland of zelfs Noord Siberië.

Uit onze ringvondsten kunnen wij afleiden dat een groot deel van de Bonte Strandlopers, die Schiermonnikoog tijdens de najaars-trek bezoeken uit N.O. richting komt.

Dr. E. Nieboer  
Biol.Laboratorium VU  
Postbus 7161  
Amsterdam

