

8. INTERESSANTE TERUGMELDING

KOKMEEUW

- Arnhem 3.105.378 20-06-1967 geringd als pull (ring Aan Loopbeen) in het NOLDERVELD bij Nolde (Drente) 52.38 N 0.623 E door L. Blaauw.
- 22-08-1985 dood gevonden te SANDY POINT bij West Haven (Connecticut) Verenigde Staten 41.10 N 72.50 W gemeld als Kokmeeuw, foto van ring ingezonden, "carcass" naar "freezer Peabody Museum".

Dit is de eerste nederlandse Kokmeeuw uit de V.S.!

Tot nu toe werden ruim 200.000 exemplaren geringd, waardoor meer dan 10.000 terugmeldingen werden verkregen. Van de 8.138 nederlandse pulli werden tot heden teruggemeld uit ons land 5.303 stuks, uit Frankrijk/Spanje/Portugal 1.158 dieren en uit Groot Brittannië 898 exemplaren. Andere landen zijn (soms veel) minder sterk vertegenwoordigd. Zo "ontving" Ierland slechts 32 geringde individuen en viel een vogel op de Atlantische Oceaan rond 11.00 W de mens opnieuw in handen. Overigens scharen de V.S. zich met deze melding bij de groep landen gevormd door Finland, Guinea, Joego-Slavië en Mauretanië, die allen met slechts één melding genoteerd staan. Nemen we de europese Sovjetunie, de Kanaaleilanden, Polen, Zweden en Zwitserland met alle niet meer dan vijf meldingen er even bij, dan sluit zich bijna een cirkel om Nederland als het herkomstgebied van de in alle richtingen uitzwermende nestjongen. Wat betreft de afgelegde afstand spreekt het haast vanzelf dat deze vogel het het verst geschopt heeft. Na de 6117 kilometer van dit dier, noteren we tussen 2511 en 4859 kilometer maar tien individuen.

En dan over verstreken tijd: langer dan de 6.638 dagen van Kokmeeuw 3.105.378 droegen alleen een kleine twintig anderen hun ring. Overigens valt hierbij nog op te merken dat de vogel slechts als "dood gevonden" werd gerapporteerd en dat het dus niet bekend is hoe lang het lijk voor de vondst heeft gelegen. Het spreekt voor zich dat het Aan - in plaats van het Boven Loopbeen ringen zeker invloed op de slijtage van de ring heeft gehad. De foto toont een sterk versleten dus dunne ring met grote happen eruit. Adres en ringnummer zijn danig aangetast. Maar gelukkig wist de vinder van wanten en de collegae van de US Fish & Wildlife Service evenzeer.

Voor de goede orde: het BL ringen, mits zorgvuldig op Uw ringlijsten aangegeven, heeft onze voorkeur bij steltlopers en meeuwen!

Interessant tenslotte, is zeker ook het gegeven dat van een zich nog steeds uitbreidende soort een beslist europees individu de V.S. heeft bereikt.

(Omgekeerd kennen we de Zilvermeeuw als van origine nearctisch en denkt U nog even aan de Amerikaanse Grote Stern uit een eerder O.H.V.). Kokmeeuwen werden voor het eerst in 1911 op IJsland als broedvogel vastgesteld en daar geringde dieren trokken ook naar het westen. In de V.S. wordt al door Kokmeeuwen gebroed. Wie weet of "onze" Kokmeeuw dat eventueel ook niet al vele seizoenen lang heeft gedaan en beter "hun" vogel zou kunnen worden genoemd.

Kortom: een boeiende melding van een "gewone" soort.