


5. BONTE STRANDLOPERS MET LICHTE KOPPEN

Uit een brief van Dr. E. Nieboer aan de steltloper-vangers in het Wadden- en Deltagebied haalden we het onderstaande, dat, naar we veronderstellen, ook interessant is voor andere ringers:

----"Verder wil ik er op attenderen, dat in het voorjaar Bonte Strandlopers met zeer lichte koppen kunnen worden aangetroffen. Deze zouden tot de noordoost Siberische broedpopulatie kunnen behoren, of in ieder geval hun broedgebied ver oostelijk in Siberië kunnen hebben. Het betreft vogels in zomerkleed en het zijn vooral de mannetjes, die zulke lichte koppen hebben. In de vangsten van, met name, het tweede deel van mei zijn ze tot nu toe aangetroffen.

Hieronder staan de afbeeldingen:



P.S. van het VT:

.....en nu niet direkt bij de vangst van een "witkop" noteren dat het "dus" een mannetje is en dat hij "dus" behoort tot de ondersoort Calidris alpina....., maar het is gewoon interessant om bij het zien door de verrekijker, of bij het hebben in de hand van zo'n "witkop" te mogen veronderstellen, dat die wel eens heel ver oostelijk in Siberië zou kunnen broeden.