

## TERUGMELDINGEN

ingezonden door betreffende ringers/melders of opgemerkt door RC-personeel, mede van commentaar voorzien door Jan van Diermen

### Buidelmezen en ooievaars *Remiz pendulinus* & *Ciconia ciconia*

In maart 1996 kreeg de Ringcentrale een paar opmerkelijke meldingen binnen van vogels, die in Frankrijk zijn gecontroleerd of gevonden. Het meest opvallend waren de vangsten van geringde buidelmezen en waarnemingen aan geringde ooievaars. De buidelmezen zijn allemaal door Franse ringers gecontroleerd aan de noordkant van de monding van de Gironde (45°.30'NB 00°.58'OL), ca 60 km benoorden Bordeaux. Het betreft de noordelijkste overwinteringsplaats aan de Atlantische kust, waar tevens gebroed wordt. Buidelmezen leven in de winter o.a. van rietzaad en wilgeknoopen. Ze trekken in september-oktober uit de gematigde streken naar het Mediterrane gebied. Hieronder volgen de details:

ringgegeven	ringdatum	vangdatum
F 487392 <i>na</i> lkj Rohel (De Jong)	17-06-94	28-10-94
F 550489 <i>lkj</i> Lelystad (Breek)	24-06-94	29-10-94
F 373519 <i>na</i> lkj Lelystad (Breek)	27-06-92	27-10-94
F 562046 <i>lkj</i> Elburg (vd Brink)	09-07-94	01-11-94
F 557917 <i>lkj</i> Zwarte Meer (Nap)	22-07-94	30-10-94
F 401120 <i>lkj</i> Zwarte Meer (De Roder)	27-07-94	28-10-94
F 722853 <i>lkj</i> Piaam (VRS Menork)	04-08-95	05-11-95
F 623783 <i>lkj</i> Zwarte Meer (Nap)	08-08-94	30-10-94
F 624127 <i>lkj</i> Zwarte Meer (Nap)	30-08-94	28-10-94
F 624135 <i>lkj</i> Zwarte Meer (Nap)	30-08-94	01-11-94
F 738777 <i>lkj</i> Zwarte Meer (Nap)	14-09-95	22-10-94

We kregen 31 meldingen binnen van ooievaars, waarvan er 12 gedood waren door hoogspanningskabels. Een melder schreef dat hij bij Pau (43°.19'NB 00°.25'WL), vlak bij de Pyreneeën, een groep van 60 ooievaars had gezien, waarvan 27 met een ring. Een in 1991 te Graafland (ZH) geboren ooievaar (geringd 240691 : *pullus* door A. Enters) zocht en vond zijn heil deze winter in Vichte (West-Vlaanderen, België) op 158 van zijn geboorteplaats. Het is niet bekend of en waar de vogel heeft gebroed/vertoefd.

**scholekster *Haematopus ostralegus***

[NLA 5171.141] geringd op 280682 : *pullus* te Roodkerk Fr. (53°.16'NB 05°54'OL) door J. A. de Vries. Gemeld op 300196 als vers dood te Den Helder marinehaven als koude-slachtoffer. Dertien-en-een-half jaar verstreken waarin de vierde echt koude winter kennelijk teveel van de vogel vergde.

**scholekster *Haematopus ostralegus***

[NLA 5255.270] geringd op 260689 : *pullus* te Roodkerk Fr. (53°.16'NB 05°54'OL) door J. A. de Vries. Geschoten op 030296 te Baie de Canche, Pas de Calais Frankrijk (50°.31'NB 01°39'OL) op 422 km ZW na 6½ jaar. Hoewel zuidelijker overwinterend, toch de dood niet ontkomen.

**scholekster *Haematopus ostralegus***

[BRUXELLES L.35910] geringd op 011182 : *1kj* te Nieuwpoort, West-Vlaanderen, België (51°.08'NB 02°45'OL). Na 12½ jaar gemeld als broedvogel op een dak te Roodkerk (Herberge de Trochreed) (53°.16'NB 05°54'OL) door J.A. de Vries op 150695.

**griël *Burhinus oedicnemus***

[GBT EH87662] geringd op 010680 : *pullus* te Norfolk Engeland (locatie geheim). Gevonden op het strand bij Wijk-aan-Zee NH (52°.30'NB 04°35'OL) op 100595 op 265 ten oosten van zijn geboorteplaats. Natuurlijk weet niemand hoe de vogel daar terecht is gekomen, maar het beest heeft wellicht een ongelukkige oversteek gemaakt naar het geboorteland. Vinder is de Heer M. Lindeman.

**kievit *Vanellus vanellus***

[NLA 1089.206] geringd op 260571 : *pullus* te Ureterp Fr. (53°.06'NB 06°10'OL) door J. de Jong. Geschoten op 150977, gedetermineerd als ♂ te Kabansky Buryat (Buryat-Mongol) Aziatisch Rusland (52°.00'NB 106°38'OL). De vogel bevond zich 6.790 km oostelijk van zijn geboorteplaats. Helaas is zijn broedplaats niet bekend.

**kokmeeuw *Larus ridibundus***

[BOLOGNA TA..0345] geringd op 100894 : *volgroeid* te Porto Maghera, Venetië, Italië (45°.28'NB 12°14'OL). Gemeld (aflezing) op 020295 te Zwolle (IJsselhal) Overijssel (52°.31'NB 06°05'OL) als na 2kj vogel op 902 km van ringplaats. Mogelijk een Italiaanse vogel die in het najaar naar de Atlantische kust is getrokken en daar heeft overwinterd.

**geelpootmeeuw *Larus cachinnans***

Onderstaande Geelpootmeeuw is van veel oostelijker origine dan het Joegoslavische exemplaar dat in OHV76 wordt genoemd.

[MOSKWA C-653538] geringd op 250591 : pullus, geringd aan de noordkust van de Zee van Azow, Podkova eiland, provincie Zaporozh'ye in Ukraine (46°38'NB 05°38'OL). Ringnummer afgelezen met telescoop op 111291, herkend als 1kj "zilvermeeuw" op de vuilstort te Geldermalsen (51°.52'NB 05°20'OL) door J.M. van Muiswinkel. Afstand 2.245 km.

Tussen de zilvermeeuw-achtigen op de vuilstort zitten wel vaker verre buitenlanders (met ringen van stations Stavanger, Helsinki, Estonia). Sommige van deze vogels werden in opeenvolgende winters gezien, zoals een adult exemplaar van ondersoort *omissus* (met vale gelige poten, lang niet zo geel als die van *cachinnans*) op 210292 en 081092 (Helsinki HT-086907). Waar en of deze vogel in 1992 gebroed heeft is niet bekend.

**grote stern *Sterna sandvicensis***

[NLA 1200.457] geringd op 200686 : pullus te Markenje ZH (51°.48'NB 03°57'OL) door J. Beijersbergen. Na ruim 9 jaar op 111295 dood gevonden aan de Namibische kust, 6 km N van Swakopmund (22°.37'ZB 14°31'OL).

**boerenzwaluw *Hirundo rustica***

[NLA F.493.516] geringd op 010794 : pullus te Johannes Kerkhovenpolder Gron. (AmCo 267 589) door L. Tervelde. Gevonden op 060995 te Fredriksoord Fr. (AmCo 208 539), op 77 km van geboorteplaats, richting ZW, mogelijk na zijn eerste broedseizoen. De ring werd ontdekt aan een oorbelring, gedragen door een Fries meisje als gelukbrengend sieraad en gemeld via J. de Jong te Joure. Hopelijk is dit geen nieuwe trend.