

TERUGMELDINGEN

ingezonden door betreffende ringers/melders of opgemerkt door RC-personeel, mede van achtergrondinformatie en commentaar voorzien door Gerrit Speek, Jan van Diermen en Bennie van den Brink.

middelste zaagbek *Mergus serrator*

[STOCKHOLM 9.134.942] geringd als ♀ *na 1kj* te Utklippan, Blekinge, Zweden (55°57' NB, 15°42' OL) op 28 mei 1993. Gevonden op 29 juni 1996, reeds langer dood, aangespoeld (door water verplaatst) te Oude Bildtzijs (buitendijks, Friesland) door Jacob Westerhuis. Afstand 706 km WZW.

Dit is de derde middelste zaagbek uit Zweden. Totaal zijn nu 19 in het buitenland geringde middelste zaagbekken in Nederland gemeld (Oostelijk Duitsland 7, Finland 5, Zweden 3, Denemarken 2, Rusland 1, Estland 1).

scholekster *Haematopus ostralegus*

[NLA 4020.995] geringd (boven loopbeen) op 200664 als *pullus* te Lange Paal Wadkant Vlieland (Fr.)(AmCo 131 588) door K. Terpsta. Levend gemeld op 180591, 210494, 300596 en 310596 als na 3kj op dezelfde plaats door F. Majoor (ring afgelezen). Tweeëndertig jaar oud en honkvast.

Inmiddels zijn door terugmelding tien individuen ouder dan dertig jaar bekend, de oudste was ruim 36 jaar oud. Deze tien scholeksters stammen uit 1951, 1955 en de resterende acht uit de eerste helft van de jaren zestig.

kanoetstrandloper *Calidris canutus*

[NLA K.560013] geringd (boven loopbeen) op 201179 als *1kj* te Posthuiswad, Vlieland (Fr.) (AmCo 129 586) door G. C. Boere. Vers dood gevonden op 050896 te Qegertatsuag Groenland (4188 km) door Marianne & Cecilie Bjelke. De vogel werd 17 jaar oud, niet uniek, maar zeker niet alledaags.

bonte strandloper *Calidris alpina*

[NLA H.161449] geringd (boven loopbeen) op 170487 als *>2kj* te Holwerd Oost (Fr.) door K. Koopman. Gemeld 190693 in Aziatisch Rusland te Yaibari, Sabetta ZW in Tyumenië (3848 km) als *man met broedsel* door Dr. Henning Behmann (Duitsland). Vervolgens door K. Koopman teruggevangen op 020896 op ringplaats. Deze vogel bezoekt ons Waddengebied zowel in voor- als najaar, mogelijk overwintert hij hier ook of nog zuidelijker (westelijker). De vogel draagt inmiddels drie ringen: de NLA-ring, een blanco ring en een MOSKWA-ring [XC 675858].

boerenzwaluw *Hirundo rustica*

[NLA F.380728] geringd op 240692 als *pullus* (3 pulli in nest) te Oosterwolde (Gld.) door B. van den Brink. Gemeld op 050296 (gecontroleerd) op slaappleats te Boje-Ebok, Nigeria (5143 km) door een Italiaanse ringgroep (vogel niet sexbaar). Daarmee is de kous nog niet af: Bennie van den Brink controleerde de vogel al eerder in Elburg op een slaappleats in het riet (310792, dus als *1kj*), daarna als broedvogel (*man*) in 1993, 1994, 1995 en 1996 steeds in dezelfde schuur op 400 m van de boerderij waar hij geboren was. Mannetjes laten doorgaans de geringste broeddispersie en de grootste plaatstrouw zien. Alle zwaluwkennis samengebald in de waarnemingen aan één vogel.

kleine karekiet *Acrocephalus scirpaceus*

[NLA F.660980] geringd als *1kj* op 200795 te Zwarte Meer West (Ov.) (AmCo 190 514) door J. Nap (VRS Zwarte Meer). Gemeld op 190196 te Kumasi, Ghana (6°41' NB 1°37' OL) vers dood door Gabriël Asamoah (5152 km).

Buiten Nederland-België zijn 329 kleine karekieten teruggemeld. Daarvan hebben (met inbegrip van deze melding) inmiddels zes betrekking op West-Afrika: alle beneden de 20° breedtegraad en op afstanden tussen 4000 en ruim 5000 km. Het betreft de volgende landen: Ghana 2, Guinee Bissau 1, Ivoorkust 1, Senegal 1, Mauretanië 1.

buidelmees *Remiz pendulinus*

[NLA F.201951] geringd op 120790 als *1kj* te Z-Flevoland door C. M. Liebregts-Haaker. Gemeld 011290 en 240291 (gecontroleerd) te St. Seurin d'Uzet, Charente-Maritime Frankrijk (45°30'NB 00°50'WL).

[NLA F.452642] geringd op 170793 als *1kj* te Z-Flevoland door C. M. Liebregts-Haaker. Gemeld 130196 (gecontroleerd als *man* > *1kj*) te St. Seurin d'Uzet, Charente-Maritime Frankrijk (45°30'NB 00°50'WL).

In aanvulling op de kleine hausse meldingen die in het vorige overzicht werd vermeld (OHV 80), wijzen deze drie meldingen (aan twee vogels) tevens de Gironde-delta als overwinteringsgebied van bij ons (of in NW-Europa) geboren buidelmezen aan. Buidelmezen vertonen vroege dispersie. Bovenstaande *1kj* vogels die in juli in Z-Flevoland verblijven hoeven niet van lokale origine te zijn. Dit geldt zeker voor vogels van latere vangdatum (zoals een deel van de vogels uit OHV 80). Volgende melding van C. M. Liebregts-Haaker illustreert dit: buidelmees [HELGOLAND 9Z 26905] geringd als *1kj* op 260786 te Fallersleben, Braunschweig & Hildesheim (BRD), gecontroleerd te Z-Flevoland op 101086.

