

## Terugmeldingen 1998-2

Jan van Diermen m. m. v. Gerrit Speek

Geselecteerd uit de database van de Ringcentrale, of ingezonden door betreffende ringer/melder. Van achtergrondinformatie en commentaar voorzien door Jan van Diermen. Met dank aan de inzenders, aflezers, ringers en melders.

### **zilvermeeuw** *Larus argentatus*

[NLA 5.159.597] geringd op 12 juli 1980 als *pullus* te Schiermonnikoog (Fr) (AmCo 209611) door J. de Vries (als één van "De 1000 zilvers van Schier" uit diens gelijknamige boek). Gemeld uit een heel andere hoek van het land door J. Buijs, een goede vriend van de ringer: afgelezen op 8 december 1997 te Bergen Op Zoom (NBr), regionale stortplaats Kragge 2 (AmCo 082391), op 252 km van de geboorteplaats. In ruim 17 jaar niet eerder gemeld.

### **havik** *Accipiter gentilis*

[NLA 7.015.214] geringd als ♀ *1kj* door G. Gerritsen op 21 okt. 1987 te Wapenveld (Gld) (AmCo 202493). Gemeld op 23 sep. 1997 (tien jaar later) te Nieuwleusen (Ov) (AmCo 211511) op 19 km NNO van de ringplaats. De vogel werd door een boer met bebloede handen naar het asiel gebracht, nadat ze door een ruit was gevlogen om een kip of duif te bemachtigen. Ze had een lichte verwonding aan de kop en is na 1 dag observatie weer losgelaten.

### **slechtvalk** *Falco peregrinus*

Dankzij de Werkgroep Slechtvalk Nederland (de meldingen staan op naam van Peter van Geneijgen) weten we van twee slechtvalken die in 1995-96 gemeld zijn wat hun herkomst is. Het betreft een al oude vogel uit een West-Duits opfokprogramma (\*1988) en een jonge wilde vogel uit Zweden (\*1995):

[RADOLFZELL JC.11.707] geringd als ♀ *1kj* op 30 mei 1988 te Bamberg, Oberfranken Duitsland (49°54' NB 10°54' OL). Gemeld in de winters en zomers van 1995 en 1996 te Maasbracht (L). De vogel broedt hier zeker sinds 1992, mogelijk al vanaf 1990.

[STOCKHOLM 90.A13.328] geringd als ♂ *pullus* in een nest met 4 jongen op 19 mei 1995 te Varberg, Oostelijk Halland, Zweden (57°06' NB 12°30' OL). Gemeld te Harculo (Ov) (AmCo 204498), met een uitstapje naar Zwolle op 657-654 km van de geboorteplaats als overwintenaar en overzomeraar. Slechtvalken van Scandinavische

origine zullen - ook al overzomeren ze als jongere vogel - vermoedelijk niet tot broeden komen in Nederland (P. van Geneijgen (1998): "Nestkasten voor Slechtvalken *Falco peregrinus* in hoogspanningsmasten vooralsnog niet zinvol". *De Takkeling* 6 (1): 89-92).

**grutto** *Limosa limosa*

[NLA 3.336.643] geringd als *pullus* op 7 juni 1987 te Tjalleberd Fr. (AmCo 192556) door P. Blanksma. Gemeld op 5 mei 1996 te Kolane, Senegal NW-Afrika (12°32'NB 15°45'WL). De vogel werd ter bescherming van de oogst geschoten op 4901 km van de geboorteplek. Een relatief oude grutto, maar geen record (staat op  $\geq 17$  jaar).

**zwarte mees** *Parus ater*

In de herfst van 1997 trad een invasie van zwarte mezen op. G. Gerritsen zond twee meldingen in die hiervan een illustratie vormen.

[KAUNAS VV.41771] geringd op 22 september 1997 als *volgroeid* te Ventes Ragas, Litouwen (55°21' NB 21°13' OL). Gemeld (gevangen) als *Ikj* op 28 oktober 1997 te Zwolle (52°31' NB 06°04' OL) 1040 km WZW.

[NLA F.854.447] geringd als ♂ *Ikj* te Zwolle op 17 okt. 1997, gecontroleerd op 27 oktober 1997 op 175 km ZZW te Tessenderlo, Limburg, België.

