

Een verslag

De Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (V.Z.Z.) heeft het initiatief genomen om een bijeenkomst te organiseren met als thema de pleistocene zoogdieren. Naar aanleiding van dit thema heeft de V.Z.Z. contact gezocht met de W.P.Z. om na te gaan in hoeverre het mogelijk zou zijn een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren.

De bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 26 januari jl. te Antwerpen. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst, temeer doordat vier Belgische zoogdierpaleontologen verteld hebben over hun werkzaamheden en over de zoogdierfossielen uit België.

Na een korte huishoudelijke vergadering van de V.Z.Z. heeft ondergetekende een overzicht gegeven van het zoogdierpaleontologisch onderzoek zoals dat gedurende de laatste jaren in Nederland plaatsvindt. Het Nederlandse onderzoek concentreert zich in hoofdzaak op een drietal projecten.

Allereerst het onderzoek naar het Vroeg Pleistoceen en met name het jongste deel daarvan. Zoogdierfossielen uit de groeven te Bavel en Dorts, uit boringen, zuiggaten en van de Maasvlakte geven veel informatie over de dieren uit het Vroeg Pleistoceen.

Ten tweede is er het onderzoek naar het Midden Pleistoceen. Daarbij worden fossielen bestudeerd uit verschillende groeven, o.a. uit de groeve Belvédère te Maastricht.

En dan is er natuurlijk nog het onderzoek aan laatpleistocene fossielen, die in groten getale gevonden worden in de Noordzee en in zuiggaten langs de grote rivieren. Dit onderzoek is erop gericht meer inzicht te krijgen in de Eemien- en Weichselienfauna's.

Na de lunchpauze heeft Dr. A. Gautier een beknopt overzicht gegeven van de Belgische vindplaatsen. Hij onderscheidt daarbij 3 categorieën: 1) Vindplaatsen in de Vlaamse Vallei; 2) Vindplaatsen in lössafzettingen en 3) Vindplaatsen in grotten die vooral in de Ardennen voorkomen.

Daarna is Dhr. Gautier uitgebreid ingegaan op de wijze waarop fossielen op die plaats komen waarop ze nu in het sediment worden aangetroffen. De fossiele vliegenmaden die zijn gevonden in een schedel van een wolharige neushoorn uit Dendermonde werden in dit verband ook uitvoerig behandeld.

Mevr. M. Germonpré gebruikte de schofthoogte van de fossiele paarden als ouderdomsindicatie voor de fauna van Zemst. Bij Zemst is een drietal fossielhoudende niveaus aangetroffen. Het onderste niveau met o.a. neushoorns, varkens, reeën en beren is waarschijnlijk afgezet tijdens het Eemien. De bovenste twee niveaus hebben een Weichselien-ouderdom. Dieren die daarin zijn aangetroffen zijn: Mammoet, wolharige neushoorn, paard, oerrund/bison, reuzenhert, edelhert, rendier, wolf, beer, leeuw, hyena, vos en das.

Dr. J.M. Cordy heeft gesproken over zijn opgraving in Sprimont, dichtbij Luik. In de oude grot-opvulling zijn honderden resten van *Ursus deningeri*, de voorouder van de grottenbeer, gevonden. Daarnaast zijn o.a. twee soorten leeuwen, een hyena-, een marter- en een hondachtige gevonden. De verzamelde knaagdierresten zijn vooral voor de datering van de sedimenten van belang. Op grond van absolute-ouderdomsbepalingen en de knaagdierfossielen denkt Dhr. Cordy dat het ± 600.000 jaar oude afzettingen betreft.

Een korte samenvatting van de voordracht van Dhr. W. van Neer wordt in het onderstaande door hemzelf gegeven.

Thijs van Kolfschoten