

Carex sylvatica in het Fluviatische district

door

M. T. JANSEN en J. A. E. DE KLEUVER

(Veenendaal)

Het *Carex*-deel van de Flora Neerlandica (1954) geeft als groeiplaatsen in het Fluviatische district: Neerbosch, Neerlangbroek, Harmelen, Linschoten en Bolnes. Sinds 1954 is het aantal bekende vindplaatsen flink toegenomen.

Hier volgen een aantal recente vondsten met aanduiding van vinder(s), jaartal en uurhok.

Angerlo bij Doesburg, hakhoutbos aan de Pierikse straat, I.V.O.N.-exc., 1957, uurhok 40—26.

Zoelen, kasteelbos, M. T. Jansen, 1957, uurhok 39—34.

Hemmen, kasteelbos, M. T. Jansen, J. A. E. de Kleuver, 1963, uurhok 39—38.

Buren, kleigroeve nabij hoog bos van buitenplaats, J. Schouten, 1963, uurhok 39—33.

Ommeren, gem. Lienden, parkbos van landgoed De Eng, M. T. Jansen, J. A. E. de Kleuver, 1964, uurhok 39—35.

Amerongen, kasteelbos, A. van de Beek, M. T. Jansen, J. A. E. de Kleuver, H. N. Leys, F. M. Muller, S. van der Werf, 1964, uurhok 39—14 en 39—15.

Dit lijstje bekijkend, zou men kunnen concluderen: *Carex sylvatica*, groeiend op buitenplaatsen, zal een stinsenplant zijn of daar door uitzaai van „bosgrassen” terecht zijn gekomen. Wij geloven echter eerder dat de plant in de Betuwse bossen indigeen is en zouden het feit dat zij wordt aangetroffen op buitenplaatsen willen verklaren doordat oud bos in de Betuwe nagenoeg tot deze beperkt is. Bovendien ontbreken in de regel andere planten uit bovengenoemde categorieën. Alleen het kasteelbos van Amerongen vormt hierop een uitzondering door het voorkomen van *Anemone ranunculoides*, *Scilla hispanica*, *Primula vulgaris*, *Eranthis hyemalis* en *Luzula luzuloides*.

Summary

This paper contains a list of new localities of *Carex sylvatica* Huds. in the “Fluviatische district” of the Netherlands to show that this species is not so rare there as was originally thought by Dutch botanists.